

# Geometrie și grafică pe calculator

## Geometrie analitică, transformări și proiecții

Paul A. Blaga



<b>I</b>	<b>Elemente de geometrie analitică în plan și în spațiu</b>	<b>9</b>
<b>1</b>	<b>Vectori, puncte și coordonate</b>	<b>11</b>
1.1	Noțiunea de vector . . . . .	12
1.1.1	Segmente orientate (vectori legați) . . . . .	12
1.1.2	Vectori liberi . . . . .	13
1.2	Adunarea vectorilor . . . . .	15
1.3	Înmulțirea unui vector cu un număr real (cu un scalar) . . . . .	17
1.4	Proiecțiile vectorilor pe axe sau plane . . . . .	20
1.4.1	Axe . . . . .	20
1.4.2	Proiecția pe o axă în spațiu . . . . .	20
1.4.3	Proiecția pe o axă într-un plan . . . . .	21
1.4.4	Proiecția pe un plan . . . . .	21
1.4.5	Proiecția sumei vectorilor . . . . .	21
1.4.6	Proiecția produsului unui vector cu un scalar . . . . .	22
1.4.7	Proiecția unei combinații liniare de vectori . . . . .	22
1.5	Dependența liniară a vectorilor . . . . .	22
1.6	Orientarea sistemelor de doi și trei vectori liniar independenți . . . . .	27
1.7	Puncte și vectori. Rudimente de geometrie afină . . . . .	28
1.8	Coordonate pe dreaptă . . . . .	29
1.9	Coordonate în plan . . . . .	30
1.9.1	Coordonate afine . . . . .	30
1.9.2	Coordonate rectangulare . . . . .	33

---

1.9.3	Coordonate polare . . . . .	33
1.10	Coordonate în spațiu . . . . .	35
1.10.1	Coordonate afine și rectangulare . . . . .	35
1.10.2	Coordonate cilindrice . . . . .	36
1.10.3	Coordonate sferice . . . . .	37
1.11	Transformări de coordonate . . . . .	38
1.11.1	Coordonate afine . . . . .	38
1.11.2	Coordonate rectangulare în plan . . . . .	40
1.12	Produsul scalar al vectorilor . . . . .	42
1.12.1	Definiție și proprietăți fundamentale . . . . .	42
1.12.2	Exprimarea produsului scalar în coordonate . . . . .	44
1.13	Produsul vectorial al vectorilor . . . . .	45
1.13.1	Definiție și proprietăți fundamentale . . . . .	45
1.13.2	Expresia produsului vectorial în funcție de componentele factorilor . . . . .	48
1.13.3	Dublul produs vectorial . . . . .	49
1.14	Produsul mixt al vectorilor . . . . .	52
1.14.1	Definiție și proprietăți fundamentale . . . . .	52
1.14.2	Expresia produsului mixt în coordonate . . . . .	53
1.15	Problems . . . . .	54
<b>2</b>	<b>Dreapta în plan</b>	<b>59</b>
2.1	Ecuția dreptei scrisă cu ajutorul coeficientului unghiular (al pantei) . . . . .	59
2.2	Ecuția generală a dreptei. Ecuția dreptei prin tăieturi . . . . .	62
2.3	Ecuția vectorială . . . . .	64
2.4	Poziția reciprocă a două drepte în plan . . . . .	65
2.5	Fascicole de drepte . . . . .	67
2.6	Distanța de la un punct la o dreaptă . . . . .	68
2.7	Unghiul dintre două drepte . . . . .	72
2.8	Problems . . . . .	73
<b>3</b>	<b>Dreapta și planul în spațiu</b>	<b>77</b>
3.1	Planul . . . . .	78
3.1.1	Ecuția vectorială a planului . . . . .	78
3.1.2	Ecuția generală a planului . . . . .	80
	Cazuri particulare ale ecuației generale a planului . . . . .	81
3.1.3	Altă formă a ecuației vectoriale a planului . . . . .	82
3.1.4	Ecuția planului determinat de trei puncte necoliniare . . . . .	82
3.1.5	Condiția de coplanaritate a patru puncte . . . . .	83

---

3.1.6	Ecuția planului prin tăieturi . . . . .	83
3.1.7	Ecuția normală a unui plan . . . . .	84
3.1.8	Distanța de la un punct la un plan . . . . .	85
3.1.9	Unghiul a două plane . . . . .	86
3.2	Dreapta în spațiu . . . . .	87
3.2.1	Ecuția vectorială și ecuațiile parametrice ale dreptei . . . . .	87
3.2.2	Ecuțiile canonice ale unei drepte în spațiu . . . . .	87
3.2.3	Dreapta ca intersecție de două plane . . . . .	88
3.2.4	Ecuțiile drepte care trece prin două puncte . . . . .	89
3.2.5	Unghiul a două drepte în spațiu . . . . .	89
3.3	Probleme diverse referitoare la drepte și plane în spațiu . . . . .	91
3.3.1	Pozițiile relative a două plane . . . . .	91
3.3.2	Pozițiile relative a trei plane . . . . .	92
3.3.3	Fascicole de plane. Snopuri de plane . . . . .	94
3.3.4	Poziția relativă a unei drepte față de un plan . . . . .	96
3.3.5	Ecuția unui plan determinat de două drepte concurente . . . . .	97
3.3.6	Ecuția planului determinat de o dreaptă și un punct . . . . .	98
3.3.7	Ecuția planului determinat de două drepte paralele . . . . .	98
3.3.8	Proiecția unei drepte pe un plan . . . . .	99
3.3.9	Poziția relativă a două drepte în spațiu . . . . .	99
3.3.10	Distanța de la un punct la o dreaptă în spațiu . . . . .	101
3.3.11	Perpendiculara comună a două drepte strâmbes . . . . .	101
3.3.12	Lungimea perpendicularei comune a două drepte necoplanare . . . . .	103
3.3.13	Unghiul dintre o dreaptă și un plan . . . . .	103
3.4	Probleme . . . . .	104
<b>4</b>	<b>Conice</b> . . . . .	<b>109</b>
4.1	Elipsa . . . . .	109
4.2	Hiperbola . . . . .	119
4.3	Parabola . . . . .	128
4.4	Cercul . . . . .	136
4.4.1	Definiția și ecuația canonică . . . . .	136
4.4.2	Ecuția generală a cercului . . . . .	137
4.4.3	Ecuția cercului care trece prin trei puncte . . . . .	138
4.4.4	Intersecția dintre o dreaptă și un cerc. Tangenta la cerc într-un punct al său . . . . .	139
	Cazul dreptelor neverticale . . . . .	140
	Cazul dreptelor verticale . . . . .	141

---

	Tangenta la cerc într-un punct al său . . . . .	141
	Tangenta dusă la cerc dintr-un punct exterior cercului . . . . .	142
4.5	Probleme . . . . .	143
<b>5</b>	<b>Cuadrice</b>	<b>147</b>
5.1	Cuadrice pe ecuații reduse . . . . .	147
5.2	Elipsoidul . . . . .	148
	Planul tangent într-un punct al unui elipsoid . . . . .	153
5.3	Conul de gradul al doilea . . . . .	155
	Intersecții cu plane paralele cu planele de coordonate . . . . .	156
5.4	Hiperboloidul cu o pânză. . . . .	158
5.5	Hiperboloidul cu două pânze . . . . .	162
5.6	Paraboloidul eliptic . . . . .	165
5.7	Paraboloidul hiperbolic . . . . .	169
5.8	Cilindrul eliptic . . . . .	172
5.9	Cilindrul hiperbolic . . . . .	176
5.10	Cilindrul parabolic . . . . .	178
5.11	Probleme . . . . .	181

## **Partea I**

# **Elemente de geometrie analitică în plan și în spațiu**





# CAPITOLUL 1

---

## Vectori, puncte și coordonate

---

### Cuprins

---

<b>1.1</b>	<b>Noțiunea de vector</b> . . . . .	<b>12</b>
1.1.1	Segmente orientate (vectori legați) . . . . .	12
1.1.2	Vectori liberi . . . . .	13
<b>1.2</b>	<b>Adunarea vectorilor</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>1.3</b>	<b>Înmulțirea unui vector cu un număr real (cu un scalar)</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>1.4</b>	<b>Proiecțiile vectorilor pe axe sau plane</b> . . . . .	<b>20</b>
1.4.1	Axe . . . . .	20
1.4.2	Proiecția pe o axă în spațiu . . . . .	20
1.4.3	Proiecția pe o axă într-un plan . . . . .	21
1.4.4	Proiecția pe un plan . . . . .	21
1.4.5	Proiecția sumei vectorilor . . . . .	21
1.4.6	Proiecția produsului unui vector cu un scalar . . . . .	22
1.4.7	Proiecția unei combinații liniare de vectori . . . . .	22
<b>1.5</b>	<b>Dependența liniară a vectorilor</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>1.6</b>	<b>Orientarea sistemelor de doi și trei vectori liniar independenți</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>1.7</b>	<b>Puncte și vectori. Rudimente de geometrie afină</b> . . . . .	<b>28</b>
<b>1.8</b>	<b>Coordonate pe dreaptă</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>1.9</b>	<b>Coordonate în plan</b> . . . . .	<b>30</b>

1.9.1	Coordonate afine . . . . .	30
1.9.2	Coordonate rectangulare . . . . .	33
1.9.3	Coordonate polare . . . . .	33
<b>1.10</b>	<b>Coordonate în spațiu . . . . .</b>	<b>35</b>
1.10.1	Coordonate afine și rectangulare . . . . .	35
1.10.2	Coordonate cilindrice . . . . .	36
1.10.3	Coordonate sferice . . . . .	37
<b>1.11</b>	<b>Transformări de coordonate . . . . .</b>	<b>38</b>
1.11.1	Coordonate afine . . . . .	38
1.11.2	Coordonate rectangulare în plan . . . . .	40
<b>1.12</b>	<b>Produsul scalar al vectorilor . . . . .</b>	<b>42</b>
1.12.1	Definiție și proprietăți fundamentale . . . . .	42
1.12.2	Exprimarea produsului scalar în coordonate . . . . .	44
<b>1.13</b>	<b>Produsul vectorial al vectorilor . . . . .</b>	<b>45</b>
1.13.1	Definiție și proprietăți fundamentale . . . . .	45
1.13.2	Expresia produsului vectorial în funcție de componentele factorilor . . . . .	48
1.13.3	Dublul produs vectorial . . . . .	49
<b>1.14</b>	<b>Produsul mixt al vectorilor . . . . .</b>	<b>52</b>
1.14.1	Definiție și proprietăți fundamentale . . . . .	52
1.14.2	Expresia produsului mixt în coordonate . . . . .	53
<b>1.15</b>	<b>Problems . . . . .</b>	<b>54</b>

---

## 1.1 Noțiunea de vector

### 1.1.1 Segmente orientate (vectori legați)

Un segment de dreaptă pentru care s-a precizat care dintre capetele sale este originea și care extremitatea, se numește *segment orientat*. Un segment orientat cu originea în punctul  $A$  și extremitatea în punctul  $B$  se notează, de regulă, cu  $\overline{AB}$ . Din punct de vedere grafic, un segment de dreaptă orientat se reprezintă sub forma unei săgeți, cu originea în originea segmentului și cu vârful în extremitatea sa. Un segment orientat este definit, în mod unic, de capetele sale și de ordinea acestor capete. Cu alte cuvinte, un segment orientat este

unic determinat dacă se indică originea și extremitatea sa. Dacă cumva cele două puncte coincid, atunci se spune că avem de-a face cu un *segment orientat nul* și se scrie<sup>1</sup>  $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .

Dacă s-a ales o unitate de lungime, atunci putem defini lungimea segmentului orientat  $\overrightarrow{AB}$  ca fiind lungimea segmentului neorientat  $AB$  și scriem:

$$\|\overrightarrow{AB}\| = |AB|$$

sau, pur și simplu,

$$\|\overrightarrow{AB}\| = AB.$$

Lungimea unui segment orientat se mai numește și *modulul* său sau *norma* sa.

Spunem că două segmente orientate  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{CD}$  sunt *egale* dacă  $A = C$  și  $B = D$ , cu alte cuvinte, dacă ele au aceeași origine și aceeași extremitate.

Despre un segment orientat  $\overrightarrow{AB}$  se mai spune și că este un *vector legat* cu originea în punctul  $A$  și extremitatea în punctul  $B$ . Fixând punctul  $A$ , putem defini operația de adunare și cea de înmulțire cu scalari pentru toți vectorii legați cu originea în  $A$  și se poate demonstra că această mulțime este un spațiu vectorial real. Totuși, dacă avem în vedere aplicații reale în geometrie, noțiunea de vector legat este de un interes limitat, deoarece în geometrie avem, de regulă, vectori cu originile în puncte diferite și avem nevoie de niște reguli cu care să putem opera cu acești vectori. În acest scop, vom modifica puțin noțiunea de vector în așa fel încât originea (sau punctul de aplicare, cum se mai numește) să nu mai joace nici un rol.

### 1.1.2 Vectori liberi

După cum spuneam mai devreme, vrem să dezvoltăm o teorie a vectorilor care să ne permită să comparăm vectori care nu au neapărat aceeași origine.

Începem cu niște definiții. Vom spune, înainte de toate, că două segmente orientate *nenule*  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{CD}$  au *aceeași direcție* dacă dreptele  $AB$  și  $CD$  sunt paralele. Un segment legat nul se consideră, prin convenție, că are aceeași direcție cu orice alt segment orientat.

Presupunem acum că cele două segmente orientate (nenule) au aceeași direcție, dar dreptele lor suport nu coincid. Vom spune că ele au *același sens* dacă segmentele (neorientate)  $AC$  și  $BD$  nu se intersectează. Dacă, însă, aceste două segmente se intersectează, vom spune că segmentele orientate  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{CD}$  au *sensuri opuse*.

Dacă segmentele orientate nenule  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{CD}$  au aceeași dreaptă suport:  $AB = CD$  (ca drepte), atunci vom spune că ele au același sens dacă există un al treilea segment orientat,  $\overrightarrow{EF}$ , având aceeași direcție (dar nu și aceeași dreaptă suport) cu  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{CD}$ , și care are

<sup>1</sup>Notăția pentru vectorul nul este incompletă, pentru că ea nu scoate în evidență faptul că este vorba de vectorul nul în punctul  $A$ . Practic, un vector nul într-un punct se reduce la punctul însuși.

același sens cu ambele segmente. În caz contrar, vom spune că segmentele  $\overline{AB}$  și  $\overline{CD}$  au sensuri opuse.

Se consideră, prin convenție, că vectorul nul are același sens cu orice alt vector<sup>2</sup>.

*Observație.* De fiecare dată când spunem că două segmente orientate au același sens, subînțelegem, chiar dacă nu o spunem în mod explicit, că segmentele au aceeași direcție. Relația “același sens” nu este definită pentru perechi de segmente orientate care nu au aceeași direcție. Mai spunem, uneori, despre două segmente orientate care au aceeași direcție și același sens, că au *aceeași orientare*.

**Definiția 1.1.** Spunem că două segmente orientate  $\overline{AB}$  și  $\overline{CD}$  sunt *echipolente* și scriem  $\overline{AB} \sim \overline{CD}$ , dacă fie ambele sunt nule, fie ambele sunt nenule și ele au aceeași direcție, același sens și același modul.

Este ușor de constatat că relația de echipolență este o relație de echivalență (adică este reflexivă, simetrică și tranzitivă).

**Definiția 1.2.** Se numește *vector liber* o clasă de echivalență de segmente orientate, în raport cu relația de echipolență. Vectorul liber determinat de segmentul orientat  $\overline{AB}$  se notează cu  $\overrightarrow{AB}$ . Astfel,

$$\overrightarrow{AB} = \{ \overline{CD} \mid \overline{CD} - \text{segment orientat a.î. } \overline{CD} \sim \overline{AB} \}$$

Așadar, un vector liber este, de fapt, o familie de vectori legați, toți echipolenți între ei. Există o interpretare cinematică a vectorului liber, care sugerează, de fapt, denumirea: un vector liber poate fi privit ca un segment orientat a cărui origine nu a fost fixată. El poate fi mutat în orice punct al spațiului, cu condiția să nu-i schimbăm modulul, direcția și sensul. Firește, semnificația riguroasă a acestei afirmații este aceea că *dacă  $\overrightarrow{AB}$  este un vector liber, atunci, pentru orice punct C din spațiu există un vector legat  $\overline{CD}$  cu originea în C astfel încât  $\overline{AB} \sim \overline{CD}$ .*

Doi vectori liberi se numesc *egali* dacă ei sunt egali ca și clasă de echivalență, adică sunt alcătuiți din aceleași segmente orientate. Altfel spus,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff \overline{AB} \sim \overline{CD}.$$

De regulă, dacă nu vrem să scoatem în evidență un reprezentant al unui vector liber, vom utiliza pentru notarea acestor obiecte litere mici, de regulă din prima parte a alfabetului,  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots$ . Vectorul nul se notează cu  $\mathbf{0}$ . Pentru reprezentarea unui vector liber se utilizează unul dintre segmentele orientate care îl formează.

<sup>2</sup>Aceasta înseamnă, până la urmă, că noțiunea de *sens* nu are o semnificație bine definită pentru vectorul nul.

Să presupunem că se dă un vector liber  $\mathbf{a}$  și un punct  $A$ . În mod evident, există un singur punct  $B$  din spațiu astfel încât să avem

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}.$$

Vom spune că, prin construirea punctului  $B$  pentru care e verificată relația de mai sus, am *atașat* vectorul liber  $\mathbf{a}$  punctului  $A$ .

Se numește *modul* al vectorului liber  $\mathbf{a}$  modulul oricăruia dintre segmentele orientate care îl alcătuiesc. Modulul lui  $\mathbf{a}$  se notează cu  $\|\mathbf{a}\|$ .

Să presupunem că se dau doi vectori  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$ . Îi atașăm unui punct  $O$  (construim punctele  $A$  și  $B$  astfel încât să avem  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ). Atunci *unghiul dintre vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$*  este, prin definiție, unghiul dintre segmentele orientate  $\overrightarrow{OA}$  și  $\overrightarrow{OB}$ . În mod evident, acest unghi nu depinde de alegerea punctului  $O$ .

Spunem că un segment orientat  $\overrightarrow{AB}$  este paralel cu o dreaptă  $\Delta$  (cu un plan  $\Pi$ ) dacă dreapta sa suport este paralelă cu dreapta  $\Delta$  (cu planul  $\Pi$ ). Segmentul nul se consideră, prin convenție, că este paralel cu orice dreaptă sau plan. Spunem că vectorii liberi  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$  sunt *coliniari (coplanari)* dacă segmentele care îi alcătuiesc sunt paralele cu o aceeași dreaptă (respectiv cu același plan).

Mai dăm, în sfârșit, încă o interpretare vectorilor liberi. Fie vectorul liber  $\overrightarrow{AB}$  (adică mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu segmentul orientat  $\overrightarrow{AB}$ ). Considerăm transformarea spațiului care duce un punct  $C$  oarecare într-un punct  $D$  astfel încât să avem  $\overrightarrow{CD} \sim \overrightarrow{AB}$ . O astfel de transformare se numește *transport paralel* sau *translație de vector  $\overrightarrow{AB}$* . Se stabilește, pe această cale, o bijecție între mulțimea tuturor vectorilor liberi și mulțimea tuturor translațiilor. Datorită acestei identificări, uneori și translațiile se numesc *vectori*.

Dacă în spațiu se fixează un plan  $\Pi$  și se consideră numai acele puncte care aparțin acestui plan, atunci prin vector (liber) vom înțelege o clasă de echivalență de segmente orientate situate în acel plan. Analog se definesc și vectorii de pe dreaptă.

## 1.2 Adunarea vectorilor

Considerăm doi vectori  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$ . Alegem un punct  $O$  oarecare din spațiu și construim un punct  $A$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și un punct  $B$  astfel încât  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ .

**Definiția 1.3.** Vectorul  $\overrightarrow{OB}$  se numește *suma vectorilor  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$*  și se notează cu  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ .

Este clar, din rațiuni geometrice elementare, că suma  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  nu depinde de alegerea punctului  $O$ . Modalitatea de construcție a sumei a doi vectori descrisă mai sus se numește *regula triunghiului* (sau a *închiderii*, pentru că suma celor doi vectori este determinată

de segmentul orientat care închide triunghiul care are ca celelalte două laturi segmentele orientate care determină cei doi vectori liberi care se însumează).

Dacă vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  nu sunt coliniari, atunci avem și o altă metodă de a determina suma a doi vectori, care, firește, dă același rezultat ca și regula triunghiului. Fie, prin urmare,  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  doi vectori necoliniari. Alegem un punct  $O$  și atașăm cei doi vectori de punctul  $O$ , cu alte cuvinte, determinăm punctele  $A$  și  $B$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ . Cum vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  nu sunt coliniari, de aici rezultă că nici punctele  $O$ ,  $A$  și  $B$  nu sunt coliniare, deci ele determină un plan. În acest plan, construim paralelogramul  $OACB$ . Cum se constată cu ușurință că  $\overrightarrow{BC} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ , rezultă, pe baza regulii triunghiului, menționată mai sus, că au loc egalitățile:

$$\overrightarrow{OC} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}. \quad (1.2.1)$$

Avem două egalități, pentru că avem două situații în care putem aplica regula triunghiului, și de fiecare dată vectorul care închide triunghiul este  $\overrightarrow{OC}$ . Rezultă, prin urmare, noua

regulă de calcul a sumei a doi vectori (*regula paralelogramului*): pentru a găsi suma a doi vectori necoliniari, se atașează acești doi vectori unui punct  $O$  și se construiește pe segmentele orientate obținute, ca laturi, un paralelogram. Diagonala paralelogramului care pleacă din punctul  $O$  va fi atunci segmentul orientat care determină suma celor doi vectori.

Regula paralelogramului permite (vezi formula (1.2.1)) demonstrarea foarte simplă a *comutativității* adunării vectorilor liberi, pentru cazul vectorilor *necoliniari*. Pentru cazul vectorilor coliniari, comutativitatea se poate verifica foarte ușor cu ajutorul regulii închiderii, atât pentru vectorii orientați în același sens, cât și pentru cei având sensuri opuse. Așadar, operația de adunare a vectorilor liberi este comutativă.

Considerăm acum trei vectori  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$ . Atașăm vectorul  $\mathbf{a}$  unui punct  $O$ , construind, astfel, punctul  $A$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ . Construim, mai departe, punctul  $B$  astfel încât  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ . Conform definiției sumei,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ . Adunăm acum la acest vector vectorul  $\mathbf{c}$ . Pentru aceasta construim punctul  $C$  astfel încât  $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}$ . Avem, atunci

$$\overrightarrow{OC} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}. \quad (1.2.2)$$

Pe de altă parte,  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ , prin urmare

$$\overrightarrow{OC} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}). \quad (1.2.3)$$

Combinând (1.2.2) cu (1.2.3) obținem

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}),$$

adică adunarea vectorilor este *asociativă*.

Operația de adunare a vectorilor liberi admite și *element neutru*, care este, firește, vectorul nul,  $\mathbf{0}$ , deoarece este evident că pentru orice vector  $\mathbf{a}$  avem:

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{a}.$$

Remarcăm, în sfârșit, că fiecare vector admite un opus relativ la operația de adunare. Astfel, dacă vectorul liber  $\mathbf{a}$  este reprezentat de segmentul orientat  $\overrightarrow{AB}$ , atunci vom nota cu  $-\mathbf{a}$  vectorul liber reprezentat de segmentul orientat  $\overrightarrow{BA}$  și se constată imediat că avem:

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}.$$

Acestea fiind spuse, putem afirma că *mulțimea tuturor vectorilor liberi din spațiu formează un grup abelian în raport cu operația de adunare a vectorilor*.

Așa cum se întâmplă în orice grup abelian (aditiv), odată cu adunarea vectorilor putem defini și scăderea lor, punând, prin definiție:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} := \mathbf{a} + (-\mathbf{b}).$$

Dacă atașăm vectorul  $\mathbf{a}$  unui punct  $O$  și alegem  $A$  și  $B$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ , atunci, după cum se constată cu ușurință,  $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \overrightarrow{BA}$  sau

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

Regula paralelogramului se poate aplica fără dificultate și pentru determinarea diferenței a doi vectori, nu doar pentru determinarea sumei. Astfel, după cum am văzut mai sus, pentru a determina suma a doi vectori, se consideră, mai întâi, câte un reprezentant al fiecărui vector, având originile în același punct. Se completează paralelogramul, ducându-se paralelele la drepte suport ale celor două segmente orientate, prin extremitățile lor. Atunci suma celor doi vectori este vectorul reprezentat de segmentul orientat asociat diagonalei ce are originea în punctul de aplicare al celor doi vectori. Diferența celor doi vectori, în schimb, este determinată de cea de-a doua diagonală, orientarea fiind aleasă în așa fel încât originea să fie situată în extremitatea scăzătorului, iar extremitatea în extremitatea descăzutului.

### 1.3 Înmulțirea unui vector cu un număr real (cu un scalar)

Scopul nostru este să înzestram mulțimea vectorilor liberi din spațiu cu o structură de spațiu vectorial. Am văzut, până acum, că această mulțime, împreună cu adunarea vectorilor, este un grup abelian. Ne-a mai rămas de definit înmulțirea exterioară (înmulțirea cu scalari) și verificarea compatibilității acestei operații cu adunarea vectorilor.

**Definiția 1.4.** Fie  $\mathbf{a}$  un vector și  $\lambda \in \mathbb{R}$  un număr real. *Produsul vectorului  $\mathbf{a}$  cu scalarul  $\lambda$*  este, prin definiție, un vector, notat  $\lambda\mathbf{a}$  caracterizat în modul următor:

(i) modulul lui  $\lambda\mathbf{a}$  este dat de

$$\|\lambda\mathbf{a}\| := |\lambda| \cdot \|\mathbf{a}\|,$$

unde produsul din membrul drept este produsul de numere reale;

(ii) direcția lui  $\lambda\mathbf{a}$  coincide cu direcția lui  $\mathbf{a}$ ;

(iii) sensul lui  $\lambda\mathbf{a}$  coincide cu sensul lui  $\mathbf{a}$  dacă  $\lambda > 0$  sau cu sensul opus sensului lui  $\mathbf{a}$  dacă  $\lambda < 0$ .

Vom enumera acum o serie de proprietăți fundamentale pe care le are operația de înmulțire a vectorilor cu scalari.

1)  $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$ .

2)  $(-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}$ .

3)  $\lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}$ , pentru orice scalari  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  și orice vector  $\mathbf{a}$ .

Aceste trei proprietăți sunt evidente, ele rezultând în mod direct din definiția înmulțirii cu scalari.

4)  $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ , pentru orice  $\lambda \in \mathbb{R}$  și pentru orice doi vectori liberi  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ .

Proprietatea 4) este evidentă în anumite cazuri speciale: dacă scalarul  $\lambda$  se anulează, dacă suma  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  se anulează sau dacă cel puțin unul dintre vectori este egal cu zero.

Lăsăm deoparte aceste situații și presupunem că  $\lambda > 0$ , iar vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  nu sunt coliniari. Alegem un punct  $O$  oarecare și construim punctele  $A$  și  $B$  astfel încât să avem  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$  și, prin urmare,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ . Mai construim punctele  $A'$  și  $B'$  astfel încât

$$\overrightarrow{OA'} = \lambda\mathbf{a}, \quad \overrightarrow{OB'} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}). \quad (1.3.1)$$

Triunghiurile  $OAB$  și  $OA'B'$  sunt asemenea, deoarece ele au un unghi comun, iar laturile corespunzătoare unghiului comun sunt proporționale. De aici rezultă că  $|A'B'| = |\lambda| \cdot |AB| = \lambda \cdot |AB|$ . Cum, în plus, vectorii  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{A'B'}$  au, în plus, aceeași direcție și același sens, rezultă că

$$\overrightarrow{A'B'} = \lambda\mathbf{b}. \quad (1.3.2)$$

Proprietatea 4) rezultă acum din relațiile (1.3.1) și (1.3.2).

Presupunem acum, în continuare, că  $\lambda > 0$ , dar vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt, de data aceasta, coliniari. Alegem un punct  $O$  arbitrar și construim punctele  $A$  și  $B$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ .

Alegem un punct  $S$ , care nu aparține dreptei  $OAB$  și construim semidreptele  $SO, SA$  și  $SB$ . Alegem pe semidreapta  $SO$  punctul  $O'$  astfel încât  $|SO'| = \lambda \cdot |SO|$ . Prin  $O'$



ducem o dreaptă  $\delta$ , paralelă cu dreapta  $OAB$  și notăm cu  $A'$ , respectiv  $B'$  intersecțiile acestei drepte cu semidreptele  $SA$ , respectiv  $SB$ . Obținem, pe această cale, trei perechi de triunghiuri asemenea:

$$\triangle OAS \simeq \triangle O'A'S', \quad \triangle ABS \simeq \triangle A'B'S', \quad \triangle OBS \simeq \triangle O'B'S'.$$

De aici rezultă imediat că

$$\overrightarrow{O'A'} = \lambda \mathbf{a}, \quad \overrightarrow{A'B'} = \lambda \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{O'B'} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}),$$

din care rezultă imediat proprietatea 4). Cazul  $\lambda < 0$  se tratează similar.

5)  $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$ , pentru orice scalari  $\lambda$  și  $\mu$  și pentru orice vector  $\mathbf{a}$ .

Ca și în cazul proprietății 4), și aici egalitatea este evidentă pentru anumite situații particulare: dacă  $\mathbf{a} = 0$ , dacă  $\lambda + \mu = 0$  sau dacă cel puțin unul dintre scalari este egal cu zero.

Lăsam, din nou, deoparte aceste situații. Presupunem, mai întâi, că  $\lambda$  și  $\mu$  au același semn. Este clar, de la bun început, că vectorii din ambii membri ai relației 5) au aceeași direcție și același sens. Pentru a demonstra că relația are loc, este suficient, prin urmare, să demonstrăm că ei au și același modul. Avem, ținând cont de ipotezele făcute:

$$\begin{aligned} \|\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}\| &= \|\lambda\mathbf{a}\| + \|\mu\mathbf{a}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{a}\| + |\mu| \cdot \|\mathbf{a}\| = (|\lambda| + |\mu|) \cdot \|\mathbf{a}\| = \\ &= |\lambda + \mu| \cdot \|\mathbf{a}\| = \|(\lambda + \mu)\mathbf{a}\|. \end{aligned}$$

Să presupunem acum că  $\lambda$  și  $\mu$  au semne opuse și, pentru fixarea ideilor, mai admitem că  $|\lambda| > \mu$ . Atunci numerele  $\lambda + \mu$  și  $-\mu$  vor avea același semn și, pe baza celor demonstrate mai sus, avem

$$(\lambda + \mu)\mathbf{a} + (-\mu)\mathbf{a} = (\lambda + \mu - \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a},$$

relație echivalentă cu proprietatea 5).

Proprietățile 1)–5), împreună cu faptul că mulțimea  $\mathcal{V}$  este un grup abelian (ceea ce am demonstrat în secțiunea precedentă), înseamnă că această mulțime este un *spațiu vectorial* peste mulțimea numerelor reale.

*Observație.* Proprietățile 4) și 5) pot fi extinse, prin inducție, la orice număr finit de sumanzi, cu alte cuvinte, se poate demonstra cu ușurință că:

$$\begin{aligned} \lambda(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_k) &= \lambda\mathbf{a}_1 + \lambda\mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda\mathbf{a}_k, \\ (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k)\mathbf{a} &= \lambda_1\mathbf{a} + \lambda_2\mathbf{a} + \cdots + \lambda_k\mathbf{a}, \end{aligned}$$

pentru orice  $k$  natural, cel puțin egal cu 2, orice numere reale,  $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  și orice vectori  $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ .

## 1.4 Proiecțiile vectorilor pe axe sau plane

### 1.4.1 Axe

Alegem o dreaptă oarecare în spațiu. Vom numi unul dintre cele două sensuri de pe această dreaptă *pozitiv* și îl vom nota pe desen cu o săgeată. Sensul opus va fi numit *negativ*. O dreaptă pe care s-a ales un sens pozitiv se numește *axă* sau *dreaptă orientată*.

Alegem acum o axă  $\Delta$  și pe ea alegem un segment nenul ca unitate de lungime. Vom numi *magnitudine* a unui segment orientat  $\overline{AB}$  de pe axă și-l vom nota cu simbolul  $(AB)$  numărul dat de

$$(AB) = \begin{cases} \|\overline{AB}\| & \text{dacă } \overline{AB} \text{ are același sens cu } \Delta \\ -\|\overline{AB}\| & \text{dacă } \overline{AB} \text{ și } \Delta \text{ au sensuri opuse} \end{cases} \quad (1.4.1)$$

Numărul  $(AB)$  se mai numește și *lungimea cu semn* sau *lungimea orientată* a segmentului orientat  $\overline{AB}$ . Avem, în mod evident,  $(AB) = -(BA)$ .

**Teorema 1.1** (Chasles). *Pentru orice trei puncte A, B, C situate pe o axă pe care s-a ales o unitate de lungime, are loc următoarea relație:*

$$(AB) + (BC) = (AC). \quad (1.4.2)$$

*Demonstrație* Verificare directă, după diferitele poziții reciproce ale punctelor A, B, C. □

### 1.4.2 Proiecția pe o axă în spațiu

Fie  $\Delta$  o axă în spațiu și  $\Pi$  un plan care nu este paralel cu  $\Delta$ . Printr-un punct oarecare A din spațiu ducem un plan  $\Pi_1$ , paralel cu planul  $\Pi$ . Acest plan intersectează axa  $\Delta$  într-un punct  $A'$ . Punctul  $A'$  se numește *proiecția punctului A pe axa  $\Delta$ , paralelă cu planul  $\Pi$* . Dacă planul  $\Pi$  este perpendicular pe axa  $\Delta$ , atunci proiecția se numește *ortogonală*. În acest caz,  $A'$  este piciorul perpendicularei coborâte din punctul A pe axa  $\Delta$ .

Alegem acum un segment orientat oarecare  $\overline{AB}$ . Dacă proiectăm punctele A și B pe axa  $\Delta$ , paralel cu planul  $\Pi$ , obținem un segment orientat  $\overline{A'B'}$ , care se numește *proiecția segmentului orientat  $\overline{AB}$  pe axa  $\Delta$ , paralelă cu planul  $\Pi$* . Presupunem acum că pe axa  $\Delta$  s-a ales și o unitate de lungime (o scală). Atunci putem vorbi și despre magnitudinea proiecției unui segment pe axă, magnitudine pe care o vom nota cu  $\text{pr}_{\Delta} \overline{AB} (\parallel \Pi)$ .

Este clar că două segmente orientate echivalente vor avea ca proiecții pe orice axă segmente orientate echivalente, iar magnitudinile acestor proiecții vor fi egale.

Considerăm acum un vector liber **a**, adică o clasă de echivalență de segmente orientate. Proiecțiile acestor segmente pe axa  $\Delta$ , paralel cu planul  $\Pi$ , formează, după cum am

menționat mai sus, o familie de segmente orientate echipolente între ele, adică formează un vector liber pe dreaptă. Acest vector se numește *proiecția vectorului  $\mathbf{a}$  pe axa  $\Delta$ , paralel cu planul  $\Pi$*  și se notează cu  $\text{pr}_\Delta \mathbf{a}$  ( $\parallel \Pi$ ).

### 1.4.3 Proiecția pe o axă într-un plan

Presupunem acum că atât axa  $\Delta$ , cât și figura care se proiectează sunt situate într-un același plan  $\Pi$ . Vom reformula definiția proiecției în modul următor. Fie  $\Delta_1$  o dreaptă din planul  $\Pi$ , care nu este paralelă cu axa  $\Delta$ . Ducem, printr-un punct  $A$  al planului, o dreaptă paralelă cu dreapta  $\Delta_1$ , care intersectează axa într-un punct  $A'$ , care se numește *proiecția punctului  $A$  pe axa  $\Delta$ , paralelă cu dreapta  $\Delta_1$* . Celelalte noțiuni din paragraful precedent se definesc în mod analog și se bucură de aceleași proprietăți.

### 1.4.4 Proiecția pe un plan

Fie  $\Pi$  un plan și  $\Delta$  o dreaptă care nu este paralelă cu planul. Ducem printr-un punct  $A$  al spațiului o dreaptă  $\Delta_1$ , paralelă cu dreapta  $\Delta$ . Dreapta  $\Delta_1$  intersectează planul într-un punct  $A'$ , care se numește *proiecția punctului  $A$  pe planul  $\Pi$ , paralelă cu dreapta  $\Delta$* . Dacă dreapta  $\Delta$  este perpendiculară pe planul  $\Pi$ , proiecția se numește *ortogonală*.

### 1.4.5 Proiecția sumei vectorilor

Presupunem că pe axa  $\Delta$  se proiectează doi vectori  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$ . Proiecția se face paralel cu un plan  $\Pi$  sau paralel cu o dreaptă  $\Delta_1$ , dacă atât vectorii, cât și axa se află într-un același plan.

Alegem un punct  $O$  și construim punctele  $A$  și  $B$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$  și, prin urmare,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ .

Dacă  $O', A', B'$  sunt proiecțiile punctelor  $O, A, B$  pe axa  $\Delta$ , atunci vectorii  $\overrightarrow{O'A'}$ ,  $\overrightarrow{A'B'}$  și  $\overrightarrow{O'B'}$  sunt, respectiv, proiecțiile vectorilor  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  și  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ . De aici rezultă că *proiecția sumei vectorilor este egală cu suma proiecțiilor termenilor*. Este clar că această proprietate se poate extinde, fără dificultate, și la sume de mai mult de doi vectori. Mai mult, dacă pe axă s-a ales și o unitate de lungime, atunci, în virtutea egalității (1.4.2), avem și

$$(O'B') = (O'A') + (A'B')$$

sau, utilizând notația introdusă mai devreme,

$$\text{pr}_\Delta(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \text{pr}_\Delta \mathbf{a} + \text{pr}_\Delta \mathbf{b}, \tag{1.4.3}$$

adică magnitudinea proiecției sumei vectorilor pe o axă este egală cu suma magnitudinilor proiecțiilor termenilor.

### 1.4.6 Proiecția produsului unui vector cu un scalar

Vom demonstra că prin înmulțirea unui vector  $\mathbf{a}$  cu un scalar  $\lambda$ , proiecția acestui vector pe orice axă  $\Delta$ , ca și magnitudinea acestei proiecții se înmulțesc cu același scalar.

Dacă  $\mathbf{a} = 0$  sau  $\lambda = 0$ , este clar că nu avem ce demonstra. Presupunem, prin urmare, că  $\mathbf{a} \neq 0$  și  $\lambda \neq 0$ . Alegem o axă  $\Delta$ , fixăm un punct  $O$  pe ea și determinăm punctele  $A$  și  $B$  din spațiu astfel încât să avem  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{OB} = \lambda\mathbf{a}$ . Cei doi vectori, după cum se știe, au aceeași direcție, iar sensurile coincid pentru  $\lambda > 0$  și sunt opuse pentru  $\lambda < 0$ .

Proiectând punctele  $A$  și  $B$  pe axa  $\Delta$  în punctele  $A'$  și  $B'$ , obținem două triunghiuri asemenea,  $OAA'$  și  $OBB'$ . Din proprietățile asemănării afirmația noastră rezultă imediat, prin urmare avem:

$$\text{pr}_{\Delta}(\lambda\mathbf{a}) = \lambda \text{pr}_{\Delta} \mathbf{a}. \quad (1.4.4)$$

### 1.4.7 Proiecția unei combinații liniare de vectori

Fie  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$  un sistem oarecare de vectori (nu neapărat distincți), și  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  un sistem oarecare de  $k$  numere reale. Atunci vectorul

$$\lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_k\mathbf{a}_k$$

se numește *combinație liniară* a vectorilor considerați.

Din egalitățile (1.4.3) și (1.4.4) rezultă următoarea egalitate:

$$\text{pr}_{\Delta}(\lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_k\mathbf{a}_k) = \lambda_1 \text{pr}_{\Delta} \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \text{pr}_{\Delta} \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_k \text{pr}_{\Delta} \mathbf{a}_k,$$

adică *magnitudinea proiecției unei combinații liniare de vectori pe o axă este egală cu combinația liniară a proiecțiilor vectorilor (cu aceeași coeficienți)*.

## 1.5 Dependența liniară a vectorilor

**Definiția 1.5.** Vectorii

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k \quad (1.5.1)$$

se numesc *liniar dependenți* dacă există numerele reale

$$\lambda_1, \dots, \lambda_k, \quad (1.5.2)$$

nu toate nule, astfel încât

$$\lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_k\mathbf{a}_k = \mathbf{0}. \quad (1.5.3)$$

În caz contrar, vectorii se numesc *liniar independenți*.

Este clar că vectorii sunt liniar independenți dacă și numai dacă din egalitatea (1.5.3) rezultă că

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0.$$

Se mai spune, de asemenea, că vectorii (1.5.1) formează *un sistem liniar dependent*, respectiv *un sistem liniar independent*.

Dacă un vector  $\mathbf{a}$  se poate scrie în funcție de vectorii (1.5.1) sub forma

$$\mathbf{a} = \mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \mu_k \mathbf{a}_k,$$

atunci vom spune că  $\mathbf{a}$  este o *combinație liniară a acestor vectori*.

**Teorema 1.2.** *Pentru ca vectorii (1.5.1) (cu  $k > 1$ ) să fie liniar dependenți, este necesar și suficient ca cel puțin unul dintre acești vectori să poată fi scris ca o combinație liniară a celorlalți.*

*Demonstrație* Să presupunem că vectorii (1.5.1) verifică o relație de forma (1.5.3), în care cel puțin unul dintre coeficienți este diferit de zero. Este clar că nu reducem generalitatea dacă presupunem că ultimul coeficient este nenul:  $\lambda_k \neq 0$ . Atunci, din egalitatea (1.5.3) se obține

$$\mathbf{a}_k = -\frac{\lambda_1}{\lambda_k} \mathbf{a}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_k} \mathbf{a}_2 \dots - \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k} \mathbf{a}_{k-1},$$

adică  $\mathbf{a}_k$  este o combinație liniară a celorlalți  $k - 1$  vectori.

Invers, să presupunem că unul dintre vectorii (1.5.1), de exemplu, din nou, ultimul, este o combinație liniară a celorlalți  $k - 1$  vectori:

$$\mathbf{a}_k = \beta_1 \mathbf{a}_1 + \beta_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \beta_{k-1} \mathbf{a}_{k-1}.$$

Dacă trecem toți termenii în membrul stâng, obținem

$$-\beta_1 \mathbf{a}_1 - \beta_2 \mathbf{a}_2 - \dots - \beta_{k-1} \mathbf{a}_{k-1} + 1 \cdot \mathbf{a}_k = 0,$$

egalitate care este de forma (1.5.3) și există cel puțin un coeficient nenul (întrucât coeficientul lui  $\mathbf{a}_k$  este 1), ceea ce înseamnă că vectorii sunt, într-adevăr, liniar dependenți.  $\square$

**Consecința 1.1.** *Dacă vectorii (1.5.1) sunt liniar independenți, atunci nici unul nu poate fi scris ca o combinație liniară a celorlalți. În particular, nici unul dintre vectori nu poate fi egal cu zero.*

În cadrul acestui curs, vom avea de-a face, de regulă, cu sisteme formate din cel mult trei vectori. De aceea este interesant să evidențiem sensul geometric al dependenței liniare sau al independenței liniare pentru sisteme formate din 1, 2 sau trei vectori.

Este evident că un sistem format dintr-un singur vector este liniar dependent dacă și numai dacă vectorul este nul.

Pentru cazul a doi vectori, avem următorul rezultat:

**Teorema 1.3.** *Doi vectori sunt liniar dependenți dacă și numai dacă sunt coliniari.*

*Demonstrație* Fie  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  doi vectori liniar dependenți. În virtutea teoremei precedente, există un scalar nenul  $\lambda$  astfel încât  $\mathbf{a}_2 = \lambda \mathbf{a}_1$ , adică vectorii sunt coliniari.

Invers, să presupunem acum că vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  sunt coliniari. Dacă cel puțin unul dintre vectori este nul, de exemplu  $\mathbf{a}_2 = 0$ , atunci putem scrie

$$0\mathbf{a}_1 + 1\mathbf{a}_2 = 0,$$

adică vectorii sunt liniar dependenți. Presupunem acum că ambii vectori sunt nenuli. Alegem un punct  $O$  și construim punctele  $A_1$  și  $A_2$  astfel încât  $\overrightarrow{OA_1} + \mathbf{a}_1$  și  $\overrightarrow{OA_2} = \mathbf{a}_2$ . Datorită coliniarității vectorilor  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$ , punctele  $O$ ,  $A_1$  și  $A_2$  sunt pe o aceeași dreaptă,  $\Delta$ . Dacă  $A_1 = A_2$ , atunci, firește, vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  sunt egali, deci sunt liniar dependenți, deoarece unul dintre ei este o combinație liniară a celuilalt. Dacă  $A_1 \neq A_2$ , atunci fie  $\lambda = \|\mathbf{a}_2\|/\|\mathbf{a}_1\|$ . Dacă segmentele orientate  $\overrightarrow{OA_1}$  și  $\overrightarrow{OA_2}$  au același sens, atunci  $\mathbf{a}_2 = \lambda \mathbf{a}_1$ , în timp ce dacă ele au sensuri opuse, atunci  $\mathbf{a}_2 = -\lambda \mathbf{a}_1$ .  $\square$

**Consecința 1.2.** *Doi vectori sunt liniar independenți dacă și numai dacă ei nu sunt coliniari.*

Vectorii liniar independenți vor juca un rol esențial. În particular, ei ne furnizează descompuneri ale altor vectori. Un prototip de astfel de descompunere este dat de următoarea teoremă:

**Teorema 1.4.** *Să presupunem că într-un plan  $\Pi$  sunt dați doi vectori necoliniari  $\mathbf{e}_1$  și  $\mathbf{e}_2$ . Atunci orice alt vector  $\mathbf{a}$  din plan se poate descompune în funcție de vectorii  $\mathbf{e}_1$  și  $\mathbf{e}_2$ , cu alte cuvinte există două numere reale (unic determinate)  $x$  și  $y$  astfel încât*

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2. \quad (1.5.4)$$

*Demonstrație* Faptul că vectorii aparțin planului  $\Pi$  înseamnă că direcțiile lor sunt paralele cu planul sau, altfel spus, că dacă îi atașăm unui punct din plan, segmentele orientate care se obțin sunt conținute în plan. Fie, prin urmare,  $O$  un punct oarecare al planului. Aunci există (și sunt unice!) trei puncte  $E_1$ ,  $E_2$  și  $M$  din plan în așa fel încât

$$\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1, \quad \overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2, \quad \overrightarrow{OM} = \mathbf{a}.$$

Proiectând punctul  $M$  pe dreapta  $OE_1$ , paralel cu dreapta  $OE_2$ , obținem un punct  $M_1$ . Fie, pe de altă parte,  $M_2$  punctul ce se obține proiectând punctul  $M$  pe dreapta  $OE_2$ , paralel cu dreapta  $OE_1$ . Întrucât vectorii  $\overrightarrow{OE_1}$  și  $\overrightarrow{OM_1}$  sunt coliniari, iar  $\overrightarrow{OE_1} \neq 0$ , rezultă că există un număr real  $x$  astfel încât  $\overrightarrow{OM_1} = x\overrightarrow{OE_1}$ . În mod analog, există un  $y$  real astfel încât  $\overrightarrow{OM_2} = y\overrightarrow{OE_2}$ . Cum  $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2}$ , egalitatea (1.5.4) este verificată.

Mai rămâne să demonstrăm unicitatea numerelor reale  $x$  și  $y$ . Să presupunem că ar exista alte două numere reale,  $x'$  și  $y'$  astfel încât să avem

$$\mathbf{a} = x'\mathbf{e}_1 + y'\mathbf{e}_2. \quad (1.5.5)$$

Dacă scădem egalitatea (1.5.5) din egalitatea (1.5.4), obținem

$$(x - x')\mathbf{e}_1 + (y - y')\mathbf{e}_2 = 0. \quad (1.5.6)$$

Cum vectorii  $\mathbf{e}_1$  și  $\mathbf{e}_2$  sunt liniar independenți, obținem că  $x - x' = 0$  și  $y - y' = 0$ , adică  $x = x'$  și  $y = y'$ . □

Să vedem acum ce se întâmplă în cazul în care avem *trei* vectori. Avem următorul rezultat:

**Teorema 1.5.** *Pentru ca trei vectori să fie liniar dependenți este necesar și suficient ca ei să fie coplanari.*

*Demonstrație* Presupunem că vectorii

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \quad (1.5.7)$$

sunt liniar dependenți. Atunci cel puțin unul dintre ei se poate scrie ca o combinație liniară a celorlalți doi. Putem presupune, fără a reduce generalitatea, că acesta este cel de-al treilea vector. Prin urmare, există două numere reale  $\lambda_1$  și  $\lambda_2$  astfel încât să avem

$$\mathbf{a}_3 = \lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2. \quad (1.5.8)$$

Dacă atașăm vectorii unui punct  $O$ , obținem trei puncte  $M_1, M_2, M_3$  astfel încât

$$\overrightarrow{OM_1} = \mathbf{a}_1, \overrightarrow{OM_2} = \mathbf{a}_2, \overrightarrow{OM_3} = \mathbf{a}_3.$$

Dacă vectorii  $\overrightarrow{OM_1}$  și  $\overrightarrow{OM_2}$  sunt necoliniari, atunci punctele  $O, M_1, M_2$  sunt necoliniare, deci ele determină un plan  $\Pi$ . Datorită relației (1.5.8), vectorul  $\overrightarrow{OM_3}$  aparține, de asemenea, planului  $\Pi$ , prin urmare cei trei vectori sunt coplanari. Dacă vectorii  $\overrightarrow{OM_1}$  și  $\overrightarrow{OM_2}$  sunt coliniari, atunci din relația (1.5.8) rezultă că vectorul  $\overrightarrow{OM_3}$  este, de asemenea, coliniar cu ceilalți doi vectori, prin urmare, cu atât mai mult, cei trei vectori sunt coplanari.

Invers, să presupunem că vectorii (1.5.7) sunt coplanari. Să admitem, pentru început, că doi dintre vectori, de exemplu vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  nu sunt coliniari. Atunci, în virtutea teoremei 1.4, există două constante  $\lambda_1$  și  $\lambda_2$  astfel încât să avem

$$\mathbf{a}_3 = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2$$

și, prin urmare, vectorii (1.5.7) sunt liniar dependenți.

Dacă toți trei vectorii sunt coliniari, atunci avem, de exemplu,  $\mathbf{a}_1 = \lambda \mathbf{a}_2$ , relație care se poate rescrie sub forma

$$\mathbf{a}_1 = \lambda \mathbf{a}_2 + 0 \mathbf{a}_3,$$

adică, din nou, conchidem că cei trei vectori sunt coplanari.  $\square$

Drept consecință a acestei teoreme, putem conchide că *în spațiu există triplete de vectori liniar independenți*.

Și în spațiu avem un rezultat similar teoremei 1.4, adică:

**Teorema 1.6.** *Dacă vectorii*

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3 \tag{1.5.9}$$

*sunt liniar independenți și  $\mathbf{a}$  este un vector oarecare, atunci există trei numere reale,  $x, y, z$  astfel încât*

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3. \tag{1.5.10}$$

*Această descompunere a lui  $\mathbf{a}$  este unică.*

*Demonstrație* Alegem un punct oarecare  $O$  din spațiu și determinăm punctele  $E_1, E_2, E_3$  și  $M$  astfel încât să avem

$$\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1, \overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2, \overrightarrow{OE_3} = \mathbf{e}_3, \overrightarrow{OM} = \mathbf{a}.$$

Notăm cu  $M_1, M_2, M_3$  proiecțiile punctului  $M$  pe dreptele  $OE_1, OE_2, OE_3$ , paralel cu planele  $OE_2E_3, OE_1E_3$ , respectiv  $OE_1E_2$ . Se constată cu ușurință că

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} + \overrightarrow{OM_3}. \tag{1.5.11}$$

Cum vectorii  $\overrightarrow{OE_1}$  și  $\overrightarrow{OM_1}$  sunt coliniari și  $\overrightarrow{OE_1} \neq 0$ , rezultă că există un număr real  $x$  astfel încât  $\overrightarrow{OM_1} = x\overrightarrow{OE_1}$ . În mod analog, există numerele reale  $y$  și  $z$  astfel încât  $\overrightarrow{OM_2} = y\overrightarrow{OE_2}$  și  $\overrightarrow{OM_3} = z\overrightarrow{OE_3}$ . Unicitatea numerelor  $x, y, z$  se demonstrează ca și în cazul teoremei 1.4.  $\square$

Întrebarea naturală care se pune este: ce se întâmplă dacă avem mai mult de trei vectori? Răspunsul este dat de teorema care urmează.






Figura 1.1

**Teorema 1.7.** *Orice patru vectori sunt liniar dependenți.*

*Demonstrație* Presupunem că dintre cei patru vectori

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a} \tag{1.5.12}$$

trei sunt liniar independenți, de exemplu

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3. \tag{1.5.13}$$

Atunci, în virtutea teoremei 1.6, există trei numere reale  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  astfel încât

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3,$$

adică cei patru vectori sunt, într-adevăr, liniar dependenți.

Dacă vectorii (1.5.13) sunt liniar dependenți, adică între ei există o relație de forma

$$\mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \mu_3 \mathbf{a}_3 = 0, \tag{1.5.14}$$

unde nu toți coeficienții se anulează, această relație se poate rescrie sub forma

$$\mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \mu_3 \mathbf{a}_3 + 0\mathbf{a} = 0,$$

adică vectorii (1.5.12) sunt liniar dependenți. □

## 1.6 Orientarea sistemelor de doi și trei vectori liniar independenți

**Definiția 1.6.** Un sistem (ordonat) de vectori liniar independenți  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$  într-un plan se numește un sistem *drept* dacă atunci când atașăm cei doi vectori punctului  $O$  din plan,

adică alegem două puncte  $A_1$  și  $A_2$  din plan astfel încât  $\mathbf{a}_1 = \overrightarrow{OA_1}$  și  $\mathbf{a}_2 = \overrightarrow{OA_2}$ , când rotim vectorul  $\mathbf{a}_1$  în jurul punctului  $O$  pentru a-l aplica peste vectorul  $\mathbf{a}_2$  (ca direcție și sens), pe drumul cel mai scurt, rotația se face în sens trigonometric (invers sensului acelor de ceasornic).

Același sistem se numește *stâng* dacă rotația menționată mai sus se face în sensul acelor de ceasornic.




Figura 1.2

*Observație.* Este clar că dacă sistemul  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$  este drept, atunci sistemul  $\{\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1\}$  este stâng și viceversa.

**Definiția 1.7.** Fie  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$  un sistem ordonat de trei vectori linear independenți din spațiu. Fixăm, ca și mai sus, un punct  $O$  și alegem trei puncte  $A_1, A_2, A_3$  astfel încât să avem  $\mathbf{a}_i = \overrightarrow{OA_i}$ ,  $i = 1, 2, 3$ . Sistemul  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$  se numește *drept* dacă în planul  $OA_1A_2$ , văzut din punctul  $A_3$ , rotația în jurul punctului  $O$  care aplică  $A_1$  peste  $A_2$  pe cel mai scurt drum, se face în sens trigonometric. În caz contrar, adică dacă rotația se face în sensul acelor de ceasornic, sistemul se numește *stâng*.

*Observație.* Se poate constata imediat că dacă sistemul  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$  este drept, atunci tot drepte sunt și sistemele  $\{\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1\}$  și  $\{\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ , în timp ce sistemele  $\{\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1\}$ ,  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2\}$  și  $\{\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3\}$  sunt stângi.

## 1.7 Puncte și vectori. Rudimente de geometrie afină

După cum am văzut, mulțimea vectorilor liberi din plan (respectiv din spațiu) formează un spațiu vectorial real bidimensional (respectiv tridimensional). Pe de altă parte, dacă fixăm un punct  $O$  (fie în plan, fie în spațiu, nu contează), atunci fiecărui punct  $M$  putem să-i asociem, în mod unic, vectorul  $\overrightarrow{OM}$ , pe care îl vom numi *vectorul de poziție* al lui

$M$  (relativ la originea  $O$ ) sau *raza vectorie* a lui  $M$ . Dacă punctul  $O$  este subînțeles, atunci vom folosi, pur și simplu, notația  $\overrightarrow{OM} \equiv \mathbf{r}_M$  sau chiar  $\overrightarrow{OM} \equiv \mathbf{r}$ . Punctul  $O$  odată fixat, obținem o bijecție între mulțimea vectorilor liberi din plan (sau spațiu) și mulțimea punctelor din plan (sau spațiu).

În aparență, folosind această bijecție, putem transfera structura de spațiu vectorial de pe mulțimea vectorilor liberi pe mulțimea punctelor. Asta ar însemna să fim capabili să adunăm, de exemplu, punctele sau să le înmulțim cu scalari reali oarecare. Din păcate, acest lucru nu este posibil și vom explica, în cele ce urmează, de ce.

### 1.8 Coordonate pe dreaptă

Fie  $\Delta$  o dreaptă oarecare. Alegem pe ea un vector nenul oarecare,  $\mathbf{e}$ , pe care îl vom numi *vector unitar* sau *versor*.

Dacă acum  $\mathbf{a}$  este un vector oarecare de pe dreaptă, atunci, conform secțiunii precedente, există un singur număr real  $x$  astfel încât  $\mathbf{a} = x\mathbf{e}$ . Numărul  $x$  se numește *componenta* vectorului  $\mathbf{a}$ , relativ la dreapta  $\Delta$ , înzestrată cu versorul  $\mathbf{e}$ .

Alegem pe dreapta  $\Delta$ , înzestrată cu versorul  $\mathbf{e}$ , un punct  $O$ , pe care îl vom numi *originea coordonatelor*. Dreapta  $\Delta$  se va numi de-acum *axă de coordonate*. Dacă  $M$  este un punct oarecare al dreptei, vectorul  $\overrightarrow{OM}$  se va numi *rază vectorie* sau *vector de poziție* al punctului  $M$ , iar componenta acestui vector se numește *coordanata punctului*  $M$ .

Alegem, mai departe, punctul  $E$  pe dreaptă astfel încât să avem  $\overrightarrow{OE} = \mathbf{e}$ . Segmentul  $OE$  va fi ales ca scară a lungimilor pe dreapta  $\Delta$ . Prin urmare, coordonata unui punct  $M$  de pe dreaptă nu este altceva decât mărimea (OM) a segmentului orientat  $\overrightarrow{OM}$ . Pentru a scoate în evidență că numărul real  $x$  este coordonata punctului  $M$ , vom scrie, de regulă,  $M(x)$ . Trebuie remarcat că există o infinitate de moduri de a asocia coordonate



Figura 1.3

punctelor de pe dreaptă. Coordonata unui punct este unic determinată doar în momentul în care s-au ales:

- versorul drepte;
- originea drepte.

Datorită introducerii coordonatelor, fiecărui punct  $M$  de pe axa de coordonate  $\Delta$  i se pune în corespondență un singur număr real – coordonata sa  $x$ . Invers, pentru fiecare număr real

$x$  există un singur punct  $M$  de pe axa  $\Delta$  a cărei coordonată este  $x$ . Astfel, poziția fiecărui punct de pe axa de coordonate este unic determinată prin prescrierea coordonatei aceluși punct.

Notăm cu  $\rho(M_1, M_2)$  distanța dintre punctele  $M_1$  și  $M_2$ , adică lungimea segmentului  $M_1M_2$ . Această distanță se poate exprima cu ajutorul coordonatelor. Mai precis, avem următoarea teoremă:

**Teorema 1.8.** *Pentru orice puncte  $M_1(x_1)$  și  $M_2(x_2)$  de pe axa de coordonate au loc egalitățile:*

$$(M_1M_2) = x_2 - x_1, \quad (1.8.1)$$

$$\rho(M_1, M_2) = |x_2 - x_1|. \quad (1.8.2)$$

*Demonstrație* Din teorema lui Chasles rezultă că

$$(OM_1) + (M_1M_2) = (OM_2) \implies (M_1M_2) = (OM_2) - (OM_1).$$

Utilizând definiția coordonatelor, obținem egalitatea (1.8.1). Formula (1.8.2) rezultă imediat din formula (1.8.1).  $\square$

## 1.9 Coordonate în plan

### 1.9.1 Coordonate afine

Peste tot în această secțiune vom considera că toate punctele și toți vectorii se află într-un plan  $\Pi$ .

**Definiția 1.8.** Fie  $O$  un punct și  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$  – doi vectori liniar independenți (necoliniari) din planul  $\Pi$ . Tripletul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$  se numește *reper afin* sau *sistem de coordonate afin* în planul  $\Pi$ .

Atașăm vectorii  $\mathbf{e}_1$  și  $\mathbf{e}_2$  punctului  $O$ , construind punctele  $E_1$  și  $E_2$  astfel încât  $\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1$  și  $\overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2$ . Segmentele orientate  $\overline{OE_1}$  și  $\overline{OE_2}$  definesc două axe de coordonate,  $Ox$  și  $Oy$ . Punctul  $O$  se numește *originea coordonatelor*, iar vectorii  $\mathbf{e}_1$  și  $\mathbf{e}_2$  – *vectorii bazei*.

Fie acum  $\mathbf{a}$  un vector oarecare din planul  $\Pi$ . Din teorema 1.4 rezultă că  $\mathbf{a}$  se poate reprezenta în mod unic sub forma

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2. \quad (1.9.1)$$

**Definiția 1.9.** Coeficienții  $x$  și  $y$  din descompunerea (1.9.1) se numesc *componentele* vectorului  $\mathbf{a}$  relativ la sistemul de coordonate  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ .

După cum s-a văzut în secțiunea 1.4,  $x$  și  $y$  sunt, de fapt, magnitudinile proiecțiilor vectorului  $\mathbf{a}$  pe axele  $Ox$  și  $Oy$ , paralel cu axele  $OY$ , respectiv  $Ox$ . Pentru a scoate în evidență faptul că  $x$  și  $y$  sunt componentele vectorului  $\mathbf{a}$  vom scrie  $\mathbf{a} = \mathbf{a}(x, y)$  sau, pur și simplu,  $\mathbf{a}(x, y)$ .

Fie, acum,  $M$  un punct oarecare al planului  $\Pi$ , în care s-a fixat un sistem de coordonate afine  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ . Vectorul  $\overrightarrow{OM}$  se numește *raza vectoroare* sau *vectorul de poziție* al punctului  $M$ .

**Definiția 1.10.** Componentele  $x$  și  $y$  ale vectorului  $\overrightarrow{OM}$  se numesc *coordoanate afine* ale punctului  $M$  relativ la reperul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ . De regulă,  $x$  se numește *abscisă*, în timp ce  $y$  se numește *ordonată*.

Un sistem de coordonate afine se mai notează și cu  $Oxy$ , dacă vectorii bazei sunt subînțeleși. Dacă  $x$  și  $y$  sunt coordonatele unui punct  $M$ , vom utiliza în mod frecvent notația  $M(x, y)$ .

Introducerea componentelor vectorilor permite înlocuirea diferitelor relații dintre vectori cu relații între componentele lor. Avem, de exemplu:

**Teorema 1.9.** *Componentele unei combinații liniare de vectori sunt egale cu aceeași combinație liniară a componentelor vectorilor. Mai precis, dacă*

$$\mathbf{a}(X, Y) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{a}_i(X_i, Y_i),$$

atunci

$$X = \sum_{i=1}^k \lambda_i X_i, \quad Y = \sum_{j=1}^k \lambda_j Y_j.$$

*Demonstrație* Cum componentele vectorilor nu sunt altceva decât magnitudinile proiecțiilor acestor vectori pe axele de coordonate, teorema rezultă direct din proprietățile proiecțiilor. □

**Consecința 1.3.** *Dacă  $X(x_1, y_1)$  și  $B(x_2, y_2)$  sunt două puncte din plan, atunci*

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}(x_2 - x_1, y_2 - y_1),$$

*adică* pentru a obține componentele vectorului definit de segmentul orientat  $\overrightarrow{AB}$ , trebuie să scădem din coordonatele extremității sale coordonatele originii.

*Demonstrație* Rezultă imediat din teorema precedentă și din relația

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}.$$

□

**Consecința 1.4.** Pentru ca doi vectori  $\mathbf{a}(x_1, y_1)$  și  $\mathbf{b}(x_2, y_2)$  să fie coliniari, este necesar și suficient ca ei să aibă componentele corespunzătoare proporționale.

*Demonstrație* După cum am văzut în secțiunea 1.5, vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt coliniari dacă și numai dacă între ei există o relație de forma

$$\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}, \quad (1.9.2)$$

cu  $\lambda$  real. Din teorema 1.9 rezultă că egalitatea (1.9.2) este echivalentă cu două egalități numerice:

$$x_2 = \lambda x_1, \quad y_2 = \lambda y_1, \quad (1.9.3)$$

ceea ce încheie demonstrația. Remarcăm că egalitățile (1.9.3) implică și egalitatea

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1},$$

cu condiția ca ambii numitori să fie diferiți de zero. Menționăm, pe de altă parte, că se poate utiliza convenția că de fiecare dată când un numitor este zero, se admite că și numărătorul care îi corespunde este zero, ceea ce înseamnă că, formal, putem scrie egalitatea precedentă și când unul dintre numitori se anulează. □

**Consecința 1.5.** Coordonatele mijlocului  $A$  al unui segment de dreaptă cu capetele în punctele  $A_1(x_1, y_1)$  și  $A_2(x_2, y_2)$  sunt

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

*Demonstrație* Rezultă imediat din egalitatea

$$\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2})$$

(vezi figura 1.4) și din teoremă. □




Figura 1.4

### 1.9.2 Coordonate rectangulare

Presupunem că în planul  $\Pi$  a fost aleasă o unitate de măsură pentru lungime. Alegem un punct  $O$  și doi vectori de lungime 1, perpendiculari unul pe celălalt,  $\mathbf{i}$  și  $\mathbf{j}$ . Sistemul afin de coordonate  $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j})$  se numește *sistem de coordonate rectangular* sau *cartezian*. Despre baza  $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$  vom spune că este *ortonormată* (ceea ce înseamnă că vectorii sunt *ortogonali*, adică perpendiculari și “normați”, adică de lungime 1).

Toate proprietățile valabile într-un sistem de coordonate afin oarecare rămân adevărate și într-un sistem rectangular, dar, de regulă, expresiile care intervin sunt mult mai simple atunci când sunt scrise în coordonate carteziene.

### 1.9.3 Coordonate polare

Alegem în planul  $\Pi$  un punct  $O$ , pe care îl numim *pol* și o semidreaptă  $OA$ , pe care o vom numi *axă polară*. Mai alegem o unitate de măsură pentru lungime și, în fine, un sens pozitiv de rotație în jurul polului  $O$ . De regulă, sensul pozitiv este sensul invers mersului acelor de ceasornic. Unghiurile se măsoară în radiani.

Fie acum  $M$  un punct oarecare al planului. Vom nota cu  $\rho$  distanța de la  $M$  la polul  $O$  și cu  $\varphi$  mărimea unghiului dintre semidreptele  $OM$  și  $OA$ . Mărimile  $\rho$  și  $\varphi$  se numesc *coordonate polare* ale punctului  $M$ . Mai precis,  $\rho$  se numește *rază polară*, în timp ce  $\varphi$  se numește *unghi polar*. Fiecărui punct din plan i se poate atașa, în mod unic, o rază polară  $\rho \geq 0$ . Valorile lui  $\varphi$ , în schimb, pentru puncte diferite de pol, sunt definite până la un termen  $2k\pi$ , unde  $k$  este un număr întreg. Pentru ca fiecărui punct din plan, diferit de pol, să i se asocieze un singur unghi polar, este suficient să considerăm că  $-\pi < \varphi \leq \pi$ . Aceste valori ale lui  $\varphi$  se numesc *principale*. Vom spune acum că am introdus în plan *un sistem de coordonate polare*.

Considerăm în plan, simultan, un sistem de coordonate carteziene  $Oxy$  și un sistem de coordonate polare astfel încât polul să coincidă cu originea coordonatelor carteziene, iar axa polară să coincidă cu direcția pozitivă a axei  $Ox$ . În sfârșit, vom considera ca sens pozitiv de rotație în jurul polului acel sens în care trebuie să rotim direcția pozitivă a axei




Figura 1.5

Ox, pentru a o suprapune, pe drumul cel mai scurt, peste direcția pozitivă a axei Oy.

Fie M un punct oarecare din plan (diferit de origine),  $x, y$  – coordonatele sale carteziene, iar  $\rho, \varphi$  – coordonatele sale polare. Avem, în mod evident:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi. \quad (1.9.4)$$

Formulele (1.9.4) exprimă coordonatele carteziene ale punctului M în funcție de coordonatele sale polare. Pentru exprimarea coordonatelor polare în funcție de cele carteziene, din nou, în ipoteza că punctul M nu coincide cu polul, se pot folosi formulele următoare, care rezultă imediat din (1.9.4):

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Dacă  $x \neq 0$  (adică dacă M nu este situat pe axa Oy, atunci putem scrie

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}.$$

Din această ecuație noi trebuie să obținem unghiul  $\varphi$ . După cum se știe din trigonometrie, soluția generală a ecuației de mai sus este

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

unde  $\operatorname{arctg} \frac{y}{x} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ . Vom alege numărul întreg  $k$  astfel încât unghiul  $\varphi$  să fie în intervalul  $(-\pi, \pi)$ . Distingem patru cazuri, în funcție de cadranul în care se află punctul M.



- (1) Dacă  $M$  se află în primul cadran, atunci  $x > 0, y \geq 0$ , prin urmare  $\operatorname{arctg}(y/x) \in [0, \frac{\pi}{2})$ . Cum  $\varphi$  trebuie să se afle în același interval, putem alege  $k = 0$ , deci

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}.$$

- (2) Dacă  $M$  se află în cel de-al doilea cadran, adică  $x < 0, y \geq 0$ , atunci  $\operatorname{arctg}(y/x) \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ . Cum  $\varphi$  trebuie să fie în intervalul  $(\frac{\pi}{2}, \pi]$ ,  $k$  trebuie să fie egal cu 1, deci

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + \pi.$$

- (3) Dacă  $M$  se află în cel de-al treilea cadran, adică  $x < 0, y < 0$ , atunci  $\operatorname{arctg}(y/x) \in [0, \frac{\pi}{2})$ . Cum  $\varphi$  trebuie să fie în intervalul  $[-\pi, -\frac{\pi}{2})$ ,  $k$  trebuie să fie egal cu -1, deci

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} - \pi.$$

- (4) Dacă  $M$  se află în cel de-al patrulea cadran, adică  $x > 0, y < 0$ , atunci  $\operatorname{arctg}(y/x) \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ . Cum  $\varphi$  trebuie să fie în intervalul  $(-\frac{\pi}{2}, 0]$ ,  $k$  trebuie să fie egal cu 0, deci

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}.$$

## 1.10 Coordonate în spațiu

### 1.10.1 Coordonate afine și rectangulare

Fie  $O$  un punct oarecare al spațiului și  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  – trei vectori liniar independenți (adică necoplanari).

**Definiția 1.11.** Cuadrupletul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  se numește *reper afin* sau *sistem de coordonate afine* în spațiu. Punctul  $O$  se numește *originea coordonatelor*, iar vectorii  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  se numesc *vectorii bazei*.

**Definiția 1.12.** Se numesc *componente* ale unui vector  $\mathbf{a}$  relativ la reperul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  coeficienții  $x, y, z$  ai descompunerii:

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3.$$

*Coordonatele* unui punct  $M$ , relativ la același reper sunt, prin definiție, componentele  $x, y, z$  ale vectorului său de poziție,  $\overrightarrow{OM}$ . Coordonata  $x$  se numește *abscisă*, coordonata  $y$  – *ordonată*, iar coordonata  $z$  – *cotă*.

Un sistem de coordonate afin se mai notează cu  $Oxyz$ , dacă vectorii bazei sunt subînțeleși. Construim punctele  $E_1, E_2, E_3$  astfel încât

$$\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1, \overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2, \overrightarrow{OE_3} = \mathbf{e}_3. \quad (1.10.1)$$

Segmentele orientate  $\overline{OE_1}, \overline{OE_2}$  și  $\overline{OE_3}$  determină cele trei *axe de coordonate*,  $Ox, Oy$  și  $Oz$ . Cele trei plane determinate de câte două axe de coordonate se numesc *plane de coordonate*. Aceste plane împart spațiul în opt zone, care se numesc *octanți de coordonate*.

Ca și în cazul reperelor plane, distingem sisteme de coordonate *drepte* și *stângi*. Considerăm un triplet de vectori necoplanari  $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ . Atașăm acești vectori unui punct  $O$ , adică determinăm punctele  $E_1, E_2, E_3$ , astfel încât să fie verificate relațiile (1.10.1). Rotim segmentul orientat  $\overline{OE_1}$ , în planul  $OE_1E_2$ , în jurul lui  $O$ , pe cel mai scurt drum, până când el coincide, ca direcție și sens, cu segmentul orientat  $\overline{OE_2}$ . Dacă această rotație, privită din extremitatea segmentului orientat  $\overline{OE_3}$  (cu alte cuvinte, din punctul  $E_3$ ) se produce în sensul invers mersului acelor de ceasornic, vom spune că tripletul de vectori  $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  este *drept*, altfel vom spune că este *stâng*.

Un sistem de coordonate  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  se numește *drept* sau *stâng*, după cum tripletul  $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  este drept sau stâng. Peste tot, în cele ce urmează, sistemele de coordonate vor fi totdeauna drepte, dacă nu se menționează altfel.

Cel mai simplu dintre sistemele de coordonate affine în spațiu este sistemul de coordonate rectangular sau cartezian. Presupunem că în spațiu s-a ales o unitate de măsură pentru lungime. Atunci un sistem de coordonate rectangular sau cartezian în spațiu este determinat de alegerea unui punct  $O$  și a trei vectori de lungime 1,  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ , perpendiculari între ei.

Teorema 1.9 și consecințele sale se pot adapta fără probleme la cazul spațiului, singura diferență fiind faptul că se mai adaugă încă o coordonată.

### 1.10.2 Coordonate cilindrice

Alegem o unitate de măsură pentru lungime în spațiu. Alegem un plan oarecare,  $\Pi$  și în acest plan alegem un punct  $O$  și o semidreaptă  $Ox$ , care pleacă din acest punct. Alegem un sens de rotație pozitiv în planul  $\Pi$ , în jurul punctului  $O$ . Atunci în planul  $\Pi$  este definit un sistem de coordonate polar, în care polul este  $O$ , iar axa polară este  $Ox$ . În sfârșit, alegem o axă  $OZ$ , perpendiculară pe planul  $\Pi$  și orientată astfel încât rotația pozitivă din planul  $\Pi$ , privită din direcția pozitivă a axei  $Oz$  să se producă în sens invers mersului acelor de ceasornic.

Fie, acum,  $M$  un punct oarecare din spațiu,  $M_1$  – proiecția sa ortogonală pe planul  $\Pi$  și  $M_z$  – proiecția ortogonală a punctului  $M$  pe axa  $Oz$ .

*Coordonatele cilindrice* ale punctului  $M$  sunt trei numere  $\rho, \varphi, z$ , unde  $\rho, \varphi$  sunt coordonatele polare ale punctului  $M_1$  în planul  $\Pi$ , iar  $z = (OM)$ . Denumirea de “coordo-nate cilindrice” este legată de faptul că suprafața ce conține toate punctele corespunzând aceleiași valori a coordonatei  $\rho$  este un cilindru. Fiecărui punct din spațiu  $i$  se pot asocia coordonate  $\rho$  și  $z$  unice, iar  $\rho$  este întotdeauna pozitivă. Valoarea lui  $\varphi$  este definită doar pentru puncte ce nu se află pe axa  $Oz$  și, ca și în cazul coordonatelor polare, este definită până la un multiplu întreg de  $\pi$ . Dacă în spațiu este dat și un sistem de coordonate cartezian, cu originea în  $O$  și astfel încât axele  $Ox$  și  $Oz$  să coiucidă cu axele cu același nume ale sistemului cilindric, atunci coordonatele carteziene se pot exprima în funcție de cele cilindrice prin relațiile:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z.$$




Figura 1.6

### 1.10.3 Coordonate sferice

Pentru introducerea coordonatelor sferice este necesar, ca și în cazul coordonatelor cilindrice, să alegem o unitate de măsură pentru lungime, un plan  $\Pi$ , cu un punct  $O$  și o axă  $Ox$ , precum și a unei axe  $Oz$ .

Fie  $M$  un punct oarecare din spațiu, iar  $M_1$  – proiecția sa ortogonală pe planul  $\Pi$ . Fie, mai departe,  $\rho$  – distanța de la punctul  $M$  la punctul  $O$ ;  $\theta$  – unghiul dintre axa  $Oz$  și segmentul orientat  $\overline{OM}$  și, în fine,  $\varphi$  – unghiul cu care trebuie rotită axa  $Ox$  în așa fek

încât să coincidă cu semidreapta  $OM_1$ . Numerele  $\rho, \theta, \varphi$  se numesc *coordonate sferice* ale punctului  $M$ . Unghiul  $\varphi$  se numește *longitudine*, iar unghiul  $\theta$  – *latitudine*.

Denumirea de “coordonate sferice” provine din faptul că suprafața ce conține toate punctele cu o aceeași valoare a coordonatei  $\rho$  este o sferă. Fiecărui punct al spațiului, diferit de  $O$ , îi corespund valori bine definite ale coordonatelor  $\rho$  și  $\theta$ .  $\rho$  este întotdeauna strict pozitivă, iar unghiul  $\theta$  se consideră a varia în intervalul  $[0, \pi]$ . Valoarea lui  $\varphi$  nu este definită pentru punctele de pe axa  $Oz$ . Acolo unde este definită, ca și în cazul coordonatelor polare, această valoare este definită doar până la un multiplu întreg de  $\pi$ . Ca și în cazul coordonatelor cilindrice, dacă alegem și un sistem de coordonate cartezian în așa fel încât originile celor două sisteme să coincidă, ca și axele  $Ox$  și  $Oz$ , atunci coordonatele carteziene se exprimă în funcție de cele sferice prin relațiile:

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi, \quad z = \rho \cos \theta.$$

## 1.11 Transformări de coordonate

### 1.11.1 Coordonate afine

Considerăm, în plan, două sisteme de coordonate afine,  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$  și  $(O', \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2)$ . Primul sistem îl vom numi *sistemul vechi*, iar cel de-al doilea – *sistemul nou*. Presupunem că se cunosc coordonatele punctului  $O'$ , precum și componentele vectorilor  $\mathbf{e}'_1$  și  $\mathbf{e}'_2$  relativ la sistemul vechi:

$$O'(\alpha_1, \alpha_2), \quad \mathbf{e}'_1(\alpha_{11}, \alpha_{21}), \quad \mathbf{e}'_2(\alpha_{12}, \alpha_{22}).$$

Presupunem acum că un punct oarecare  $M$  din plan are coordonatele vechi  $x$  și  $y$  și coordonatele noi  $x'$  și  $y'$ . Vrem să găsim o relație între cele două perechi de coordonate ale acestui punct. Avem, înainte de toate,

$$\begin{cases} \mathbf{e}'_1 = \alpha_{11}\mathbf{e}_1 + \alpha_{21}\mathbf{e}_2 & \mathbf{e}'_2 = \alpha_{12}\mathbf{e}_1 + \alpha_{22}\mathbf{e}_2 \\ \overrightarrow{OO'} = \alpha_1\mathbf{e}_1 + \alpha_2\mathbf{e}_2, & \overrightarrow{OM} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2, \quad \overrightarrow{O'M} = x'\mathbf{e}'_1 + y'\mathbf{e}'_2. \end{cases} \quad (1.11.1)$$

Mai departe,

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}.$$

Din această egalitate, utilizând formulele (1.11.1), obținem

$$\begin{aligned} x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 &= \alpha_1\mathbf{e}_1 + \alpha_2\mathbf{e}_2 + x'(\alpha_{11}\mathbf{e}_1 + \alpha_{21}\mathbf{e}_2) + y'(\alpha_{12}\mathbf{e}_1 + \alpha_{22}\mathbf{e}_2) \\ &= (\alpha_{11}x' + \alpha_{12}y' + \alpha_1)\mathbf{e}_1 + (\alpha_{21}x' + \alpha_{22}y' + \alpha_2)\mathbf{e}_2. \end{aligned}$$

În virtutea teoremei 1.4, obținem atunci formulele de transformare

$$\begin{cases} x = \alpha_{11}x' + \alpha_{12}y' + \alpha_1 \\ y = \alpha_{21}x' + \alpha_{22}y' + \alpha_2 \end{cases} . \quad (1.11.2)$$

Dacă în raționamentele precedente schimbăm între ele coordonatele vechi și cele noi, obținem formulele de transformare

$$\begin{cases} x' = \beta_{11}x + \beta_{12}y + \beta_1 \\ y' = \beta_{21}x + \beta_{22}y + \beta_2 \end{cases} , \quad (1.11.3)$$

unde

$$O(\beta_1, \beta_2), \mathbf{e}_1(\beta_{11}, \beta_{21}), \mathbf{e}_2(\beta_{12}, \beta_{22}).$$

Se poate constata cu ușurință că  $\alpha_i = -\beta_i$ ,  $i = 1, 2$  și că matricea

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}$$

este inversa matricii

$$B = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{pmatrix} .$$

Considerăm acum, alături de punctul  $M$ , încă un punct,  $N$ , ale cărui coordonate vechi și noi le vom nota, respectiv, cu  $x_1, y_1$  și  $x'_1, y'_1$ . Atunci, din formulele (1.11.2), obținem

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_{11}x'_1 + \alpha_{12}y'_1 + \alpha_1 \\ y_1 = \alpha_{21}x'_1 + \alpha_{22}y'_1 + \alpha_2 \end{cases} . \quad (1.11.4)$$

După cum se știe, componentele (vechi și noi) ale vectorului  $\overrightarrow{MN}$  vor fi date de

$$\begin{aligned} X &= x_1 - x, & Y &= y_1 - y \\ X' &= x'_1 - x', & Y' &= y'_1 - y'. \end{aligned}$$

Utilizând formulele (1.11.2) și (1.11.4), obținem formulele de transformare pentru componentele unui vector:

$$\begin{aligned} X &= \alpha_{11}X' + \alpha_{12}Y', \\ Y &= \alpha_{21}X' + \alpha_{22}Y'. \end{aligned}$$

Transformările de coordonate în spațiu se scriu în mod absolut analog. Fie  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  și  $(O', \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$  două sisteme de coordonate afine în spațiu (cel vechi și cel nou). Presupunem, de asemenea, ca și mai înainte, că se cunosc coordonatele noii origini și componentele vectorilor noii baze relativ la vechea bază:

$$\begin{aligned} O' &(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad \mathbf{e}'_1(\alpha_{11}, \alpha_{21}, \alpha_{31}), \\ \mathbf{e}'_2 &(\alpha_{12}, \alpha_{22}, \alpha_{32}), \quad \mathbf{e}'_3(\alpha_{13}, \alpha_{23}, \alpha_{33}). \end{aligned}$$

Atunci vechile coordonate se exprimă în funcțiile de cele noi prin formulele:

$$\begin{cases} x = \alpha_{11}x' + \alpha_{12}y' + \alpha_{13}z' + \alpha_1 \\ y = \alpha_{21}x' + \alpha_{22}y' + \alpha_{23}z' + \alpha_2 \\ z = \alpha_{31}x' + \alpha_{32}y' + \alpha_{33}z' + \alpha_3 \end{cases} .$$

Cu ajutorul unor formule analoage se exprimă și coordonatele noi în funcție de coordonatele vechi. În ceea ce privește regulile de transformare a componentelor vectorilor, se obține:

$$\begin{aligned} X &= \alpha_{11}X' + \alpha_{12}Y' + \alpha_{13}Z', \\ Y &= \alpha_{21}X' + \alpha_{22}Y' + \alpha_{23}Z', \\ Z &= \alpha_{31}X' + \alpha_{32}Y' + \alpha_{33}Z'. \end{aligned}$$

### 1.11.2 Coordonate rectangulare în plan

Considerăm acum cazul particular al transformărilor de coordonate în plan, când ambele sisteme de coordonate, atât cel vechi cât și cel nou, sunt ortogonale. Vom nota sistemul de coordonate vechi cu  $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j})$ , iar cel nou – cu  $(O', \mathbf{i}', \mathbf{j}')$ .

Vom distinge două cazuri, după cum rotațiile pe drumul cel mai scurt de la  $\mathbf{i}$  la  $\mathbf{j}$  și de la  $\mathbf{i}'$  la  $\mathbf{j}'$  se fac:

- în aceeași direcție (fie ambele în sensul acelor de ceasornic, fie ambele în sens opus mersului acelor de ceasornic);
- în direcții opuse.

În ambele cazuri vom nota cu  $\varphi$  unghiul dintre vectorii  $\mathbf{i}$  și  $\mathbf{i}'$ , în sensul celei mai scurte rotații de la  $\mathbf{i}$  la  $\mathbf{j}$ . Dacă notăm cu  $\psi$  unghiul dintre vectorii  $\mathbf{i}$  și  $\mathbf{j}'$ , atunci în primul caz avem

$$\psi = \varphi + \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

în timp ce în cel de-al doilea caz avem

$$\psi = \varphi - \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

În ambele cazuri, avem următoarele expresii pentru componentele vectorilor  $\mathbf{i}'$  și  $\mathbf{j}'$ :

$$\alpha_{11} = \cos \varphi, \quad \alpha_{21} = \sin \varphi, \quad \alpha_{12} = \cos \psi, \quad \alpha_{22} = \sin \psi.$$

În primul caz, formulele (1.11.2) capătă forma

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi + \alpha_1, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi + \alpha_2, \end{cases} \quad (1.11.5)$$

în timp ce în al doilea caz, avem:

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi + y' \sin \varphi + \alpha_1, \\ y = x' \sin \varphi - y' \cos \varphi + \alpha_2. \end{cases}$$

Sunt interesante următoarele două cazuri particulare importante ale formulelor (1.11.5):

1. Presupunem că  $\mathbf{i} = \mathbf{i}'$  și  $\mathbf{j} = \mathbf{j}'$ . Atunci formulele (1.11.5) capătă forma:

$$\begin{cases} x = x' + \alpha_1, \\ y = y' + \alpha_2 \end{cases}$$

și se numesc *formulele de transformare a coordonatelor prin transportul paralel (translația) axelor de coordonate cu vectorul  $\mathbf{a}(\alpha_1, \alpha_2)$* .

2. Dacă  $O' = O$ , atunci formulele (1.11.5) capătă forma:

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi, \end{cases}$$

și se numesc *formulele de transformare a coordonatelor prin rotația sistemului în jurul originii cu unghiul  $\varphi$* .

## 1.12 Produsul scalar al vectorilor

### 1.12.1 Definiție și proprietăți fundamentale

**Definiția 1.13.** Fie  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  doi vectori. Se numește *produs scalar* al celor doi vectori numărul real, notat  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ , egal cu produsul dintre normele celor doi vectori și al cosinusului unghiului dintre ei, adică:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cos \varphi, \quad (1.12.1)$$

unde  $\varphi$  este unghiul dintre cei doi vectori.

Alegem un punct oarecare  $O$  în spațiu și construim un segment orientat  $\overrightarrow{OA}$  astfel încât

$$\overrightarrow{OA} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}.$$

Notăm cu  $\Delta$  axa definită de segmentul orientat  $\overrightarrow{OA}$ . Atunci

$$\|\mathbf{b}\| \cos \varphi = \text{pr}_{\Delta} \mathbf{b},$$

unde proiecția este ortogonală. Prin urmare, formula (1.12.1) se poate rescrie sub forma

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \text{pr}_{\Delta} \mathbf{b}. \quad (1.12.2)$$

Denumirea de “produs scalar” este legată atât de faptul că rezultatul produsului scalar este un număr, cât și de faptul că acest tip de produs are anumite proprietăți comune cu produsul numerelor reale, deși, după cum vom vedea mai jos, există diferențe esențiale între cele două tipuri de produse.

Vom enumera, în cele ce urmează, principalele proprietăți ale produsului scalar și le vom demonstra pe cele care nu sunt chiar evidente.

1) comutativitatea:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}. \quad (1.12.3)$$

Această proprietate rezultă direct din definiția produsului scalar;

2) compatibilitatea cu înmulțirea vectorilor cu scalari:

$$(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \quad (1.12.4)$$

$$\mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \quad (1.12.5)$$

Este clar că, datorită comutativității produsului scalar, dacă una dintre cele două relații are loc, atunci are loc și cealaltă, așa că este suficient să demonstrăm una dintre ele, de exemplu (1.12.5). Utilizând formula (1.12.2) și proprietățile proiecției, obținem succesiv:

$$\mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \text{pr}_{\Delta}(\lambda \mathbf{b}) = \lambda \|\mathbf{a}\| \text{pr}_{\Delta} \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$



3) distributivitatea față de adunarea vectorilor:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}, \quad (1.12.6)$$

$$(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}. \quad (1.12.7)$$

Din nou, datorită comutativității, este suficient să demonstrăm prima afirmație. Vom utiliza, și de data aceasta, reprezentarea (1.12.2) a produsului scalar, precum și proprietățile proiecției. Avem, așadar,

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \|\mathbf{a}\| \operatorname{pr}_{\Delta}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \|\mathbf{a}\| \operatorname{pr}_{\Delta} \mathbf{b} + \|\mathbf{a}\| \operatorname{pr}_{\Delta} \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}.$$

Pe baza acestor trei proprietăți, putem trage concluzia că înmulțirea combinațiilor liniare de vectori se poate face termen cu termen, ca în exemplul următor:

$$(2\mathbf{a} + 3\mathbf{b})(4\mathbf{c} - 5\mathbf{d}) = 8\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} - 10\mathbf{a} \cdot \mathbf{d} + 12\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - 15\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}.$$

Ultimele două proprietăți au un caracter oarecum mai “geometric”.

4) Doi vectori  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt perpendiculari dacă și numai dacă produsul lor scalar este egal cu zero:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0. \quad (1.12.8)$$

Într-adevăr, începem prin a scrie relația (1.12.8) sub forma

$$\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \varphi = 0. \quad (1.12.9)$$

Dacă vectorii sunt perpendiculari, atunci  $\varphi = \pi/2$ , deci  $\cos \varphi = 0$ , de unde  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ . Invers, să presupunem acum că vectorii verifică relația (1.12.9). Dacă unul dintre vectori este egal zero, atunci el poate fi considerat pe orice alt vector, deci condiția este îndeplinită. Dacă ambii vectori sunt nenuli, atunci și normele lor sunt nenule, deci relația (1.12.9) poate fi îndeplinită doar dacă  $\cos \varphi = 0$ , adică dacă cei doi vectori sunt perpendiculari.

Remarcăm că proprietatea 4) marchează o diferență esențială dintre produsul scalar al vectorilor și produsul numerelor reale. Astfel, produsul a două numere reale poate fi egal cu zero dacă și numai dacă cel puțin unul dintre numere este egal cu zero. Produsul scalar a doi vectori, în schimb, poate fi egal cu zero și dacă ambii vectori sunt diferiți de zero.

5) Produsul scalar a unui vector cu el însuși este egal cu pătratul normei acestui vector:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2. \quad (1.12.10)$$

Afirmația rezultă imediat din definiția produsului scalar a doi vectori (în acest caz, firește,  $\varphi = 0$ ).

*Observație.* Trebuie să remarcăm, pentru evitarea confuziilor, că nu are sens să vorbim de produse scalare de mai mult de doi factori. Produsul scalar a doi vectori este un scalar, prin urmare acest produs nu mai poate fi înmulțit scalar, la rândul său, cu un al treilea vector. Acesta este motivul pentru care nu are sens să ne punem măcar problema asociativității produsului scalar al vectorilor liberi.

### 1.12.2 Exprimarea produsului scalar în coordonate

Alegem, în spațiu, un sistem de coordonate rectangular, cu originea într-un punct  $O$ . Fie  $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$  baza ortonormată care generează acest sistem de coordonate. Faptul că baza este ortonormată înseamnă, reamintim, că toți vectorii au lungime 1, iar vectorii sunt perpendiculari unii pe alții. Din proprietățile produsului scalar, descrise mai sus, se constată imediat că produsele scalare dintre vectorii bazei sunt date de următoarea tablă de multiplicare:

$$\begin{array}{c|ccc} \cdot & \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \hline \mathbf{i} & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{j} & 0 & 1 & 0 \\ \mathbf{k} & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad (1.12.11)$$

Presupunem acum că se dau doi vectori  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$ , care au următoarele expresii în raport cu baza de coordonate:

$$\mathbf{a} = X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}.$$

Utilizând tabla de înmulțire scalară (1.12.11) a vectorilor bazei, produsul scalar dintre  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  va fi

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= (X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}) \cdot (X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}) = XX'\mathbf{i}^2 + XY'\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + \\ &+ XZ'\mathbf{i} \cdot \mathbf{k} + YX'\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + YY'\mathbf{j}^2 + YZ'\mathbf{j} \cdot \mathbf{k} + ZX'\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + ZZ'\mathbf{k}^2 = \\ &= XX' + YY' + ZZ'. \end{aligned}$$

Așadar, produsul scalar a doi vectori, dați prin componentele lor relativ la un sistem de coordonate rectangular  $Oxyz$ , se exprimă prin formula

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = XX' + YY' + ZZ'. \quad (1.12.12)$$

Cu această expresie, condiția de ortogonalitate a vectorilor  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  se va scrie, prin urmare,

$$XX' + YY' + ZZ' = 0. \quad (1.12.13)$$

De asemenea, combinând formulele (1.12.10) și (1.12.12), obținem pentru lungimea vectorului  $\mathbf{a}$  formula

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}. \quad (1.12.14)$$

Să presupunem acum că se dau două puncte din spațiu prin coordonatele lor carteziene ortogonale,  $M(x, y, z)$  și  $M'(x', y', z')$ . După cum se știe, distanța  $d(M, M')$  dintre cele

două puncte este egală cu lungimea vectorului  $\overrightarrow{MM'}$  ( $x' - x, y' - y, z' - z$ ), adică este dată de formula

$$d(M, M') = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}.$$

În sfârșit, utilizând formulele (1.12.1), (1.12.12) și (1.12.14), putem stabili o formulă pentru calculul cosinusului unghiului format de vectorii  $\mathbf{a}(X, Y, Z)$  și  $\mathbf{b}(X', Y', Z')$ , dați prin componentele lor relativ la o bază ortonormată:

$$\cos \varphi = \frac{XX' + YY' + ZZ'}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \sqrt{X'^2 + Y'^2 + Z'^2}}.$$

## 1.13 Produsul vectorial al vectorilor

### 1.13.1 Definiție și proprietăți fundamentale

**Definiția 1.14.** Produsul vectorial dintre vectorul  $\mathbf{a}$  și vectorul  $\mathbf{b}$  este, prin definiție, vectorul, notat prin  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ , determinat prin următoarele condiții:

- 1) dacă vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt coliniari, atunci, prin definiție, produsul lor vectorial  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  este egal cu zero.
- 2) dacă cei doi vectori nu sunt coliniari, adică fac între ei un unghi  $\varphi$ , cu  $0 < \varphi < \pi$ , atunci produsul lor vectorial se definește prin următoarele trei condiții:
  - (i) lungimea vectorului  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  este egală cu  $\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin \varphi$ ;
  - (ii) vectorul  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  este perpendicular pe ambii vectori  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$ ;
  - (iii) tripletul de vectori  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b})$  este direct.

Vom enumera, mai întâi, proprietățile fundamentale ale produsului vectorial a doi vectori.

1) Prima proprietate exprimă un fapt de natură geometrică: dacă vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  nu sunt coliniari, atunci norma vectorului  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  este egală cu aria paralelogramului construit pe segmentele  $OA$  și  $OB$ , unde  $O$  este un punct arbitrar din spațiu, iar  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ . De asemenea, este clar că aria triunghiului  $OAB$  este egală cu jumătate din norma produsului vectorial a vectorilor  $\overrightarrow{OA}$  și  $\overrightarrow{OB}$ .

Această proprietate rezultă imediat din chiar definiția produsului vectorial.

2) Produsul vectorial este *anticomutativ*:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}. \tag{1.13.1}$$

Demonstrația rezultă, din nou, direct din definiție.

3) Produsul vectorial este compatibil cu înmulțirea cu scalari a vectorilor:

$$(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}), \quad (1.13.2)$$

$$\mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \quad (1.13.3)$$

Datorită anticomutativității produsului vectorial, este suficient să demonstrăm una dintre cele două proprietăți. Vom demonstra, prin urmare, relația (1.13.2). Dacă  $\lambda = 0$ , sau dacă cei doi vectori sunt coliniari, atunci ambii membri ai relației sunt egali cu zero, prin urmare proprietatea are loc. Dacă presupunem acum că nu suntem în nici una dintre aceste două situații. Lungimea vectorului  $\lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$  este egală cu  $|\lambda| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \varphi$ , unde  $\varphi$  este unghiul dintre cei doi vectori. Să evaluăm acum lungimea vectorului din membrul drept. Dacă  $\lambda > 0$ , atunci vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\lambda \mathbf{a}$  au același sens, prin urmare unghiul dintre  $\lambda \mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  este tot  $\varphi$ . Așadar,

$$\|(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b}\| = \|\lambda \mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \varphi = |\lambda| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \varphi.$$

Dacă  $\lambda < 0$ , atunci vectorii  $\lambda \mathbf{a}$  și  $\mathbf{a}$  au sensuri opuse, prin urmare unghiul dintre vectorii  $\lambda \mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  este egal cu  $\pi - \varphi$ . Prin urmare, în acest caz, avem:

$$\|(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b}\| = \|\lambda \mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin(\pi - \varphi) = |\lambda| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \varphi.$$

Astfel, vectorii din cei doi membri ai relației (1.13.2) au aceeași normă, atât pentru valori pozitive, cât și pentru valori negative ale scalarului  $\lambda$ . Este clar că acești doi vectori sunt coliniari, întrucât ambii sunt perpendiculari vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$ . Mai trebuie să demonstrăm, prin urmare, că acești vectori au și același sens. Se observă, însă, imediat, că pentru  $\lambda > 0$  acești doi vectori au, ambii, același sens cu vectorul  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ , în timp ce pentru  $\lambda < 0$  ei au, ambii, sens opus vectorului  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ .

4) Produsul vectorial este distributiv față de adunarea vectorilor:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \quad (1.13.4)$$

$$\mathbf{c} \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{b}. \quad (1.13.5)$$

Din nou, este suficient să demonstrăm prima egalitate, cea de-a doua rezultând, pe urmă, din anticomutativitate.

Egalitatea are loc, în mod evident, dacă unul dintre cei trei vectori este nul sau dacă suma  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  este nulă. Presupunem că nu suntem în nici una dintre aceste situații.

Vom demonstra mai întâi egalitatea

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c}_0 = \mathbf{a} \times \mathbf{c}_0 + \mathbf{b} \times \mathbf{c}_0, \quad (1.13.6)$$

unde  $\mathbf{c}_0 = \mathbf{c}/\|\mathbf{c}\|$  este un vector unitar.

Vom arăta, mai întâi, cum anume se poate construi produsul vectorial al unui vector oarecare  $\mathbf{a}$  cu un vector unitar  $\mathbf{c}_0$ . Atașăm vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{c}_0$  unui punct  $O$  oarecare, deci construim punctele  $A$  și  $C$  astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  și  $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}_0$ . Ducem acum prin punctul  $O$  un plan  $\Pi$ , perpendicular pe dreapta  $OC$  și proiectăm ortogonal pe el segmentul orientat  $\overrightarrow{OA}$ . Segmentul orientat  $\overrightarrow{OA'}$ , proiecția ortogonală pe  $\Pi$  a lui  $\overrightarrow{OA}$ , îl rotim, în planul  $\Pi$ , în jurul lui  $O$ , cu un unghi de  $\pi/2$ , în sensul mersului acelor de ceasornic, dacă privim din punctul  $C$ . Segmentul orientat  $\overrightarrow{OA''}$ , obținut în urma rotației, va fi un reprezentant al produsului vectorial al vectorilor  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{c}_0$ . Într-adevăr, dacă notăm cu  $\varphi$  unghiul dintre vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{c}_0$ , atunci putem scrie:

$$\|\overrightarrow{OA''}\| = \|\overrightarrow{OA'}\| = \|\overrightarrow{OA}\| \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{c}_0\| \sin \varphi.$$

În plus, se constată cu ușurință că vectorii  $\overrightarrow{OA''}$  și  $\mathbf{a} \times \mathbf{c}_0$  au aceeași direcție și același sens.

Trecem acum la demonstrarea relației (1.13.6). Pentru aceasta, fixăm un punct  $O$  și construim punctele  $A, B, C$  astfel încât  $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}_0$ ,  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ,  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ ,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ . Construim, mai departe, planul  $\Pi$ , care trece prin punctul  $O$  și este perpendicular pe segmentul orientat  $\overrightarrow{OC}$ . Notăm cu  $A'$  și  $B'$  proiecțiile ortogonale ale punctelor  $A$  și  $B$  pe planul  $\Pi$ . Rotim triunghiul  $OA'B'$  în planul  $\Pi$ , în jurul punctului  $O$ , cu un unghi de  $\pi/2$ , în sensul mersului acelor de ceasornic, dacă privim din punctul  $C$ . Se obține, ca rezultat al rotației, triunghiul  $OA''B''$ . Avem:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OB''} &= \overrightarrow{OA''} + \overrightarrow{A''B''}, \\ \overrightarrow{OB''} &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c}_0, \quad \overrightarrow{OA''} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}_0, \quad \overrightarrow{A''B''} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}_0. \end{aligned} \quad (1.13.7)$$

Așadar, din (1.13.7) rezultă egalitatea (1.13.6). Pentru a obține acum (1.13.4), este suficient să înmulțim relația (1.13.6) cu scalarul  $\|\mathbf{c}\|$ .

Proprietățile produsului vectorial descrise mai sus permit formularea unei reguli pentru calculul produsului vectorial a două combinații liniare de vectori liberi: pur și simplu se calculează produsul fiecărui termen din prima combinație cu fiecare termen din a doua combinație și apoi se însumează rezultatele. De exemplu,

$$(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \times (2\mathbf{c} - 3\mathbf{d}) = 2\mathbf{a} \times \mathbf{c} - 3\mathbf{a} \times \mathbf{d} + 4\mathbf{b} \times \mathbf{c} - 6\mathbf{b} \times \mathbf{d}.$$

*Observație.* Produsul vectorial are o serie de similarități cu produsul scalar al vectorilor. Sunt, totuși, o serie de diferențe care trebuie ținute minte:

- 1) Produsul vectorial *nu* este comutativ – ordinea factorilor contează.

2) Produsul vectorial a doi vectori este un vector, nu un scalar. Ca urmare, de data aceasta are sens să considerăm produse de mai mulți factori. Totuși, așa cum vom vedea ceva mai târziu, produsul vectorial *nu* este asociativ.

### 1.13.2 Expresia produsului vectorial în funcție de componentele factorilor

Considerăm un sistem de coordonate ortogonal  $Oxyz$  și fie  $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$  baza ortonormată de coordonate. Este ușor de verificat că vectorii bazei se înmulțesc vectorial după regulile descrise în următoarea tabelă:

$\times$	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
$\mathbf{i}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{k}$	$-\mathbf{j}$
$\mathbf{j}$	$-\mathbf{k}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{i}$
$\mathbf{k}$	$\mathbf{j}$	$-\mathbf{i}$	$\mathbf{0}$

Fie, acum,  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  doi vectori dați prin componentele lor:

$$\mathbf{a} = X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}.$$

Utilizând distributivitatea produsului vectorial în raport cu adunarea vectorilor, obținem

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k})(X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}) = (YZ' - ZY')\mathbf{i} + \\ &+ (ZX' - XZ')\mathbf{j} + (XY' - YX')\mathbf{k}, \end{aligned}$$

deci

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (YZ' - ZY')\mathbf{i} + (ZX' - XZ')\mathbf{j} + (XY' - YX')\mathbf{k}. \quad (1.13.8)$$

Ținând cont de regula de dezvoltare a unui determinant de ordinul al treilea după prima linie, formula precedentă se mai poate scrie sub următoarea formă, mult mai ușor de reținut:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ X & Y & Z \\ X' & Y' & Z' \end{vmatrix}. \quad (1.13.9)$$

*Observație.* Din expresia analitică (1.13.9) rezultă imediat formule analitice pentru aria paralelogramului și aria triunghiului determinate de cei doi vectori. Astfel, din formula menționată rezultă imediat că

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} Y & Z \\ Y' & Z' \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} X & Z \\ X' & Z' \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} X & Y \\ X' & Y' \end{vmatrix},$$

adică

$$\text{Aria}_{\text{par}} \equiv \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{\begin{vmatrix} Y & Z \\ Y' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Z \\ X' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Y \\ X' & Y' \end{vmatrix}^2}. \quad (1.13.10)$$

Prin urmare, aria triunghiului determinat de cei doi vectori este

$$\text{Aria}_{\text{triun}} = \frac{1}{2} \sqrt{\begin{vmatrix} Y & Z \\ Y' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Z \\ X' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Y \\ X' & Y' \end{vmatrix}^2}. \quad (1.13.11)$$

Să considerăm acum cazul în care avem trei puncte oarecare din planul  $xOy$ :  $A(x_A, y_A, 0)$ ,  $B(x_B, y_B, 0)$  și  $C(x_C, y_C, 0)$ . Ele determină doi vectori:  $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$  și  $\mathbf{b} = \overrightarrow{AC}$ . Este clar că  $\mathbf{a} = \mathbf{a}(x_B - x_A, y_B - y_A, 0)$  și  $\mathbf{b} = \mathbf{b}(x_C - x_A, y_C - y_A, 0)$ . Prin urmare,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_B - x_A & y_B - y_A & 0 \\ x_C - x_A & y_C - y_A & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A \end{vmatrix} = \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix},$$

de unde rezultă că

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \pm \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}.$$

Așadar, aria triunghiului ABC din planul  $xOy$  este dată de formula

$$\text{Aria}_{ABC} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}. \quad (1.13.12)$$

Firește, semnul se alege astfel încît membrul drept să fie pozitiv. Este, de asemenea, de remarcat, că formula de mai sus ne dă un criteriu de coliniaritate pentru punctele A, B, C. Cum ele sunt coliniare exact atunci când aria triunghiului determinat de ele este zero, adică atunci când triunghiul este degenerat, înseamnă că cele trei puncte sunt coliniare exact atunci când determinantul din membrul drept al ecuației (1.13.12) se anulează.

### 1.13.3 Dublul produs vectorial

După cum am putut constata până acum, produsul vectorial a doi vectori este, din nou, un vector, de aceea are sens să înmulțim acest vector cu un al treilea vector. Rezultatul acestei operații este ceea ce se numește *dublul produs vectorial*. Menționăm că *produsul vectorial nu este asociativ*, de aceea nu se poate renunța la paranteze așa cum se face, de exemplu,

în cazul produsului numerelor reale sau complexe sau în cazul produsului matricilor. De acest fapt ne putem convinge cu ușurință, studiind produsele elementelor bazei canonice a spațiului tridimensional. Avem, de exemplu:

$$(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i},$$

în timp ce

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) = 0.$$

Fie, prin urmare,  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  și  $\mathbf{c}$  trei vectori din spațiu. După cum am spus mai devreme, *dublul produs vectorial* al celor trei vectori este, prin definiție, vectorul  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$ . Vom demonstra, în cele ce urmează, că are loc următoarea relație:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}. \quad (1.13.13)$$

Dacă unul dintre vectori este nul, atunci, desigur, ambii membri ai egalității de mai sus sunt egali cu zero, prin urmare nu avem ce demonstra. Același lucru se întâmplă, după cum ne putem convinge imediat, dacă vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt coliniari. Vom presupune, prin urmare, că toți cei trei vectori sunt nenuli, iar vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt necoliniari. Considerăm vectorul  $\mathbf{x} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}$ .

Alegem o origine  $O$  arbitrară a spațiului și fie  $X, A, B, C$  patru puncte din spațiu astfel încât să avem  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ,  $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ ,  $\overrightarrow{OX} = \mathbf{x}$ . Avem, prin urmare,

$$\overrightarrow{OX} = (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \times \overrightarrow{OA}.$$

Din definiția produsului vectorial, deducem imediat că  $\overrightarrow{OX}$  este perpendicular pe  $\overrightarrow{OA}$  și se află în planul  $OAB$ . Pe de altă parte, deoarece tripletul de vectori

$$\{(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}), \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OX}\}$$

este drept, rezultă că vectorii  $\overrightarrow{OB}$  și  $\overrightarrow{OX}$  se află de aceeași parte a planului care conține vectorii  $\overrightarrow{OA}$  și  $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}$ . În plus, avem

$$\|\overrightarrow{OX}\| = \|\overrightarrow{OA}\|^2 \|\overrightarrow{OB}\| \sin \theta,$$

unde  $\theta$  este unghiul  $\angle AOB$ . Aceste proprietăți ale vectorului  $\overrightarrow{OX}$  definesc acest unghi în mod unic. Pe de altă parte, ne putem convinge cu ușurință că proprietățile sunt verificate de vectorul

$$(\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA})\overrightarrow{OB} - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})\overrightarrow{OA}.$$



Așadar,

$$\vec{OX} = (\vec{OA} \times \vec{OB}) \times \vec{OA} = (\vec{OA} \cdot \vec{OA})\vec{OB} - (\vec{OA} \cdot \vec{OB})\vec{OA}.$$

Analog se demonstrează că

$$(\vec{OA} \times \vec{OB}) \times \vec{OB} = (\vec{OA} \cdot \vec{OB})\vec{OB} - (\vec{OB} \cdot \vec{OB})\vec{OA}.$$

Reperul  $\{\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OA} \times \vec{OB}\}$  este o bază a lui  $\mathbb{R}^3$ , așadar există trei numere reale  $u, v, w$  astfel încât

$$\vec{OC} = u\vec{OA} + v\vec{OB} + w(\vec{OA} \times \vec{OB}).$$

Dezvoltând  $(\vec{OA} \times \vec{OB}) \times \vec{OC}$  și ținând cont de faptul că  $\vec{OA} \times \vec{OB}$  este perpendicular pe  $\vec{OA}$  și pe  $\vec{OB}$ , obținem

$$\begin{aligned} (\vec{OA} \times \vec{OB}) \times \vec{OC} &= u(\vec{OA} \cdot \vec{OA})\vec{OB} - u(\vec{OA} \cdot \vec{OB})\vec{OA} + v(\vec{OA} \cdot \vec{OB})\vec{OB} - \\ &\quad - v(\vec{OB} \cdot \vec{OB})\vec{OA} = \\ &= [(-u\vec{OA} - v\vec{OB} - w(\vec{OA} \times \vec{OB})) \cdot \vec{OB}] \vec{OA} + \\ &\quad + [(u\vec{OA} + v\vec{OB} + w(\vec{OA} \times \vec{OB})) \cdot \vec{OA}] \vec{OB} = \\ &= (\vec{OA} \cdot \vec{OC})\vec{OB} - (\vec{OB} \cdot \vec{OC})\vec{OA} = \\ &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}. \end{aligned}$$

*Observație.* Firește, are sens să calculăm și produsul  $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ . Din anticomutativitatea produsului vectorial, obținem, utilizând relația (1.13.13), stabilită mai devreme:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}.$$

Comparând vectorii  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$  și  $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$  ajungem la concluzia că ei pot fi egali doar dacă

$$-(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = 0.$$

Astfel, o condiție necesară pentru ca cele două produse vectoriale duble să fie egale este necesar ca cei trei vectori să fie coplanari. Această condiție nu este, însă, și suficientă, întrucât, după cum se vede din egalitatea de mai sus, coeficienții celor trei vectori nu sunt arbitrari.

Se poate demonstra cu ușurință, utilizând relația (1.13.13) că pentru orice trei vectori  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  și  $\mathbf{c}$  are loc următoarea identitate (*identitatea lui Jacobi*):

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = 0. \quad (1.13.14)$$

## 1.14 Produsul mixt al vectorilor

### 1.14.1 Definiție și proprietăți fundamentale

Fie  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  și  $\mathbf{c}$  trei vectori. Se numește *produs mixt* al celor trei vectori numărul


$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) := (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}. \quad (1.14.1)$$

Produsul mixt al vectorilor are o interpretare geometrică remarcabilă, exprimată de următoarea teoremă.

**Teorema 1.10.** Fie  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  și  $\mathbf{c}$  trei vectori necoplanari. Îi atașăm unui punct  $O$  și fie  $A, B, C$  punctele pentru care

$$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \quad \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}.$$

Atunci produsul mixt  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$  este egal cu volumul paralelipipedului construit pe segmentele  $OA, OB, OC$ , luat cu semnul plus dacă tripletul  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$  este direct și cu semnul minus dacă tripletul este stâng.



*Demonstrație* Fie  $V$  volumul paralelipipedului construit pe segmentele  $OA, OB$  și  $OC$ ,  $S$  – aria paralelogramului construit pe segmentele  $OA$  și  $OB$  și  $h$  – înălțimea paralelipipedului. Atunci  $V = Sh$ .

Atașăm acum punctului  $O$  un vector unitar  $\overrightarrow{OE}$ , perpendicular pe segmentele  $OA$  și  $OB$  și orientat astfel încât tripletul format din vectorii  $\overrightarrow{OA}$ ,  $\overrightarrow{OB}$  și  $\mathbf{e} = \overrightarrow{OE}$  să fie direct. Atunci, în mod evident,  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S\mathbf{e}$ . Prin urmare,

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = S(\mathbf{e} \cdot \mathbf{c}) = S \operatorname{pr}_{\mathbf{e}} \mathbf{c} = \pm Sh = \pm V,$$

unde se ia semnul plus dacă tripletul  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$  este direct și semnul minus dacă tripletul este stâng.  $\square$

**Consecința 1.6.** Volumul tetraedrului  $OABC$  este dat de formula

$$\text{Vol}_{OABC} = \pm \frac{1}{6}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}),$$

unde  $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ ,  $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ ,  $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$ .

**Consecința 1.7.** Un sistem de trei vectori liniar independenți  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$  este drept dacă  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) > 0$  și stâng dacă  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) < 0$ .

**Consecința 1.8.** Un sistem ortonormat de trei vectori liniar independenți  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$  este drept dacă  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 1$  și stâng dacă  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = -1$ .

Produsul mixt al vectorilor ne permite, de asemenea, să stabilim un criteriu de coplanaritate a trei vectori, cuprins în teorema care urmează.

**Teorema 1.11.** Pentru ca trei vectori  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  și  $\mathbf{c}$  să fie coplanari este necesar și suficient ca produsul lor mixt să fie egal cu zero:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 0. \tag{1.14.2}$$

*Demonstrație* Dacă vectorii  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  sunt coplanari, atunci vectorul  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  fie este egal cu zero (dacă vectorii  $\mathbf{a}$  și  $\mathbf{b}$  sunt coliniari), fie este perpendicular pe vectorul  $\mathbf{c}$ . În ambele cazuri egalitatea (1.14.2) are loc.

Invers, să presupunem că egalitatea (1.14.2) are loc. Dacă vectorii nu ar fi coplanari, atunci ei ar determina, ca în teorema precedentă, un paralelipiped de volum

$$0 \neq V = \pm(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}),$$

ceea ce contrazice egalitatea (1.14.2). □

### 1.14.2 Expresia produsului mixt în coordonate

Presupunem că, relativ la o bază ortonormată, vectorii  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  sunt dați prin componentele lor:

$$\mathbf{a}(X_1, Y_1, Z_1), \mathbf{b}(X_2, Y_2, Z_2), \mathbf{c}(X_3, Y_3, Z_3). \tag{1.14.3}$$

Utilizând expresiile în coordonate pentru produsul vectorial și produsul mixt, obținem:

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (Y_1 Z_2 - Y_2 Z_1)X_3 + (X_2 Z_1 - X_1 Z_2)Y_3 + \\ &+ (X_1 Y_2 - X_2 Y_1)Z_3 = X_1 Y_2 Z_3 + X_2 Y_3 Z_1 + X_3 Y_1 Z_3 - X_1 Y_3 Z_2 - \\ &- X_3 Y_2 Z_1 - X_2 Y_1 Z_3. \end{aligned}$$

Este ușor de constatat că această relație se poate rescrie cu ușurință cu ajutorul unui determinant de ordinul al treilea:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 \end{vmatrix} \quad (1.14.4)$$

Din proprietățile determinantilor se obțin imediat următoarele relații între produsele mixte a trei vectori, luați în diferite ordini:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = -(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = -(\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a}) = -(\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b}).$$

Prin urmare:

- dacă facem o permutare circulară a factorilor într-un produs mixt, valoarea produsului nu se schimbă;
- dacă se schimbă ordinea a doi factori (nu neapărat vecini), *semnul* produsului se schimbă (dar valoarea absolută nu!).

Se constată, de asemenea, fie din definiție, fie din proprietățile determinantilor, că *dacă doi factori dintr-un produs mixt sunt liniar dependenți, produsul se anulează*. În particular, din (1.14.4) rezultă că putem rescrie condiția necesară și suficientă (1.14.2) pentru ca vectorii (1.14.3) să fie coplanari sub forma

$$\begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 \end{vmatrix} = 0. \quad (1.14.5)$$

## 1.15 Problems

**Problem 1.1.** A vector  $\mathbf{v}$  makes an angle of  $45^\circ$  with the  $x$ -axis, an angle of  $60^\circ$  with the  $y$ -axis, while its component on the  $x$ -axis is  $v_x = 3\sqrt{2}$ . Find the module of the vector, the angle it makes with the  $z$ -axis and the other two components.

**Problem 1.2.** Find a vector which makes equal angles with the three axes of an orthonormal frame, knowing that the module of the vector is equal to unity.

**Problem 1.3.** What relation should verify the vectors  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  in order to form a triangle?

**Problem 1.4.** The points  $A'(1, 2, 1)$ ,  $B'(2, 0, 0)$ ,  $C'(0, 1, 3)$  are the midpoints of the sides of the triangle  $ABC$ . Find the coordinates of the vertices of the triangle.

**Problem 1.5.** Pe laturile triunghiului  $ABC$  se construiesc paralelogramele arbitrare  $ABB'A''$ ,  $BCC'B''$ ,  $CAA'C''$ . Să se arate că se poate construi un triunghi având laturile egale și paralele cu  $\overrightarrow{A'A''}$ ,  $\overrightarrow{B'B''}$ ,  $\overrightarrow{C'C''}$ .

**Problem 1.6.** Let  $SABCD$  be a quadrilateral pyramid with the vertex at  $S$ , having as base the parallelogram  $ABCD$ , the diagonals of which intersect each other at the point  $O$ . Show that:

$$\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}.$$

**Problem 1.7.** Check that the vectors  $\mathbf{a}(4, 1, -1)$ ,  $\mathbf{b}(1, 2, -5)$ ,  $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$  form a basis in space. Find the components of the vectors  $\mathbf{l}(4, 4, -5)$ ,  $\mathbf{m}(2, 4, -10)$ ,  $\mathbf{n}(0, 3, -4)$  in this basiscoplanar.

**Problem 1.8.** Let  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  be three linearly independent vectors. Establish whether the vectors  $\mathbf{l}, \mathbf{m}, \mathbf{n}$  are coplanar in each of the cases below. If they are, indicate a linear dependence relation between them.

- 1)  $\mathbf{l} = 2\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{m} = 2\mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{a}$ ,  $\mathbf{n} = 2\mathbf{c} - \mathbf{a} - \mathbf{b}$ ;
- 2)  $\mathbf{l} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{m} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{n} = -\mathbf{a} + \mathbf{c}$ ;
- 3)  $\mathbf{l} = \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{m} = \mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{n} = \mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}$ .

**Problem 1.9.** In the parallelogram  $ABCD$  the point  $K$  is the midpoint of the segment  $CD$ , while the point  $O$  is the intersection point of its diagonals. Considering the basis made of the vectors  $\overrightarrow{AB}$  and  $\overrightarrow{AD}$ , find, in this basis, the components of the vectors  $\overrightarrow{AM}$ ,  $\overrightarrow{AO}$ ,  $\overrightarrow{MO}$ .

**Problem 1.10.** In the trapezium  $ABCD$ , the lengths of the bases  $AD$  and  $BC$  are in the ratio  $3 : 2$ . Taking as basis the vectors  $\overrightarrow{AC}$  and  $\overrightarrow{BD}$ , find, in this basis, the components of the vectors  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{DA}$ .

**Problem 1.11.** In the trapezium  $ABCD$ , the lengths of the bases  $AD$  and  $BC$  are in the ratio  $3 : 1$ .  $O$  is the intersection point of the diagonals of the trapezium, while  $S$  is the intersection point of the non-parallel sides (as lines). Taking as basis the vectors  $\overrightarrow{AD}$  and  $\overrightarrow{AB}$ , find the components of the vectors  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AO}$ ,  $\overrightarrow{AS}$ .

**Problem 1.12.** Three non-collinear points  $e, A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ ,  $C(x_3, y_3)$ , are consecutive vertices of a parallelogram. Find the coordinates of the fourth point,  $D$ , of the parallelogram.

**Problem 1.13.** Let  $A(x_1, y_1, z_1)$  and  $B(x_2, y_2, z_2)$  be two distinct points. Find the coordinates:

- 1) of the point  $M$ , situated on the segment  $AB$ , such that  $AM : BM = m : n$ ;
- 2) of the point  $M$ , situated in the exterior of the segment  $AB$ , such that  $AM : BM = m : n$ .

**Problem 1.14.** There are given the points  $A(3, -2)$  și  $B(1, 4)$ . The point  $M$  belongs to the line  $AB$ , while  $AM = 3AB$ . Find the coordinates of the point  $M$  if:

- 1)  $M$  is situated on the same side of the points  $A$  and  $B$ ;
- 2) the points  $M$  and  $B$  are on different sides of the point  $A$ .

**Problem 1.15.** There are given the non-collinear vectors  $\mathbf{a}$  and  $\mathbf{b}$ . Prove that the system of vectors  $\mathbf{m} = 3\mathbf{a} - \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{n} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{p} = \mathbf{a} + 3\mathbf{b}$  is linearly dependent, while the vectors  $\mathbf{n}$ ,  $\mathbf{p}$  are non-collinear. Express the vector  $\mathbf{m}$  in terms of the vectors  $\mathbf{n}$ ,  $\mathbf{p}$ .

**Problem 1.16.** Let the point  $G$  be the centroid of a triangle  $ABC$ . Express:

- 1) the vector  $\overrightarrow{GA}$  in terms of the vectors  $\overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CA}$ ;
- 2) the vector  $\overrightarrow{AB}$  in terms of the vectors  $\overrightarrow{GB}$ ,  $\overrightarrow{GC}$ ;
- 3) the vector  $\overrightarrow{OA}$  in terms of the vectors  $\overrightarrow{OB}$ ,  $\overrightarrow{OC}$ ,  $\overrightarrow{OG}$ , where  $O$  is an arbitrary point in space.

**Problem 1.17.** Find the coordinates of the vertices of a tetrahedron  $OABC$  in the coordinate system with the origin at the vertex  $O$ , in which the coordinate basis is made of the medians  $\overrightarrow{OD}$ ,  $\overrightarrow{OE}$ ,  $\overrightarrow{OF}$  of the faces  $BOC$ ,  $COA$ ,  $AOB$ .

**Problem 1.18.** Find the coordinates of the vertices of the tetrahedron  $ABCD$  in a coordinate system in which the origin is the centroid  $P$  of the face  $BCD$ , while the coordinate basis is made of the vectors  $\overrightarrow{BQ}$ ,  $\overrightarrow{CR}$ ,  $\overrightarrow{DS}$ , where  $Q$ ,  $R$ ,  $S$  are the centroids of the faces  $ACD$ ,  $ABD$  and  $ABC$ , respectively.

**Problem 1.19.** Find the angles between the vectors  $\mathbf{a}$  and  $\mathbf{b}$ , given through their coordinates with respect to an orthonormal system.

- 1)  $\mathbf{a}(1, -1, 1)$ ,  $\mathbf{b}(5, 1, 1)$ ;
- 2)  $\mathbf{a}(1, -1, 1)$ ,  $\mathbf{b}(-2, 2, -2)$ ;
- 3)  $\mathbf{a}(1, -1, 1)$ ,  $\mathbf{b}(3, 1, -2)$ .

**Problem 1.20.** Find the distance between the points  $A$  and  $B$ , given through their coordinates with respect to an orthonormal basis.

- 1)  $A(4, -2, 3), B(4, 5, 2)$ ;
- 2)  $A(-3, 1, -1), B(-1, 1, -1)$ ;
- 3)  $A(3, -3, -7), B(1, -4, -5)$ .

**Problem 1.21.** There are given the vectors  $\mathbf{a}(-1, 2), \mathbf{b}(5, 1)$  and  $\mathbf{c}(4, -2)$ , with respect to an orthonormal basis. Compute:

- 1)  $\mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ ;
- 2)  $\|\mathbf{a}\|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ ;
- 3)  $\|\mathbf{b}\|^2 + \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} + 3\mathbf{c})$ ;

**Problem 1.22.** There are given the vectors  $\mathbf{a}(1, -1, 1), \mathbf{b}(5, 1, 1)$  and  $\mathbf{c}(0, 3, -2)$ , with respect to an orthonormal basis. Compute:

- 1)  $\mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ ;
- 2)  $\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{c}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$ ;
- 3)  $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) - \|\mathbf{a}\|^2(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$ .

**Problem 1.23.** Prove that for any three vectors  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  and  $\mathbf{c}$  the vectors  $\mathbf{a}$  and  $\mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$  are perpendicular.

**Problem 1.24.** Is it true that for any vectors  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$  we have the equality

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})?$$

**Problem 1.25.** Find the area of the triangle constructed on the vectors  $\mathbf{a}(2, 3, 1)$  and  $\mathbf{b}(-1, 1, 2)$  (attached to a point). Find, also, the lengths of the three altitudes of this triangle.

**Problem 1.26.** We attach four vectors  $\mathbf{a}(-1, 1, -1), \mathbf{b}(-1, 1, 1), \mathbf{c}(5, -1, -1)$  and  $\mathbf{d}$  to a point  $O$ . The vector  $\mathbf{d}$  has the length and makes with the vectors  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  equal acute angles. Find the components of the vector  $\mathbf{d}$ .

**Problem 1.27.** Establish whether the following triples of vectors are made of coplanar vectors:

1)  $\mathbf{a}(2, 3, 5)$ ,  $\mathbf{b}(7, 1, -1)$ ,  $\mathbf{c}(3, -5, -11)$ ;

2)  $\mathbf{a}(2, 0, 1)$ ,  $\mathbf{b}(5, 3, -3)$ ,  $\mathbf{c}(3, 3, 10)$ .

**Problem 1.28.** The vectors  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  are non-coplanar. For what values of the real number  $\lambda$  are coplanar the vectors  $\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c}$ ,  $4\mathbf{a} + 5\mathbf{b} + 6\mathbf{c}$ ,  $7\mathbf{a} + 8\mathbf{b} + \lambda^2\mathbf{c}$ ?

**Problem 1.29.** There are given the non-collinear vectors  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  and the real number  $p$ . Find a vector  $\mathbf{x}$  which verifies the equality  $(\mathbf{x}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = p$ .

**Problem 1.30.** The diagonals of an isosceles trapezium are perpendicular. Find the area of the trapezium, knowing that its height is equal to  $h$ .

**Problem 1.31.** The area of a trapezium  $ABCD$  is equal to  $cS$ , while the ratio of the bases is  $AD : BC = 3 : 1$ . The segment  $MN$  is parallel to the side  $BC$  and intersects the side  $AB$ , such that  $AM : BN = 3 : 2$ ,  $MN : CD = 1 : 3$ . The segment  $AM$  is parallel to the segment  $BN$ . Find the area of the triangle  $BNC$ .

**Problem 1.32.** The measure, in radians, of the angle between the vectors  $\mathbf{u}$  and  $\mathbf{v}$  is equal to  $\frac{\pi}{6}$ . If  $\|\mathbf{u}\| = 1$ ,  $\|\mathbf{v}\| = 7$ , compute  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  and  $\left\| \frac{1}{3}\mathbf{u} \times \frac{3}{4}\mathbf{v} \right\|$ .

**Problem 1.33.** If  $ABCD$  is a regular tetrahedron of side 1, compute  $\left\| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right\|$ .

**Problem 1.34.** Compute the area of the parallelogram  $ABCD$ , if  $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$ , while  $\overrightarrow{AD} = (2, 1, 4)$ .

**Problem 1.35.** Compute the area of the triangle  $ABC$  if  $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$ , while  $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 3)$ .

**Problem 1.36.** Find a vector of length 1, perpendicular on the vectors  $\mathbf{u} = (1, -3, 1)$  and  $\mathbf{v} = (-3, 3, 3)$ .

**Problem 1.37.** There are given the vectors  $\mathbf{u}(1, 1, 1)$  and  $\mathbf{v}(0, 1, 2)$ . Find a positive orthonormal basis  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$  of  $\mathbb{R}^3$  such that:

- (i)  $\mathbf{a}$  has the same direction and sense as  $\mathbf{u}$ ;
- (ii)  $\mathbf{b}$  is a linear combination of  $\mathbf{u}$  and  $\mathbf{v}$ , while its first component (with respect to the canonical basis) is positive.

**Problem 1.38.** Show that if  $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ , then

- (a)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$ ;
- (b)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{w} \times \mathbf{u} = 3(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ .



## CAPITOLUL 2

---

### Dreapta în plan

---

#### Cuprins

---

2.1	Ecuția dreptei scrisă cu ajutorul coeficientului unghiular (al pantei) . . . . .	59
2.2	Ecuția generală a dreptei. Ecuția dreptei prin tăieturi . . . . .	62
2.3	Ecuția vectorială . . . . .	64
2.4	Poziția reciprocă a două drepte în plan . . . . .	65
2.5	Fascicule de drepte . . . . .	67
2.6	Distanța de la un punct la o dreaptă . . . . .	68
2.7	Unghiul dintre două drepte . . . . .	72
2.8	Problems . . . . .	73

---

### 2.1 Ecuția dreptei scrisă cu ajutorul coeficientului unghiular (al pantei)


Fie  $\Delta$  o dreaptă. Se numește *vector director* al dreptei orice vector nenul a cărui direcție coincide cu direcția dreptei. Se înțelege că o aceeași dreaptă are o infinitate de vectori directori, dar toți aceștia sunt coliniari între ei.

Presupunem că s-a ales un sistem de coordonate afin  $Oxy$ . Vom stabili acum ecuația dreptei  $\Delta$ . Presupunem, mai întâi, că dreapta este paralelă cu axa  $Oy$  și intersectează axa

$Ox$  într-un punct  $P(a, 0)$ . Atunci este clar că pentru toate punctele  $M(x, y)$  de pe dreapta  $\Delta$  și numai pentru ele avem

$$x = a. \quad (2.1.1)$$

Așadar, (2.1.1) este ecuația unei drepte paralele cu axa  $Oy$  și care intersectează axa  $Ox$  în punctul  $P(a, 0)$ . Este clar că toate dreptele de acest tip au vectori directori de componente  $(0, m)$ , unde  $m$  este un număr real nenul oarecare. Să presupunem acum că dreapta  $\Delta$



nu este paralelă cu axa  $Oy$ . Atunci pentru orice vector director  $\mathbf{a}(l, m)$  al acestei drepte avem  $l \neq 0$ , iar raportul  $m : l$  are aceeași valoare constantă  $k$ , numită *coeficient unghiular* al dreptei  $\Delta$  relativ la sistemul de coordonate ales.

Dacă, în particular, se consideră un sistem de coordonate ortogonal  $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j})$ , atunci pentru coeficientul unghiular avem, în mod evident,


$$k = \operatorname{tg} \alpha,$$

unde  $\alpha$  este unghiul dintre  $\mathbf{i}$  și orice vector director al dreptei  $\Delta$ . Unghiul  $\alpha$  se numește *unghiul de înclinare* sau *panta* dreptei  $\Delta$  relativ la axa  $Ox$ . Deoarece vom considera în cele ce urmează vom utiliza în exclusivitate înclinarea relativ la axa  $Ox$ , pe viitor nu vom mai scoate în evidență în mod explicit acest fapt și vom vorbi, în general, pur și simplu despre panta dreptei.

***În cele ce urmează, dacă nu se precizează altfel, vom utiliza în exclusivitate un sistem de coordonate rectangular, fixat odată pentru totdeauna și nu ne vom mai referi la el.***

Vom arăta acum cum se poate obține ecuația unei drepte dacă se cunoaște panta ei și un punct de pe dreaptă. Fie, așadar, o dreaptă  $\Delta$ , de coeficient unghiular  $k$ . Fie, de asemenea, un punct  $P(a, b)$  de pe dreaptă. Fie, acum  $M(x, y)$  un punct de pe dreaptă, diferit de punctul  $P$ . Atunci vectorul  $\overrightarrow{PM}(x - a, y - b)$  este un vector director al dreptei  $\Delta$ , prin urmare

$$\frac{y - b}{x - a} = k. \quad (2.1.2)$$



De aici rezultă că

$$y - b = k(x - a). \quad (2.1.3)$$

Această ecuație este verificată de orice punct de pe dreaptă, inclusiv punctul P. Demonstrăm acum că, invers, dacă un punct verifică această ecuație, atunci el aparține drepte. Fie, așadar, un punct  $M_1(x_1, y_1) \neq P$ , care verifică ecuația (2.1.3), adică

$$y_1 - b = k(x_1 - a). \quad (2.1.4)$$

Cum  $M_1 \neq P$ ,  $x_1 - a \neq 0$ , prin urmare, din (2.1.2) și (2.1.4), obținem că

$$\frac{y - b}{x - a} = \frac{y_1 - b}{x_1 - a}.$$

Așadar, vectorii directori ai dreptelor  $\Delta$  și  $PM_1$  sunt coliniari. Cum ambele drepte trec prin punctul P, ele coincid, deci  $M_1 \in \Delta$ . Astfel, ecuația (2.1.3) descrie o dreaptă care trece prin punctul P și are coeficientul unghiular  $\Delta$ .

Dacă, în particular, punctul P se află pe axa Oy (ceea ce este posibil, deoarece am presupus că dreapta noastră nu este paralelă cu această axă), adică dacă P are coordonatele  $(0, b)$ , atunci ecuația (2.1.3) capătă forma mai simplă:

$$y = kx + b.$$

Dacă dreapta este paralelă cu axa Oy, atunci panta sa este egală cu zero și, dacă trece prin punctul  $P(0, b)$ , atunci ecuația ei este

$$y = b.$$

## 2.2 Ecuatia generală a dreptei. Ecuatia dreptei prin tăieturi

**Definiția 2.1.** Se numește *ecuație de gradul întâi* sau *ecuație liniară* relativ la necunoscutele  $x$  și  $y$  o ecuație de forma

$$Ax + By + C = 0, \quad (2.2.1)$$

unde  $A, B, C \in \mathbb{R}$ , iar coeficienții  $A$  și  $B$  nu se anulează simultan.

**Teorema 2.1.** *Orice dreaptă în plan poate fi descrisă printr-o ecuație de forma (2.2.1). Invers, orice ecuație de forma (2.2.1) reprezintă o dreaptă.*

*Demonstrație* Dacă avem o dreaptă  $\Delta$  care nu este paralelă cu axa  $Oy$ , atunci, după cum am văzut în secțiunea precedentă, ea poate fi descrisă prin ecuația liniară

$$y - kx - b = 0. \quad (2.2.2)$$

Dacă dreapta  $\Delta$  este paralelă cu axa  $Oy$ , atunci ea este, din nou, dată printr-o ecuație liniară

$$x - a = 0. \quad (2.2.3)$$

Considerăm acum o ecuație de forma (2.2.1) oarecare. Dacă  $B \neq 0$ , atunci, împărțind ambii membri ai ecuației cu  $B$  și introducând notațiile  $k = -A/B$ ,  $b = -C/B$ , putem aduce ecuația la forma (2.2.2). Dar ecuația (2.2.2) reprezintă o dreaptă, de coeficient unghiular  $k$  și care trece prin punctul  $P(0, b)$ . Dacă în ecuația (2.2.1)  $B = 0$ , atunci această ecuație se poate aduce la forma (2.2.3) și, prin urmare, reprezintă o dreaptă paralelă cu axa  $Oy$ .  $\square$

Ecuatia (2.2.1) se numește *ecuația generală a dreptei în plan*. Vom evidenția acum câteva cazuri particulare, în care unul sau doi coeficienți ai ecuației generale se anulează.

1.  $C = 0$ . În acest caz ecuația (2.2.1) se reduce la

$$Ax + By = 0. \quad (2.2.4)$$

Dreapta care se obține trece prin originea coordonatelor, după cum se poate observa cu ușurință, înlocuind  $x = 0$  și  $y = 0$  în ecuația de mai sus. Invers, dacă o dreaptă trece prin originea coordonatelor, atunci, înlocuind în ecuația (2.2.1)  $x = 0$  și  $y = 0$  obținem  $C = 0$ , prin urmare: *o condiție necesară și suficientă pentru ca o dreaptă dată prin ecuația sa generală să treacă prin origine este ca  $C = 0$ .*

2.  $B = 0, C \neq 0$ . În acest caz, ecuația (2.2.1) capătă forma

$$Ax + C = 0. \quad (2.2.5)$$

Dreapta dată de această ecuație este paralelă cu axa  $Oy$ , dar nu intersectează această axă. Se constată imediat că această dreaptă intersectează axa  $Ox$  în punctul de coordonate  $(-\frac{C}{A}, 0)$  și toate punctele sale au coordonata  $x$  egală cu  $-C/A$ . Așadar, un vector director al dreptei este, de exemplu,  $(0, 1)$ , ceea ce confirmă faptul că dreapta este, într-adevăr, paralelă cu axa  $Oy$ . Invers, este ușor de văzut că orice dreaptă paralelă cu axa  $Oy$  și care nu trece prin origine se poate scrie sub forma (2.2.5).

3.  $B = 0, C = 0$ . De data aceasta ecuația se reduce la

$$x = 0,$$

iar dreapta este chiar axa  $Oy$ .

4.  $A = 0, C \neq 0$ . Acest caz este analog cu cazul 2) și conduce la o dreaptă paralelă cu axa  $Ox$ , dar care nu coincide cu această axă.

5.  $A = 0, C = 0$ . Acest caz este analog cu cazul 3), iar dreapta în chestiune este axa  $Ox$ .

Scoatem în evidență acum următoarele fapte: fie  $\Delta$  dreapta dată prin ecuația sa generală (2.2.1). Atunci vectorul  $\mathbf{n}(A, B)$  este perpendicular pe dreaptă, în timp ce vectorul  $\mathbf{a}(-B, A)$  este un vector director al dreptei.

Într-adevăr, să alegem pe dreapta  $\Delta$  două puncte distincte  $M_1(x_1, y_1)$  și  $M_2(x_2, y_2)$ . Avem, prin urmare,

$$\begin{aligned} Ax_1 + By_1 + C &= 0, \\ Ax_2 + By_2 + C &= 0. \end{aligned}$$

Scăzând aceste ecuații membru cu membru, obținem

$$A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0.$$

Această egalitate înseamnă că vectorul  $\mathbf{n}(A, B)$  este perpendicular pe vectorul  $\overrightarrow{M_1M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ , prin urmare este perpendicular și pe dreapta  $\Delta$ . Cum vectorul  $\mathbf{a}(-B, A)$  este, în mod evident, și el perpendicular pe vectorul  $\mathbf{n}$ , rezultă că  $\mathbf{a}$  este un vector director al dreptei  $\Delta$ .

Să presupunem acum că în ecuația (2.2.1) toți coeficienții  $A, B, C$  sunt nenuli. Împărțim ecuația cu  $-C$  și notăm  $a = -C/A$  și  $b = -C/B$ . Atunci ecuația va deveni

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (2.2.6)$$

În mod evident,  $a$  și  $b$  sunt magnitudinile segmentelor pe care dreapta  $\Delta$  le taie pe axele de coordonate  $Ox$  și  $Oy$  (e vorba de segmentele cuprinse între originea coordonatelor și punctele de intersecție a dreptei cu axele). Aceste magnitudini se numesc *tăieturi* ale dreptei pe axă, de aceea, ecuația (2.2.6) se numește *ecuația dreptei  $\Delta$  prin tăieturi*.

### 2.3 Ecuația vectorială și ecuațiile parametrice ale dreptei. Dreapta care trece prin două puncte

Orice punct  $M$  al planului este unic identificat prin vectorul său de poziție  $\overrightarrow{OM}$ , relativ la originea coordonatelor. Fie  $\Delta$  o dreaptă din plan,  $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OM_0}$  vectorul de poziție al unui punct de pe dreaptă și  $\mathbf{a}$  vectorul director al dreptei. Notăm cu  $\mathbf{r}$  vectorul de poziție al unui punct  $M$  oarecare din plan. Dacă  $M$  aparține dreptei, atunci

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \overrightarrow{M_0M},$$


deci  $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$  este un vector director al dreptei, așadar este coliniar cu vectorul  $\mathbf{a}$ . De aici rezultă că există un număr real  $t$  astfel încât să avem

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{a}. \quad (2.3.1)$$

Invers, dacă  $t$  este un număr real oarecare, este clar că punctul  $M$  din plan, al cărui vector de poziție  $\mathbf{r}$  verifică ecuația (2.3.1) este un punct de pe dreaptă. Ecuația (2.3.1) sau ecuația echivalentă cu ea

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}, \quad (2.3.2)$$

se numește *ecuația vectorială a dreptei*. Să presupunem acum că vectorii sunt dați prin



componentele lor,  $\mathbf{a}(l, m)$ ,  $\mathbf{r}_0(x_0, y_0)$  și  $\mathbf{r}(x, y)$ . Atunci ecuația vectorială (2.3.2) este echivalentă cu sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \end{cases} \quad (2.3.3)$$

Ecuțiile (2.3.3) se numesc *ecuațiile parametrice ale dreptei*  $\Delta$ .

Dacă dreapta  $\Delta$  nu este paralelă cu nici una dintre axele de coordonate, atunci avem, în mod evident,  $l \neq 0$  și  $m \neq 0$  și atunci sistemul (2.3.3) este echivalent cu ecuația

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \quad (2.3.4)$$

care se numește *ecuația canonică a dreptei în plan*.

Remarcăm că, în general, în geometria analitică, se utilizează o anumită convenție, care ne permite să scriem ecuația canonică și pentru cazul în care dreapta este paralelă cu una dintre axele de coordonate. Convenția este următoarea: *de fiecare dată când unul dintre numitorii din ecuația canonică a dreptei se anulează, se consideră că numărătorul acelei fracții este identic nul*. Să presupunem, prin urmare, că avem o ecuație de forma:

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{0}.$$

Atunci, conform convenției, această ecuație este, de fapt, echivalentă cu ecuația  $y = 2$ , adică reprezintă ecuația unei drepte paralele cu axa  $Ox$ .

Fie acum două puncte  $M_0(x_0, y_0)$  și  $M_1(x_1, y_1)$  de pe dreapta  $\Delta$ . Atunci  $\overrightarrow{M_0M_1}(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$  este un vector director al dreptei și, prin urmare,

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \quad (2.3.5)$$

este *ecuația dreptei care trece prin punctele*  $M_0$  și  $M_1$ . Precizăm că, în conformitate cu convenția făcută, punctele  $M_0$  și  $M_1$  pot să se afle și pe o dreaptă paralelă cu una dintre axele de coordonate (ceea ce are ca efect faptul că una dintre coordonatele celor două puncte va fi aceeași pentru ambele).

## 2.4 Poziția reciprocă a două drepte în plan

Considerăm două drepte  $\Delta_1$  și  $\Delta_2$ , date prin ecuațiile lor generale

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0. \end{cases} \quad (2.4.1)$$

A studia poziția reciprocă a acestor două drepte înseamnă să stabilim numărul punctelor comune ale celor două drepte. Este evident că ne putem afla, în exclusivitate, în una dintre următoarele trei situații:

- (i) dreptele se intersectează într-un punct;

(ii) dreptele coincid (ceea ce înseamnă că au o infinitate de puncte comune);

(iii) dreptele sunt paralele (deci nu au nici un punct comun).

Este clar că a studia poziția reciprocă a dreptelor  $\Delta_1$  și  $\Delta_2$  revine la investigarea sistemului de ecuații liniare (2.4.1), alcătuit din ecuațiile generale ale dreptelor. Astfel, cele trei cazuri de mai sus corespund (în aceeași ordine), următoarelor cazuri posibile în analiza sistemului de ecuații:

(i) Sistemul de ecuații are soluție unică. După cum se știe din algebra liniară, această condiție este echivalentă cu condiția ca sistemul să fie un sistem Cramer, adică

$$\det \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0, \quad (2.4.2)$$

(ii) Sistemul de ecuații este compatibil, dar nedeterminat. Asta înseamnă că

$$\det \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0, \quad (2.4.3)$$

dar rangul matricii sistemului coincide cu rangul matricii extinse sau, ceea ce, în cazul nostru, când sunt doar două ecuații, este echivalent cu

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}, \quad (2.4.4)$$

adică cele două ecuații (2.4.1) descriu aceeași dreaptă.

(iii) Sistemul de ecuații este incompatibil, ceea ce înseamnă că este verificată, din nou, ecuația (2.4.3) dar, de data aceasta,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}, \quad (2.4.5)$$

altfel spus, rangul matricii sistemului este egal cu 1, în timp ce rangul matricii extinse este egal cu 2. Egalitatea din (2.4.5) înseamnă că cele două drepte au vectori directori coliniari, în timp ce neegalitatea înseamnă că cele două drepte nu coincid, prin urmare ele sunt paralele.



## 2.5 Fascicole de drepte

**Definiția 2.2.** Se numește *fascicol de drepte* mulțimea tuturor dreptelor dintr-un plan care trec printr-un punct  $S$  al planului, care se numește *centrul fascicolului*.

Pentru a specifica un fascicol de drepte în plan este suficient să specificăm centrul fascicolului și două dintre dreptele sale.

Fie, prin urmare, în plan, două drepte distincte care trec prin punctul  $S(x_0, y_0)$ , date prin ecuațiile lor generale,

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad (2.5.1)$$

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0. \quad (2.5.2)$$

Considerăm acum ecuația

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0, \quad (2.5.3)$$

unde  $\alpha$  și  $\beta$  sunt numere reale oarecare, care nu se anulează simultan. Vom demonstra că această ecuație determină o dreaptă care trece prin punctul  $S$ . Rescriem ecuația sub forma

$$(\alpha A_1 + \beta A_2)x + (\alpha B_1 + \beta B_2)y + \alpha C_1 + \beta C_2 = 0. \quad (2.5.4)$$

Aici coeficienții necunoscutelor nu se pot anula simultan. Într-adevăr, să presupunem că

$$\alpha A_1 + \beta A_2 = 0, \quad \alpha B_1 + \beta B_2 = 0 \quad (2.5.5)$$

și, de exemplu,  $\alpha \neq 0$ . Atunci și  $A_2 \neq 0$ , pentru că dacă  $A_2$  ar fi zero ar trebui să avem și  $A_1 = 0$ , ceea ce ar contrazice ipoteza că dreptele (2.5.1) și (2.5.2) se intersectează într-un punct. Analog se demonstrează că  $B_2 \neq 0$ , iar egalitățile (2.5.5) se pot scrie sub forma

$$A_1/A_2 = -\beta/\alpha, \quad B_1/B_2 = -\beta/\alpha \quad \Leftrightarrow \quad A_1/A_2 = B_1/B_2,$$

ceea ce nu este posibil, deoarece dreptele (2.5.1) și (2.5.2) nu sunt paralele, ci se intersectează într-un punct. Astfel, coeficienții necunoscutelor din ecuația (2.5.4) nu se pot anula simultan, de aceea, pentru orice  $\alpha$  și  $\beta$  ce nu se anulează simultan, această ecuație reprezintă o dreaptă. Este evident că dreapta (2.5.3) trece, într-adevăr, prin punctul  $S(x_0, y_0)$ .

Vom arăta acum, invers, că orice dreaptă din fascicol are o ecuație de forma (2.5.3), cu alte cuvinte, vom demonstra că oricum am alege o dreaptă din fascicolul de drepte din plan care trec prin punctul  $S(x_0, y_0)$ , putem alege două constante  $\alpha$  și  $\beta$ , cel puțin una nenulă, astfel încât ecuația (2.5.3) să fie ecuația dreptei alese. Fie  $M_1(X_1, y_1)$  un punct

oarecare din plan, astfel încât  $M_1 \neq S$ . Este suficient să demonstrăm că putem alege constantele  $\alpha, \beta$  astfel încât dreapta (2.5.3) să coincidă cu dreapta  $SM_1$ . Această afirmație se reduce la cerința ca  $x_1$  și  $y_2$ , coordonatele lui  $M_1$ , să verifice egalitatea

$$\alpha(A_1x_1 + B_1y_1 + C_1) + \beta(A_2x_1 + B_2y_1 + C_2) = 0. \quad (2.5.6)$$

Cum punctul  $M_1$  nu coincide cu centrul fascicolului, cel puțin una dintre cantitățile din paranteze este diferită de zero. Dacă

$$A_1x_1 + B_1y_1 + C_1 \neq 0,$$

atunci egalitatea (2.5.6) se poate rescrie sub forma:

$$\alpha = -\frac{A_2x_1 + B_2y_1 + C_2}{A_1x_1 + B_1y_1 + C_1} \beta.$$

Dacă îi dăm lui  $\beta$  o valoare nenulă arbitrară, obținem valoarea corespunzătoare a lui  $\alpha$ .

Prin urmare, pentru orice  $\alpha$  și  $\beta$  care nu se anulează simultan, ecuația (2.5.3) reprezintă ecuația unei drepte din fascicolul determinat de dreptele (2.5.1) și (2.5.2) și, invers, orice dreaptă a fascicolului se poate scrie sub forma (2.5.3). Ecuația (2.5.3) se numește *ecuația fascicolului de drepte* determinat de dreptele (2.5.1) și (2.5.2). Remarcăm că ecuația dreptei (2.5.1) se obține din ecuația (2.5.3) pentru  $\beta = 0$  și un  $\alpha \neq 0$  arbitrar, în timp ce ecuația dreptei (2.5.2) se obține din ecuația (2.5.3) pentru  $\alpha = 0$  și un  $\beta \neq 0$  arbitrar.

Împărțind ambii membri ai ecuației (2.5.3) la  $\alpha$  și notând  $\beta/\alpha = \lambda$ , ecuația obținută se scrie

$$A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0. \quad (2.5.7)$$

Pentru orice  $\lambda$ , această ecuație corespunde unei drepte din fascicolul de drepte determinat de dreptele (2.5.1) și (2.5.2). Invers, orice dreaptă a acestui fascicol, cu excepția dreptei (2.5.2) se poate scrie sub forma (2.5.7) pentru un anumit  $\lambda$ .

Dacă se cunosc coordonatele centrului  $S(x_0, y_0)$  al fascicolului, atunci ecuația fascicolului se poate scrie sub forma foarte simplă


$$\alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) = 0. \quad (2.5.8)$$

## 2.6 Distanța de la un punct la o dreaptă

Fie  $\Delta$  o dreaptă oarecare din plan.

**Definiția 2.3.** Se numește *distanță* de la un punct  $M_0$  din plan până la dreapta  $\Delta$  lungimea perpendicularei coborâte din punctul  $M_0$  pe dreapta  $\Delta$ .

Considerăm acum un versor  $\mathbf{e}$  perpendicular pe dreapta  $\Delta$ . Dacă  $\Delta$  trece prin originea coordonatelor, atunci în calitate de  $\mathbf{e}$  putem lua oricare dintre cei doi versori (opuși) care sunt perpendiculari pe dreaptă. Dacă dreapta nu trece prin origine, atunci alegem acel versor  $\mathbf{e}$ , perpendicular pe dreapta  $\Delta$ , care este orientat dinspre originea coordonatelor către dreaptă. Notăm cu  $\alpha$  unghiul dintre vectorii  $\mathbf{i}$  și  $\mathbf{e}$ . Atunci



$$\mathbf{e} = e(\cos \alpha, \sin \alpha).$$

Fie  $\Delta_1$  dreapta care trece prin origine și care este perpendiculară pe dreapta  $\Delta$ . Notăm cu  $N$  intersecția celor două drepte. Notăm, de asemenea, cu  $p$  distanța de la origine până la dreapta  $\Delta$ , adică lungimea segmentului  $ON$ . Desigur, dacă dreapta  $\Delta$  trece prin origine, atunci  $N = O$  și  $p = 0$ .

Un punct  $M(x, y)$  din plan aparține dreptei  $\Delta$  dacă și numai dacă proiecția sa ortogonală pe dreapta  $\Delta_1$  coincide cu  $N$ . Această condiție este echivalentă cu condiția:

$$\overrightarrow{OM} \cdot \mathbf{e} = p.$$

Exprimând produsul scalar utilizând componentele vectorilor, obținem, prin urmare

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0. \quad (2.6.1)$$

Această ecuație se numește *ecuația normală* sau *ecuația normală Hesse* a dreptei.

Dreapta  $\Delta$  împarte mulțimea tuturor punctelor din plan care nu îi aparțin în două submulțimi, numite *semiplane (deschise)*. Semiplanul care conține versorul  $\mathbf{e}$ , atunci când acesta este atașat punctului  $N$ , se numește *pozitiv*, iar celălalt semiplan se numește *negativ*. Remarcăm că originea coordonatelor se găsește totdeauna fie în semiplanul negativ, fie pe dreapta  $\Delta$ .

**Definiția 2.4.** Fie  $d$  distanța de la punctul  $M_0$  până la dreapta  $\Delta$ . Se numește *abatere* a punctului  $M_0$  de la dreapta  $\Delta$  numărul  $\delta$  definit prin următoarele condiții:

- 1)  $\delta = d$  dacă punctul  $M_0$  se află în semiplanul pozitiv;
- 2)  $\delta = -d$  dacă  $M_0$  se află în semiplanul negativ;
- 3)  $\delta = d = 0$  dacă  $M_0$  se află pe dreapta  $\Delta$ .

**Teorema 2.2.** *Să presupunem că în plan se dă o dreaptă  $\Delta$ , prin ecuația ei normală (2.6.1). Atunci abaterea  $\delta$  a unui punct oarecare  $M_0(x_0, y_0)$  față de dreapta  $\Delta$  și distanța  $d$  de la punct până la dreaptă sunt date de formulele:*

$$\delta = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p, \quad (2.6.2)$$

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p|. \quad (2.6.3)$$

*Demonstrație* Fie  $N_0$  piciorul perpendicularei coborâte din  $M_0$  pe dreapta  $\Delta_1$ . Din formula lui Chasles obținem că

$$\delta = (NN_0) = (ON_0) - (ON) = \overrightarrow{OM} \cdot \mathbf{e} - p = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p.$$

Formula (2.6.3) rezultă din formula (2.6.2), întrucât  $d = |\delta|$ . □

Formula (2.6.2) conduce la următoarea regulă: *pentru a obține abaterea unui punct oarecare  $M_0$  față de o dreaptă, este suficient să înlocuim coordonatele punctului în membrul stâng al ecuației normale a dreptei. Numărul obținut pe această cale este abaterea căutată.*

Să presupunem acum că dreapta este dată prin ecuația sa generală,

$$Ax + By + C = 0, \quad (2.6.4)$$

și vrem să găsim ecuația sa normală (2.6.1). Cum ecuațiile (2.6.1) și (2.6.4) reprezintă aceeași dreaptă, coeficienții lor trebuie să fie proporționali, prin urmare:

$$\cos \alpha = \lambda A, \quad \sin \alpha = \lambda B, \quad -p = \lambda C. \quad (2.6.5)$$

Din primele două relații din (2.6.5) obținem

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Potrivit celei de-a treia egalități din (2.6.5), rezultă că semnul lui  $\lambda$  trebuie să fie opus semnului termenului liber  $C$  din ecuația (2.6.4), dacă  $C \neq 0$ . Dacă  $C = 0$ , atunci  $\lambda$  poate

să aibă orice semn. O schimbare de semn la  $\lambda$  aduce după sine schimbarea între ele a semiplanului pozitiv și a celui negativ. Numărul  $\lambda$  se numește *factor normalizator* pentru ecuația (2.6.4), pentru că, după înmulțirea cu el, ecuația devine normală.

Pe baza celor remarcate, formulele pentru abaterea și distanța de la un punct  $M_0(x_0, y_0)$  până la dreapta (2.6.4) se pot scrie

$$\delta = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (2.6.6)$$

Să presupunem că se dă ecuația (2.6.4). Notăm

$$\delta' = \delta'(x_0, y_0) = Ax_0 + By_0 + C.$$

**Teorema 2.3.** *Pentru toate punctele din același semiplan determinat de dreapta (2.6.4),  $\delta'$  are același semn, iar pentru punctele din semiplanul opus are semn contrar.*

*Demonstrație* Afirmația acestei teoreme pentru ecuația normală

$$\frac{1}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}(Ax + By + C)$$

sau, cu alte cuvinte, pentru mărimea

$$\delta(x_0, y_0) = \frac{1}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}\delta'(x_0, y_0)$$

rezultă din teorema 2.2. Cum mărimile  $\delta(x_0, y_0)$  și  $\delta'(x_0, y_0)$  diferă doar printr-un factor constant, care nu depinde de punctul  $M_0(x_0, y_0)$ , rezultă că afirmația rămâne adevărată și pentru mărimea  $\delta'(x_0, y_0)$ .  $\square$

Teorema 2.3 permite stabilirea semnificației geometrice a inegalităților

$$Ax + By + C > 0, \quad (2.6.7)$$

$$Ax + By + C < 0, \quad (2.6.8)$$

care leagă variabilele  $x$  și  $y$ . Dacă  $x$  și  $y$  sunt coordonatele carteziane ale unui punct din plan, atunci inegalitatea (2.6.7) este verificată doar de coordonatele punctele planului situate într-unul dintre semiplanele deschise determinate de dreapta

$$Ax + By + C = 0.$$

Inegalitatea (2.6.8) este verificată de coordonatele punctelor situate în cel de-al doilea semiplan deschis și numai de ele. În mod corespunzător, inegalitățile

$$Ax + By + C \geq 0,$$

$$Ax + By + C \leq 0,$$

descriu câte un semiplan împreună cu semidreapta care îl mărginește (sau, cum se mai spune, câte un semiplan *închis*).

## 2.7 Unghiul dintre două drepte

Să presupunem că se dau, în plan, două drepte,  $\Delta_1$  și  $\Delta_2$ , prin intermediul ecuațiilor lor generale:

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad (2.7.1)$$

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0. \quad (2.7.2)$$

După cum s-a văzut, în calitate de vectori directori ai acestor drepte pot fi luați vectorii  $\mathbf{a}_1(-B_1, A_1)$  și  $\mathbf{a}_2(-B_2, A_2)$ . Prin urmare,

$$\cos \varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}. \quad (2.7.3)$$

Aici cu  $\varphi$  se notează unul dintre cele două unghiuri formate de cele două drepte. Dacă dreptele sunt paralele, atunci, prin convenție, se consideră că dreptele fac între ele un unghi egal cu zero.

Din formula (2.7.3) rezultă, în particular, condiția necesară și suficientă pentru ca dreptele (2.7.1) și (2.7.2) să fie perpendiculare:

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0. \quad (2.7.4)$$

Să presupunem acum că dreptele  $\Delta_1$  și  $\Delta_2$  sunt date nu prin ecuațiile generale ci cu ajutorul coeficienților unghiulari:

$$y = k_1x + b_1, \quad (2.7.5)$$

$$y = k_2x + b_2. \quad (2.7.6)$$

Notăm cu  $\varphi$  unghiul cu care trebuie rotită dreapta  $\Delta_1$  în jurul punctului de intersecție a dreptelor, pentru a se suprapune peste dreapta  $\Delta_2$ . Dacă dreptele sunt paralele, atunci vom

considera că  $\varphi = 0$ . Fie  $\alpha_1$  și  $\alpha_2$  unghiurile pe care le fac cele două drepte cu axa  $Ox$ , adică avem  $k_1 = \operatorname{tg} \alpha_1$ ,  $k_2 = \operatorname{tg} \alpha_2$ . Atunci  $\varphi = \alpha_2 - \alpha_1$  și avem:

$$\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg}(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2 - \operatorname{tg} \alpha_1}{1 + \operatorname{tg} \alpha_1 \operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}.$$

Astfel,

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}. \quad (2.7.7)$$

Din formula (2.7.7) se poate obține cu ușurință condiția de perpendicularitate a dreptelor (2.7.5) și (2.7.6). Ea corespunde cazului în care  $\operatorname{tg} \varphi$  nu există, adică, în formula (2.7.7), se anulează numitorul:

$$1 + k_1 k_2 = 0.$$

Astfel, condiția necesară și suficientă pentru ca dreptele (2.7.5) și (2.7.6) să fie perpendiculare este ca

$$k_2 = -\frac{1}{k_1}. \quad (2.7.8)$$

## 2.8 Problems

**Problem 2.1.** Find the equation of the line passing through  $(2, -3)$ , which is parallel to the line passing through  $(4, 1)$  and  $(-2, 2)$ .

**Problem 2.2.** Find the equation of the line passing through  $(-2, 3)$  and which is perpendicular on the line  $2x - 3y + 6 = 0$ .

**Problem 2.3.** Find the equation of the mediator of the segment connecting the points  $(7, 4)$  and  $(-1, -2)$ .

**Problem 2.4.** Find the equation of the line passing through  $(2, -3)$  and making an angle of  $60^\circ$  with the positive direction of the  $x$ -axis.

**Problem 2.5.** Find the equations of a line of slope  $-3/4$  and making with the coordinate axes an angle of area equal to  $24$ .

**Problem 2.6.** Find the normal form of the equation of the line  $3x - 4y - 6 = 0$ .

**Problem 2.7.** Establish the equations of the lines passing through  $(4, -2)$ , situated at the distance  $2$  from the origin.

**Problem 2.8.** Find the equations of the bisectors of the angles made by the lines

$$(L_1) 3x - 4y + 8 = 0$$

and

$$(L_2) 5x + 12y - 15 = 0.$$

**Problem 2.9.** Find the equations of the lines parallel to the line  $12x - 5y - 15 = 0$ , situated at the distance 4 from this one.

**Problem 2.10.** Find the value of  $k$  such that the distance from the point  $(2, 3)$  to the line  $8x + 15y + k = 0$  be equal to 5.

**Problem 2.11.** Two medians of a triangle lie on the lines  $x + y = 2$  and  $2x + 3y = 1$ , respectively, and the point  $A(1, 1)$  is one of the vertices of the triangle. Write the equations of the sides of this triangle.

**Problem 2.12.** The points  $K(1, -1)$ ,  $L(3, 4)$  and  $M(5, 0)$  are the midpoints of the sides  $AD$ ,  $AB$  and  $CD$ , respectively, of the quadrilateral  $ABCD$ , the diagonals of which cross at  $O(2, 2)$ . Find the coordinates of the vertices of the quadrilateral.

**Problem 2.13.** Find the equations of the lines passing through the point  $A(-1, 5)$ , which are equally distant from the points  $B(3, 7)$  and  $C(1, -1)$ .

**Problem 2.14.** Find the equations of the lines equally distant from the points  $A(3, -1)$ ,  $B(9, 1)$  and  $C(-5, 5)$ .

**Problem 2.15.** The point  $A(3, -2)$  is a vertex of a square, while  $M(1, 1)$  is the intersection point of its diagonals. Establish the equations of the sides of the square.

**Problem 2.16.** The length of the side of a rhomboid, with the acute angle equal to  $60^\circ$ , is equal to 2. The diagonals of the rhomboid intersect each other at the point  $M(1, 2)$ , and the longest diagonal is parallel to the  $x$ -axis. Find the equations of the sides of the rhomboid.

**Problem 2.17.** Find a point on the line  $5x - 4y - 4 = 0$  which is equally distant from the points  $A(1, 0)$  and  $B(-2, 1)$ .

**Problem 2.18.** Find a point  $A$  on the line  $x + y = 8$ , which is equally distant from the point  $B(2, 8)$  and the line  $x - 3y + 2 = 0$ .

**Problem 2.19.** Find the coordinates of all the points which are equally distant from the point  $A(-1, 1)$  and the lines  $y = -x$  and  $y = x + 1$ .



**Problem 2.20.** In the triangle  $ABC$  the points  $M_1(2, 3)$ ,  $M_2(0, 7)$  are  $M_3(-2, 5)$  the midpoints of the sides  $BC$ ,  $CA$  and  $AB$ , respectively. Establish the equation of the line  $AB$ . Find the angle between the medians  $AM_1$  and  $BM_2$ .

**Problem 2.21.** In the parallelogram  $ABCD$  the vertices  $A$  and  $C$  have the coordinates and  $(7, 10)$ , respectively, while  $H(3, 0)$  is the foot of the perpendicular from the vertex  $B$  to the side  $AD$ . Find the equation of the line  $AD$ , as well as the angle between the lines  $AD$  and  $AB$ .

**Problem 2.22.** In the parallelogram  $ABCD$ , the points  $K(-1, 2)$ ,  $L(3, 4)$  and  $M(5, 6)$ , respectively, are the midpoints of the sides  $AB$ ,  $BC$  and  $CD$ , respectively. Establish the equation of the line  $BC$ . Find the angle between the lines  $AL$  and  $AM$ .

**Problem 2.23.** In the trapezium  $ABCD$ , with the bases  $AD$  and  $BC$ , the side  $CD$  is perpendicular on the bases, the points  $A$  and  $C$  have the coordinates  $(5, 2)$  and  $(-2, 3)$ , respectively, while the extensions of the non-parallel sides intersect at the point  $P(-3, 6)$ . Establish the equation of the line  $AD$  and find the angle between the lines  $AD$  and  $AB$ .

**Problem 2.24.** The points  $K(1, 3)$  and  $L(-1, 1)$  are the midpoints of the bases of an isosceles trapezium, while the points  $P(3, 0)$  and  $Q(-3, 5)$  lie on the non-parallel sides. Find the equations of the sides of the trapezium.

**Problem 2.25.** Establish the equation of a line passing through the point  $A(3, 1)$  and making an angle of  $45^\circ$  with the line  $3x - y - 2 = 0$ .

**Problem 2.26.** The point  $A(2, 0)$  is vertex of an equilateral triangle and the opposite side lies on the line  $x + y - 1 = 0$ . Find the equations of the other two sides of the triangle.

**Problem 2.27.** The base of an isosceles triangle lies on the line  $x + 2y = 2$ , while one of the equal sides is situated on the line  $y + 2x = 1$ . Find the equation of the third side, knowing that the distance from the intersection point of the given lines to this side is equal to  $1/\sqrt{5}$ .

**Problem 2.28.** We consider that angle made of the lines  $y = x + 1$  and  $y = 7x + 1$  which has point  $A(1, 3)$  in its interior. Find the coordinates of the point  $B$ , lying in the interior of the same angle, situated at the distance  $4\sqrt{2}$  from the first line and at the distance  $\sqrt{2}$  from the second line.

**Problem 2.29.** Find the equation of the bisector of that angle made of the lines  $x - 7y = 1$  and  $x + y = -7$ , having the point  $A(1, 1)$  in its interior.



## CAPITOLUL 3

---

### Dreapta și planul în spațiu

---

#### Cuprins

---


<b>3.1</b>	<b>Planul</b> . . . . .	<b>78</b>
3.1.1	Ecuția vectorială a planului . . . . .	78
3.1.2	Ecuția generală a planului . . . . .	80
3.1.3	Altă formă a ecuației vectoriale a planului . . . . .	82
3.1.4	Ecuția planului determinat de trei puncte necoliniare . . . . .	82
3.1.5	Condiția de coplanaritate a patru puncte . . . . .	83
3.1.6	Ecuția planului prin tăieturi . . . . .	83
3.1.7	Ecuția normală a unui plan . . . . .	84
3.1.8	Distanța de la un punct la un plan . . . . .	85
3.1.9	Unghiul a două plane . . . . .	86
<b>3.2</b>	<b>Dreapta în spațiu</b> . . . . .	<b>87</b>
3.2.1	Ecuția vectorială și ecuațiile parametrice ale dreptei . . . . .	87
3.2.2	Ecuțiile canonice ale unei drepte în spațiu . . . . .	87
3.2.3	Dreapta ca intersecție de două plane . . . . .	88
3.2.4	Ecuțiile drepte care trece prin două puncte . . . . .	89
3.2.5	Unghiul a două drepte în spațiu . . . . .	89
<b>3.3</b>	<b>Probleme diverse referitoare la drepte și plane în spațiu</b> . . . . .	<b>91</b>
3.3.1	Pozițiile relative a două plane . . . . .	91

3.3.2	Pozițiile relative a trei plane . . . . .	92
3.3.3	Fascicule de plane. Snopuri de plane . . . . .	94
3.3.4	Poziția relativă a unei drepte față de un plan . . . . .	96
3.3.5	Ecuția unui plan determinat de două drepte concurente . . . . .	97
3.3.6	Ecuția planului determinat de o dreaptă și un punct . . . . .	98
3.3.7	Ecuția planului determinat de două drepte paralele . . . . .	98
3.3.8	Proiecția unei drepte pe un plan . . . . .	99
3.3.9	Poziția relativă a două drepte în spațiu . . . . .	99
3.3.10	Distanța de la un punct la o dreaptă în spațiu . . . . .	101
3.3.11	Perpendiculara comună a două drepte strâmbe . . . . .	101
3.3.12	Lungimea perpendiculararei comune a două drepte necoplanare . . . . .	103
3.3.13	Unghiul dintre o dreaptă și un plan . . . . .	103
<b>3.4</b>	<b>Probleme . . . . .</b>	<b>104</b>

## 3.1 Planul

### 3.1.1 Ecuția vectorială a planului

Fie  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$  doi vectori necoliniari din spațiu și  $M_0$  un punct oarecare. Dacă atașăm vectorii punctului  $M_0$ , atunci există două puncte, unic determinate,  $P$  și  $Q$ , astfel încât  $\mathbf{v} = \overrightarrow{M_0P}$  și  $\mathbf{w} = \overrightarrow{M_0Q}$ . Cum vectorii  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$  sunt necoliniari, punctele  $M_0, P$  și  $Q$ , la rândul lor, sunt necoliniare, deci determină un plan  $\Pi$ . Intenționăm să descriem punctele acestui plan cu ajutorul punctului  $M_0$  și al vectorilor  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$ .



Fie  $M$  un punct din spațiu. Notăm cu  $\mathbf{r}_0$  vectorul de poziție al punctului  $M_0$  și cu  $\mathbf{r}$  vectorul de poziție al punctului  $M$ . Punctul  $M$ , în mod clar, aparține planului dacă și

numai dacă vectorul  $\overrightarrow{M_0M}$  este coplanar cu vectorii  $\overrightarrow{M_0P}$  și  $\overrightarrow{M_0Q}$ , adică cu vectorii  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$ . Să presupunem că  $M$  aparține planului  $\Pi$ . Aceasta înseamnă, întrucât vectorii  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$  sunt liniar independenți, că  $\overrightarrow{M_0M}$  are o descompunere (unică) sub forma unei combinații liniare a vectorilor  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$ , cu alte cuvinte, există (și sunt unice) două numere reale  $s$  și  $t$  astfel încât să avem

$$\overrightarrow{M_0M} = s\mathbf{v} + t\mathbf{w}. \quad (3.1.1)$$

Pe de altă parte,  $\overrightarrow{M_0M} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ , deci ecuația precedentă se poate scrie

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{v} + t\mathbf{w}, \quad (3.1.2)$$

ecuație care se numește *ecuația vectorială a planului  $\Pi$* .

Să presupunem acum că punctul  $M$  are coordonatele  $(x, y, z)$ ,  $M_0$  are coordonatele  $(x_0, y_0, z_0)$ , iar vectorii  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$  au componentele  $(v_x, v_y, v_z)$ , respectiv  $(w_x, w_y, w_z)$ . Atunci ecuația vectorială (3.1.2) este echivalentă cu sistemul de ecuații scalare

$$\begin{cases} x = x_0 + sv_x + tw_x \\ y = y_0 + sv_y + tw_y \\ z = z_0 + sv_z + tw_z \end{cases}, \quad (3.1.3)$$

ecuații care se numesc *ecuațiile parametrice ale planului  $\Pi$* .

Ecuația planului se poate reprezenta sub formă vectorială și fără a utiliza parametrii. Într-adevăr, avem următorul rezultat:

**Teorema 3.1.** *Ecuația vectorială a unui plan care trece printr-un punct  $M_0$  și este perpendiculară pe un vector  $\mathbf{n}$  dat este*

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (3.1.4)$$

*Demonstrație* Fie  $\Pi$  planul determinat de punct și de vectorul normal. Dacă  $M$  este un punct oarecare al planului, atunci  $\overrightarrow{M_0M} \perp \mathbf{n}$ , de unde rezultă că

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (3.1.5)$$

sau

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

□

### 3.1.2 Ecuația generală a planului

**Definiția 3.1.** Se numește *ecuație liniară (generală) relativ la necunoscutele  $x, y, z$*  o ecuație de forma

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (3.1.6)$$

unde cel puțin unul dintre coeficienții  $A, B, C$  ai necunoscutelor este diferit de zero.

**Teorema 3.2.** *Într-un sistem de coordonate carteziene rectangulare, un plan este definit de o ecuație liniară generală de forma (3.1.6).*

*Demonstrație* Considerăm un plan care trece prin punctul  $M_0$  și are vectorul normal  $\mathbf{n}(A, B, C)$ . Atunci, pentru orice punct  $M(x, y, z)$  din plan, avem

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{n} = 0$$

sau

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

sau, încă,

$$Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0,$$

care este o ecuație liniară generală în  $x, y, z$ .

Invers, fie  $M(x, y, z)$  un punct din spațiu care verifică o ecuație de forma

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

cu  $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ .

Să presupunem, de exemplu, că în ecuația de mai sus  $A \neq 0$ . Atunci, în mod evident, punctul  $M_0(-D/A, 0, 0)$  verifică, de asemenea, această ecuație. Notăm cu  $\mathbf{n}$  vectorul de componente  $(A, B, C)$ . Cum

$$\overrightarrow{M_0M} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = (x + D/A, y, z),$$

ecuația planului care trece prin  $M_0$  și are vectorul normal  $\mathbf{n}$  este

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{n} = 0$$

sau

$$A(x + D/A) + By + Cz = 0 \text{ sau } Ax + By + Cz + D = 0,$$

prin urmare, punctul  $M$  este situat în planul care trece prin  $M_0$  și are pe  $\mathbf{n}$  ca vector normal.  $\square$

**Cazuri particulare ale ecuației generale a planului**

a) Ecuația unui plan care trece prin origine este:

$$Ax + By + Cz = 0.$$

Într-adevăr, se observă imediat că ecuația de mai sus este verificată de originea  $O(0, 0, 0)$ .

b) Ecuațiile planelor paralele cu axele de coordonate sunt

$$\begin{aligned} Ax + By + D &= 0 && \text{(paralele cu axa Oz),} \\ Ax + Cz + D &= 0 && \text{(paralele cu axa Oy),} \\ By + Cz + D &= 0 && \text{(paralele cu axa Ox).} \end{aligned}$$

Într-adevăr, dacă în ecuația generală a planului punem  $C = 0$ , ea devine

$$Ax + By + D = 0.$$

În acest caz, vectorul normal la plan,  $\mathbf{n}(A, B, 0)$  are proiecția ortogonală pe axa  $Oz$  nulă, așadar vectorul este perpendicular pe axă, deci planul este paralel cu axa  $Oz$ . La fel stau lucrurile și în celelalte două cazuri. Dacă, în particular, și  $D = 0$ , atunci planele *trec* prin axe, nu sunt doar paralele cu ele.

c) Ecuațiile planelor paralele cu planele de coordonate sunt

$$\begin{aligned} Ax + D &= 0 && \text{(paralele cu planul } yOz), \\ By + D &= 0 && \text{(paralele cu planul } xOz), \\ Cz + D &= 0 && \text{(paralele cu planul } xOy). \end{aligned}$$

Într-adevăr, dacă, de exemplu, punem în ecuația planului  $B = C = 0$ , ea se transformă în

$$Ax + D = 0.$$

Vectorul normal la acest plan este  $\mathbf{n}(A, 0, 0)$ . Acest vector este perpendicular pe planul  $yOz$ , deci planul are ca vector normal este *paralel* cu planul  $yOz$ . La fel se raționează și în cazul celorlalte două plane de coordonate.

Și aici, ca și mai sus, dacă punem și  $D = 0$ , obținem plane care sunt paralele cu planele de coordonate și trec prin origine, adică obținem ecuațiile *planelor de coordonate*,  $x = 0$ ,  $y = 0$ , respectiv  $z = 0$ .

### 3.1.3 Altă formă a ecuației vectoriale a planului

Plecăm de la ecuația vectorială a planului care trece printr-un punct și este paralel cu doi vectori necoliniari:

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = s\mathbf{v} + t\mathbf{w}.$$

Această ecuație este echivalentă cu cerința ca vectorii  $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ ,  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$  să fie liniar dependenți, adică, de asemenea, cu condiția ca

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0. \quad (3.1.7)$$

Această ecuație se numește, de regulă, pur și simplu, *ecuația planului care trece prin punctul  $M_0$  și este paralelă cu vectorii  $\mathbf{u}$  și  $\mathbf{v}$* . Dacă dezvoltăm produsul mixt (3.1.7), se constată imediat că această ecuație este echivalentă cu ecuația

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.1.8)$$

### 3.1.4 Ecuația planului determinat de trei puncte necoliniare

Fie  $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ,  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ,  $M_3(x_3, y_3, z_3)$  trei puncte necoliniare din spațiu. Atunci cele trei puncte determină un plan. Pentru a obține ecuația sa, aplicăm metoda de la punctul precedent. Mai precis, fie

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &\equiv \overrightarrow{M_1M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1), \\ \mathbf{w} &\equiv \overrightarrow{M_1M_3}(x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1). \end{aligned}$$

Atunci acești doi vectori sunt, în mod evident, necoliniari și paraleli cu planul. Planul a cărui ecuație o căutăm este cel care trece prin  $M_1$  și este paralel cu vectorii  $\mathbf{v}$  și  $\mathbf{w}$ . Prin urmare, ecuația sa este (vezi 3.1.8):

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.1.9)$$

Ecuația (3.1.9) se poate rescrie în forma de mai jos, mai ușor de memorat:

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.1.10)$$



### 3.1.5 Condiția de coplanaritate a patru puncte

Din formula (3.1.10) rezultă imediat *condiția de coplanaritate a patru puncte*:

*Patru puncte  $M_1, M_2, M_3, M_4$  sunt coplanare dacă și numai dacă:*

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.1.11)$$

### 3.1.6 Ecuația planului prin tăieturi

Fie  $\Pi$  un plan care nu trece prin origine și prin nici una dintre axe. Atunci, după cum am văzut mai sus, ecuația sa generală este

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

unde nici unul dintre cei patru coeficienți nu se anulează. Fie P, Q, R cele trei puncte în care planul intersectează axele de coordonate. Atunci punctul de intersecție cu  $Ox$ , determinat de ecuațiile  $y = 0, z = 0$ , va fi  $P(-D/A, 0, 0)$ , punctul de intersecție c axa  $Oy$ , de ecuații  $x = 0, z = 0$ , va fi  $Q(0, -D/B, 0)$ , în timp ce punctul de intersecție cu axa  $Oz$ , de ecuații  $x = 0, z = 0$ , va fi  $R(0, 0, -D/C)$ . Dacă introducem notațiile

$$a = -\frac{D}{A}, \quad b = -\frac{D}{B}, \quad c = -\frac{D}{C},$$

ecuația planului care trece prin punctele P, Q, R se va scrie

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Dacă dezvoltăm ecuația de mai sus, obținem

$$bcx + cay + abz - abc = 0$$

sau, dacă împărțim cu  $abc$ ,

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1 = 0. \quad (3.1.12)$$

Ecuația (3.1.12) se numește *ecuația planului prin tăieturi*. Motivul este legat de faptul că lungimile cu semn  $a, b, c$  se numesc *tăieturile* planului pe axele de coordonate. Ele sunt lungimile cu semn ale segmentelor determinate de origine și de punctele de intersecție ale planului cu cele trei axe de coordonate, lungimi măsurate disinspre origine.

### 3.1.7 Ecuția normală a unui plan

Fie  $\Pi$  un plan și  $OP$  – perpendiculara din origine pe plan. Dacă planul trece prin origine, atunci punctul  $P$  coincide cu originea, deci lungimea vectorului  $\overrightarrow{OP}$  este egală cu zero. În cazul general, însă, fie

$$p \equiv \|\overrightarrow{OP}\|$$

lungimea acestui vector (egală, de fapt, cu distanța de la origine la planul  $\Pi$ ).

Fie  $\mathbf{n}(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  versorul vectorului  $\overrightarrow{OP}$  (care este, în același timp, versorul normalei la plan). Atunci punctul  $P$  (piciorul perpendicularei pe plan din origine), va avea coordonatele

$$P(p \cos \alpha, p \cos \beta, p \cos \gamma),$$

prin urmare, dacă  $M(x, y, z)$  este un punct oarecare din planul  $\Pi$ , atunci componentele sale vor fi

$$\overrightarrow{PM}(x - p \cos \alpha, y - p \cos \beta, z - p \cos \gamma).$$

Cum vectorii  $\overrightarrow{PM}$  și  $\mathbf{n}$  sunt perpendiculari, avem

$$\overrightarrow{PM} \cdot \mathbf{n} = 0$$

sau

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p \underbrace{(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)}_{=1} = 0$$

sau, în final,

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0. \quad (3.1.13)$$

Ecuția (3.1.13) se numește *forma normală Hesse* sau, pur și simplu, *forma normală* a ecuației planului.

Forma normală a ecuației unui plan este utilă în anumite situații, de aceea, vom arăta cum se poate obține. Plecăm cu un plan scris sub forma generală,

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Acest plan are și o ecuație normală,

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0.$$

Cum cele două ecuații trebuie să reprezinte același plan, coeficienții lor trebuie să fie proporționali:

$$\cos \alpha = \lambda A, \quad \cos \beta = \lambda B, \quad \cos \gamma = \lambda C, \quad -p = \lambda D.$$

Dacă ridicăm la pătrat primele trei egalități și le însumăm, obținem

$$\lambda^2 (A^2 + B^2 + C^2) = 1,$$

unde am folosit, din nou, faptul că  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ . Așadar,

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (3.1.14)$$

Semnul din (3.1.14) se alege astfel încât să fie opus semnului termenului liber D din ecuația generală. Dacă  $D = 0$ , atunci semnul lui  $\lambda$  se poate alege oricum.  $\lambda$  se numește, din motive evidente, *factor normalizator* al ecuației generale a planului.

Planul  $\Pi$  împarte mulțimea tuturor punctelor din spațiu care nu aparțin lui  $\Pi$  în două submultimi, numite *semispații deschise*. Vom numi *semispațiu pozitiv* acel semispațiu înspre care este îndreptat vectorul  $\mathbf{n}$ . Celălalt se numește *semispațiu negativ*. Trebuie remarcat că originea spațiului se află întotdeauna fie în planul  $\Pi$ , fie în semispațiul negativ.

### 3.1.8 Distanța de la un punct la un plan

**Definiția 3.2.** Se numește *distanță* de la un punct  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  la planul  $\Pi$  lungimea  $d$  a perpendicularei coborâte din punctul  $M_0$  pe planul  $\Pi$ . Se numește *abatere* (sau *deviere*) a punctului  $M_0$  relativ la planul  $\Pi$  numărul  $\delta$  definit astfel încât:

- a)  $\delta = d$  dacă  $M_0$  este în semispațiul pozitiv determinat de  $\Pi$ ;
- b)  $\delta = 0$  dacă  $M_0 \in \Pi$ ;
- c)  $\delta = -d$  dacă  $M_0$  este în semispațiul negativ.

**Teorema 3.3.** *Dacă planul este dat prin ecuația normală*

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0,$$

*atunci au loc formulele*

$$\delta = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p; \quad (3.1.15)$$

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p|. \quad (3.1.16)$$

*Dacă planul este dat prin ecuația sa generală,*

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

atunci au loc formulele

$$\delta = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\pm\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad (3.1.17)$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (3.1.18)$$

*Demonstrație* Notăm cu  $P_0$  proiecția ortogonală a lui  $M_0$  pe dreapta  $OP$ . Atunci

$$\delta = (PP_0) = (OP_0) - (OP) = \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{OM_0} - p = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p.$$

Așadar, formula (3.1.15) este demonstrată. (3.1.16) rezultă din (3.1.15), pentru că, în mod evident,  $d = |\delta|$ .  $\square$

### 3.1.9 Unghiul a două plane

Prin *unghiul a două plane* înțelegem măsura unghiului plan asociat unghiului diedru format de cele două plane, adică măsura unghiului format de direcțiile normale la cele două plane.

Este de remarcat că cele două plane formează, în fapt, nu unul ci *patru* unghiuri, două câte două opuse și egale și adiacente suplimentare.

Considerăm două plane

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad (3.1.19)$$

și

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (3.1.20)$$

Vectorii normali la cele două plane sunt  $\mathbf{n}_1(A_1, B_1, C_1)$  și  $\mathbf{n}_2(A_2, B_2, C_2)$ , prin urmare unghiurile sunt date de

$$\cos \alpha_{1,2} = \pm \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (3.1.21)$$

Dacă membrul drept este pozitiv, se obțin unghiurile acute, dacă este negativ – unghiurile obtuze.

Din formula (3.1.21), rezultă că cele două plane sunt perpendiculare dacă și numai dacă

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0. \quad (3.1.22)$$

Pe de altă parte, planele sunt paralele exact atunci când cei doi vectori normali sunt paraleli, adică dacă și numai dacă

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}. \quad (3.1.23)$$

## 3.2 Dreapta în spațiu

### 3.2.1 Ecuația vectorială și ecuațiile parametrice ale dreptei

Fie  $\Delta$  o dreaptă în spațiu. Un vector nenul  $\mathbf{a}$  se numește *vector director* al dreptei  $\Delta$  dacă orice segment orientat din clasa lui  $\mathbf{a}$  este paralel cu dreapta  $\Delta$ . Dacă  $\mathbf{a}(l, m, n)$  este un vector director al dreptei  $\Delta$ , iar  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  este un punct oarecare al acestei drepte, atunci un punct arbitrar din spațiu,  $M(x, y, z)$ , aparține dreptei dacă și numai dacă vectorul  $\overrightarrow{M_0M}(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$  este coliniar cu vectorul  $\mathbf{a}$ . Notăm cu  $\mathbf{r}_0$ , respectiv  $\mathbf{r}$  vectorii de poziție  $\overrightarrow{OM_0}$ ,  $\overrightarrow{OM}$  ai punctelor  $M_0$ , respectiv  $M$ . Atunci

$$\overrightarrow{M_0M} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0,$$

prin urmare vectorii  $\overrightarrow{M_0M}$  și  $\mathbf{a}$  sunt coliniari dacă și numai dacă există un număr real  $t$  astfel încât să avem

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{a},$$

sau

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}. \quad (3.2.1)$$

Ecuația (3.2.1) se numește *ecuația vectorială* a dreptei  $\Delta$ , care trece prin punctul  $M_0$  și are ca vector director vectorul  $\mathbf{a}$ . Această ecuație este echivalentă, în mod evident, cu un sistem de trei ecuații scalare,

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}, \quad (3.2.2)$$

ecuații care se numesc *ecuațiile parametrice* ale dreptei care trece prin punctul  $M_0(x_0, y_0)$  și are vectorul director  $\mathbf{a}(l, m, n)$ . Menționăm că dacă se trece la un alt sistem de coordonate, forma ecuațiilor parametrice ale dreptei se modifică (deoarece se schimbă atât coordonatele punctului  $M_0$ , cât și componentele vectorului director), în timp ce ecuația vectorială are aceeași formă în orice sistem de coordonate afine (chiar dacă nu e vorba de o bază ortonormată).

### 3.2.2 Ecuațiile canonice ale unei drepte în spațiu

Dacă fiecare dintre componentele  $l, m, n$  ale vectorului director  $\mathbf{a}$  este diferită de zero, atunci ecuațiile (3.2.2) sunt echivalente cu sistemul

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \quad \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}, \quad \frac{z - z_0}{n} = \frac{x - x_0}{l}, \quad (3.2.3)$$

sistem pe care îl vom scrie, de regulă, sub forma

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \quad (3.2.4)$$

Ecuțiile (3.2.4) se numesc *ecuațiile canonice* ale dreptei care trece prin punctul  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  și are vectorul director  $\mathbf{a}(l, m, n)$ .

*Observație.* Din moment ce vectorul director  $\mathbf{a}$  este diferit de zero, întotdeauna se poate găsi un sistem de coordonate în raport cu care toate componentele sale să fie nenule. Totuși, în anumite sisteme de coordonate, una sau două dintre componentele sale pot fi egale cu zero. Nu există nici un motiv pentru care să nu putem scrie ecuațiile canonice ale dreptei și în astfel de sisteme de coordonate. Vom face, de aceea, așa cum am procedat în cazul ecuației canonice a dreptei în plan, convenția că  $0/0 = 0$ . Ca lucrurile să fie foarte clare, precizăm că, cu această convenție, un sistem de ecuații canonice de forma

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{0}$$

este echivalent cu sistemul de ecuații

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \quad z = z_0, \quad l \neq 0, \quad m \neq 0,$$

în timp ce un sistem de ecuații de forma

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{0}, \quad l \neq 0,$$

este echivalent cu sistemul

$$y = y_0, \quad z = z_0.$$

### 3.2.3 Dreapta ca intersecție de două plane

O dreaptă în spațiu se poate reprezenta ca o intersecție de două plane distincte, care trec printr-o aceeași dreaptă. Prin urmare, ea poate fi dată cu ajutorul unui sistem de două ecuații liniare:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (3.2.5)$$

Cum planele care definesc dreapta nu sunt paralele, coeficienții necunoscutelor din cele două ecuații ale sistemului (3.2.5) nu sunt proporționali. Altfel spus, rangul matricii acestui sistem de ecuații liniare este maxim (adică este egal cu doi).

Ecuțiile sistemului (3.2.5) care definesc o dreaptă dată nu sunt unice. În mod clar, fiecare dintre ele se poate înlocui cu o ecuație de forma

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

unde  $\alpha$  și  $\beta$  sunt numere reale care nu se anulează simultan, astfel încât, firește, sistemul să aibă, în continuare, rang maxim.

Este evident că și afirmația inversă este adevărată, adică orice sistem de ecuații de forma (3.2.5), de rang doi, descrie o dreaptă în spațiu.

De multe ori, trebuie să găsim vectorul director al unei drepte dată ca intersecție de două plane. Considerăm dreapta (3.2.5) și fie  $\mathbf{n}_1(A_1, B_1, C_1)$  și  $\mathbf{n}_2(A_2, B_2, C_2)$  – vectorii normali la cele două plane care determină dreapta. Atunci produsul lor vectorial,

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$$

este, în mod evident, un vector director al dreptei, prin urmare

$$\mathbf{v} = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

### 3.2.4 Ecuțiile dreptei care trece prin două puncte

Să presupunem că se dau două puncte distincte  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  și  $M_2(x_2, y_2, z_2)$  ale unei drepte  $\Delta$ . Atunci vectorul  $\overrightarrow{M_1M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$  este un vector director al dreptei, prin urmare dreapta  $\Delta$  este dreapta care trece prin punctul  $M_1$  și are ca vector director vectorul  $\overrightarrow{M_1M_2}$ . Așadar ecuațiile parametrice ale dreptei  $\Delta$  (care trece prin punctul  $M_1$  și are ca vector director pe  $\overrightarrow{M_1M_2}$ ), vor fi

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t, \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t, \\ z = z_1 + (z_2 - z_1)t. \end{cases} \quad (3.2.6)$$

Ecuțiile acestea se pot rescrie, firește, sub forma canonică:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (3.2.7)$$

### 3.2.5 Unghiul a două drepte în spațiu

Prin definiție, unghiul a două drepte în spațiu este unghiul pe care îl formează *vectorii lor directori*. Menționăm, de la bun început, că nu este necesar ca cele două drepte să fie

coplanare. Vectorii lor directori fiind vectori liberi, ei pot fi plasați cu originea în același punct. Un alt lucru care trebuie menționat este că, folosind vectorii directori, unghiul dintre drepte nu este unic determinat. Mai precis, dacă schimbăm sensul unuia dintre vectorii directori, unghiul se transformă în suplementarul său. De aceea, dacă vrem să determinăm unghiul *ascuțit* dintre cele două drepte, trebuie să ne asigurăm că unghiul respectiv are un cosinus pozitiv.

Fie, prin urmare,

$$(D_1) : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1} \quad (3.2.8)$$

și

$$(D_2) : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}, \quad (3.2.9)$$

de vectori directori  $\mathbf{v}_1(l_1, m_1, n_1)$ , respectiv  $\mathbf{v}_2(l_2, m_2, n_2)$ . Atunci unghiul dintre cele două drepte este dat de

$$\cos \varphi_{1,2} = \pm \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \cdot \|\mathbf{v}_2\|} = \pm \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}. \quad (3.2.10)$$

Unghiul *ascuțit* dintre cele două drepte este dat de

$$\cos \varphi = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}. \quad (3.2.11)$$

Dreptele (3.2.8) și (3.2.9) sunt *perpendiculare* dacă vectorii lor directori sunt perpendiculari, adică dacă

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \equiv l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0. \quad (3.2.12)$$

Dreptele (3.2.8) și (3.2.9) sunt *paralele* dacă vectorii lor directori sunt coliniari, adică dacă există un scalar (nenul, în cazul nostru)  $\lambda \in \mathbb{R}$  astfel încât să avem

$$\mathbf{v}_1 = \lambda \mathbf{v}_2 \quad (3.2.13)$$

sau (cu aceeași convenție ca și la ecuațiile dreptei)

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}. \quad (3.2.14)$$



### 3.3 Probleme diverse referitoare la drepte și plane în spațiu

#### 3.3.1 Pozițiile relative a două plane

Presupunem că s-a fixat un sistem de coordonate afine  $Oxyz$  și sunt date două plane, prin ecuațiile lor generale

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (3.3.1)$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (3.3.2)$$

Este clar, din considerente geometrice, că cele două plane se pot afla în următoarele situații:

- 1) se taie după o dreaptă;
- 2) sunt paralele, dar nu coincid;
- 3) coincid.

Scopul nostru este să stabilim relațiile care există între coeficienții celor două ecuații în fiecare caz.

Vom numi *urme* a planului (3.3.1) pe planul de coordonate  $xOy$  intersecția dintre acest plan și planul de coordonate. Dacă planul (3.3.1) nu este paralel cu planul  $xOy$ , atunci această intersecție este o dreaptă care, privită ca dreaptă în planul de coordonate, va avea, în mod evident, ecuația

$$A_1x + B_1y + D_1 = 0.$$

Analog se obțin urmele planului pe planele de coordonate  $xOz$  și  $yOz$ , dacă planul nostru nu este paralel nici cu aceste plane de coordonate. Este clar că planul (3.3.2) coincide cu planul (3.3.1) dacă și numai dacă urmele lor pe planele de coordonate coincid. Din studiul poziției reciproce a două drepte în plan, știm deja că aceasta se întâmplă dacă și numai dacă toți coeficienții celor două plane sunt proporționali, adică dacă și numai dacă există un scalar nenul  $\lambda$  astfel încât să avem

$$A_1 = \lambda A_2, \quad B_1 = \lambda B_2, \quad C_1 = \lambda C_2, \quad D_1 = \lambda D_2 \quad (3.3.3)$$

sau

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2},$$

scriere care poate fi folosită dacă nici unul dintre coeficienții celui de-al doilea plan nu se anulează sau dacă facem convenția că în scrierea de mai sus, de fiecare dată când un

coeficient al celei de-al doilea plan se anulează, la fel se întâmplă și cu coeficientul similar al primei ecuații.

Din punct de vedere algebric, la aceeași concluzie se poate ajunge și pe altă cale. Pentru ca planele (3.3.1) și (3.3.2) să coincidă, este necesar și suficient ca sistemul format din ecuațiile lor să fie compatibil, dublu nedeterminat, ceea ce înseamnă exact condiția (3.3.3).

Să presupunem acum, de exemplu, că primul plan este paralel cu planul  $xOy$ . Aceasta înseamnă, evident, că  $A_1 = B_1 = 0$ , iar raționamentul algebric de mai sus ne duce la aceeași concluzie ca pentru planele în poziție generală.

Dacă sistemul de ecuații (3.3.1)–(3.3.2) este incompatibil, atunci înseamnă că rangul sistemului trebuie să fie egal cu 1, în timp ce rangul matricei extinse trebuie să fie egal cu 2. Prin urmare, planele sunt paralele dacă și numai dacă

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}, \quad (3.3.4)$$

cu aceeași convenție ca mai sus asupra egalității cu zero a numitorilor.

Ultima situație posibilă este ca sistemul format din ecuațiile planelor să fie de rang maxim, ceea ce înseamnă că intersecția este o dreaptă. Aceasta înseamnă că primii trei coeficienți nu pot fi proporționali.

### 3.3.2 Pozițiile relative a trei plane

Considerăm trei plane, date prin ecuațiile lor generale:

$$\begin{cases} (P_1) A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ (P_2) A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \\ (P_3) A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0. \end{cases} \quad (3.3.5)$$

Pentru a stabili pozițiile relative ale celor trei plane, trebuie să studiem sistemul de ecuații (3.3.5). Fie  $\Delta$  determinantul sistemului:

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix},$$

$m$  – matricea sistemului,

$$m = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{pmatrix}$$

și  $M$  – matricea extinsă a sistemului,

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \end{pmatrix}.$$

Notăm, de asemenea, cu  $\mathbf{n}_1(A_1, B_1, C_1)$ ,  $\mathbf{n}_2(A_2, B_2, C_2)$ ,  $\mathbf{n}_3(A_3, B_3, C_3)$  vectorii normali la cele trei plane. Avem următoarele situații:

- (a) Dacă  $\Delta \neq 0$ , atunci sistemul (3.3.5) este compatibil determinat, prin urmare, are o singură soluție: *planele se intersectează într-un punct.*
- (b) Să presupunem acum că  $\Delta = 0$ ,  $\text{rg } m = 2$ ,  $\text{rg } M = 3$ , iar vectorii normali la cele trei plane sunt, doi câte doi, necoliniari. Deoarece rangul matricei sistemului este strict mai mic decât rangul matricei extinse, sistemul este incompatibil, prin urmare cele trei plane nu au nici un punct comun. Cum vectorii normali sunt, doi câte doi, necoliniari, rezultă că planele sunt, două câte două, neparalele. Ele se intersectează după câte o dreaptă, iar cele trei dreapta care se obțin sunt paralele.
- (c) De data aceasta avem, de asemenea,  $\text{rg } m = 2$ ,  $\text{rg } M = 3$ , dar acum doi dintre cei trei vectori normali la plane sunt coliniari<sup>1</sup>. Două dintre cele trei plane (cele cu vectorii normali coliniari) sunt paralele între ele, iar cel de-al treilea le intersectează pe ambele.
- (d) Să presupunem acum că  $\text{rg } m = 2$ ,  $\text{rg } M = 2$  (deci sistemul este compatibil), iar vectorii normali sunt doi câte doi necoliniari. În acest caz, planele sunt două câte două distincte și trec prin aceeași dreaptă.
- (e) Dacă  $\text{rg } m = 2$ ,  $\text{rg } M = 2$ , iar doi dintre cei trei vectori normali sunt coliniari, atunci, din nou, sistemul este compatibil, două dintre plane coincid (cele care au vectorii normali coliniari), iar cel de-al treilea le intersectează după o dreaptă.
- (f) Dacă  $\text{rg } m = 1$ ,  $\text{rg } M = 3$ , atunci sistemul este incompatibil, așadar planele nu se intersectează, dar ele sunt paralele între ele.
- (g) Dacă  $\text{rg } m = 1$ ,  $\text{rg } M = 2$ , atunci două dintre plane coincid, iar cel de-al treilea este paralel cu ele.
- (h) Dacă  $\text{rg } m = 1$ ,  $\text{rg } M = 1$ , atunci sistemul este compatibil dublu, toate cele trei plane coincid.

<sup>1</sup>Nu pot fi toți trei coliniari, deoarece  $\text{rg } m = 2$ !

### 3.3.3 Fascicole de plane. Snopuri de plane

**Definiția 3.3.** Se numește *fascicol de plane* mulțimea tuturor planelor care trec printr-o anumită dreaptă, care se numește *axa fascicolului*.

Să presupunem că sunt date două plane distincte concurente

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (3.3.6)$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (3.3.7)$$

**Teorema 3.4.** Dacă  $\alpha$  și  $\beta$  sunt două numere reale care nu se anulează simultan, atunci ecuația

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (3.3.8)$$

este ecuația unui plan ce aparține fascicolului de plane determinat de planele (3.3.6) și (3.3.7). Invers, orice plan al acestui fascicol se poate reprezenta cu ajutorul unei ecuații (3.3.8), pentru o anumită alegere a constantelor  $\alpha$  și  $\beta$ , care nu sunt ambele nule.

Demonstrația acestei teoreme este perfect analogă cu demonstrația teoremei similare pentru fascicole de drepte din plan, de aceea nu o vom mai reproduce aici.

Spre deosebire de cazul dreptelor din plan, unde am avut de considerat doar familiile de drepte care trec printr-un punct (adică fascicolele de drepte), în cazul planelor în spațiu, pe lângă fascicolele de plane (care trec printr-o dreaptă), putem considera alte familii remarcabile de plane, cele ce trec printr-un punct. Începem prin a da următoarea definiție:

**Definiția 3.4.** Se numește *snop de plane* mulțimea tuturor planelor care trec printr-un punct dat, numit *centrul snopului de plane*.

Să presupunem că centrul snopului de plane este dat prin intermediul coordonatelor sale,  $S(x_0, y_0, z_0)$ . Atunci, în mod evident, orice plan care trece prin centrul snopului (și, deci, aparține snopului), se poate scrie sub forma

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0, \quad (3.3.9)$$

unde constantele reale  $A, B, C$  nu sunt toate egale cu zero. Invers, pentru orice constante  $A, B, C$  care nu sunt toate egale cu zero, ecuația (3.3.9) este ecuația unui plan care trece prin centrul snopului.

Ca și în cazul fascicolelor, însă, de multe ori nu este dat în mod explicit centrul snopului de plane, ci acesta este descris cu ajutorul ecuațiilor unor plane care trec prin acest punct. Este util să avem o descriere a planelor snopului cu ajutorul unui număr redus de plane (mai precis, trei), care determină în mod unic centrul acestui snop. Avem următorul rezultat:

**Teorema 3.5.** Fie

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0 \end{cases} \quad (3.3.10)$$

ecuațiile a trei plane care trec prin punctul  $S(x_0, y_0, z_0)$  astfel încât să fie îndeplinită condiția

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0. \quad (3.3.11)$$

Atunci pentru orice numere reale  $\alpha, \beta, \gamma$  care nu se anulează simultan, ecuația

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) + \gamma(A_3x + B_3y + C_3z + D_3) = 0 \quad (3.3.12)$$

descrie un plan al snopului de plane cu centrul în punctul  $S$ . Invers, orice plan al acestui snop poate fi descris prin intermediul unei ecuații de acest tip, pentru o anumită alegere a constantelor  $\alpha, \beta, \gamma$ .

*Demonstrație* Rescriem, mai întâi, ecuația (3.3.12) sub forma

$$(A_1\alpha + A_2\beta + A_3\gamma)x + (B_1\alpha + B_2\beta + B_3\gamma)y + (C_1\alpha + C_2\beta + C_3\gamma)z + D_1\alpha + D_2\beta + D_3\gamma = 0. \quad (3.3.13)$$

Pentru ca această ecuație să reprezinte, într-adevăr, ecuația unui plan, coeficienții săi nu trebuie să se anuleze simultan.

Presupunem că coeficienții lui  $x, y, z$  din această ecuație sunt egali cu zero:

$$\begin{cases} A_1\alpha + A_2\beta + A_3\gamma = 0, \\ B_1\alpha + B_2\beta + B_3\gamma = 0, \\ C_1\alpha + C_2\beta + C_3\gamma = 0. \end{cases} \quad (3.3.14)$$

În virtutea ecuației (3.3.11) sistemul de ecuații (3.3.14) cu necunoscutele  $\alpha, \beta, \gamma$ , admite numai soluția trivială  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ , ceea ce contrazice alegerea parametrilor  $\alpha, \beta, \gamma$ . Prin urmare, ecuația (3.3.13) (deciși ecuația (3.3.12), care este echivalentă cu ea), este o ecuație liniară în raport cu  $x, y, z$ , așadar este ecuația unui plan. Cum punctul  $S$  aparține fiecăruia dintre planele (3.3.10), el verifică și ecuația (3.3.12), adică planul acesta aparține snopului.

Fie acum

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (3.3.15)$$

un plan oarecare al snopului.

Considerăm acum sistemul de ecuații

$$\begin{cases} A_1\alpha + A_2\beta + A_3\gamma = A, \\ B_1\alpha + B_2\beta + B_3\gamma = B, \\ C_1\alpha + C_2\beta + C_3\gamma = C, \end{cases} \quad (3.3.16)$$

în raport cu necunoscutele  $\alpha, \beta, \gamma$ . În virtutea relației (3.3.11), sistemul acesta admite o soluție unică. Cum fiecare dintre planele (3.3.10), ca și planul (3.3.15) trec prin punctul  $S(x_0, y_0, z_0)$ , rezultă că

$$\begin{cases} D_1 = -A_1x_0 - B_1y_0 - C_1z_0, \\ D_2 = -A_2x_0 - B_2y_0 - C_2z_0, \\ D_3 = -A_3x_0 - B_3y_0 - C_3z_0, \\ D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0. \end{cases}$$

De aici și din egalitățile (3.3.16) obținem

$$D_1\alpha + D_2\beta + D_3\gamma = D.$$

Astfel, pentru valorile alese ale lui  $\alpha, \beta, \gamma$  ecuațiile (3.3.12) și (3.3.15) coincid.  $\square$

### 3.3.4 Poziția relativă a unei drepte față de un plan

Considerăm un plan  $\Pi$ , dat prin ecuația generală

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (3.3.17)$$

și o dreaptă  $\Delta$ , dată prin ecuațiile sale parametrice

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases} \quad (3.3.18)$$

Trebuie să stabilim poziția dreptei  $\Delta$  relativ la planul  $\Pi$ .

Este clar, din motive geometrice, că sunt posibile următoarele situații:

- (i) dreapta intersectează planul într-un punct;
- (ii) dreapta este paralelă cu planul și nu este situată în el;

(iii) dreapta este inclusă în plan.

Vom stabili care trebuie să fie legătura dintre coeficienții planului și cei ai drepte pentru fiecare dintre cele trei situații.

Dacă înlocuim expresiile lui  $x, y, z$  din ecuațiile dreptei  $\Delta$  în ecuația planului  $\Pi$ , obținem:

$$(Al + Bm + Cn)t + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0. \quad (3.3.19)$$

Soluția acestei ecuații în  $t$  reprezintă valoarea parametrului de pe dreaptă care corespunde punctului (sau punctelor) de intersecție dintre dreaptă și plan. Este ușor de văzut că ecuația admite o soluție unică dacă și numai dacă coeficientul lui  $t$  este diferit de zero, adică

$$Al + Bm + Cn \neq 0.$$

Semnificația geometrică a acestei relații este clară: vectorul director al dreptei nu este perpendicular pe vectorul normal la plan, adică dreapta nu este paralelă cu planul. Prin urmare, condiția aceasta este condiția ca *dreapta și planul să se intersecteze într-un punct*.

Dacă este îndeplinită condiția

$$Al + Bm + Cn = 0, \quad Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0,$$

atunci dreapta este paralelă cu planul, dar nu se intersectează cu el. Într-adevăr, prima condiție arată că dreapta este paralelă cu planul, în timp ce a doua condiție indică faptul că ecuația nu are soluție.

În sfârșit, dacă este îndeplinită condiția

$$Al + Bm + Cn = 0, \quad Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0,$$

atunci dreapta este inclusă în plan, pentru că, în acest caz, ecuația de intersecție se transformă într-o identitate, care este verificată pentru orice  $t$  real.

### 3.3.5 Ecuația unui plan determinat de două drepte concurente

Considerăm dreptele

$$(D_1) : \frac{x - x_0}{l_1} = \frac{y - y_0}{m_1} = \frac{z - z_0}{n_1} \quad (3.3.20)$$

și

$$(D_2) : \frac{x - x_0}{l_2} = \frac{y - y_0}{m_2} = \frac{z - z_0}{n_2}, \quad (3.3.21)$$

care trec prin punctul  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

Atunci planul care trece prin cele două drepte este, în fapt, planul care trece prin punctul  $M_0$  și este paralel cu vectorii  $\mathbf{v}_1(l_1, m_1, n_1)$  și  $\mathbf{v}_2(l_2, m_2, n_2)$ , deci ecuația sa este

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.3.22)$$

### 3.3.6 Ecuația planului determinat de o dreaptă și un punct

Considerăm dreapta

$$(D) : \frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n} \quad (3.3.23)$$

și punctul  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , care nu aparține dreptei. Planul pe care îl căutăm este cel care trece prin punctul  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  și este paralel cu vectorii  $\mathbf{v}(l, m, n)$  și  $\overrightarrow{M_1M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ , deci ecuația lui va fi

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0. \quad (3.3.24)$$

### 3.3.7 Ecuația planului determinat de două drepte paralele

Considerăm dreptele paralele (și distincte!)

$$(D_1) : \frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n} \quad (3.3.25)$$

și

$$(D_2) : \frac{x - x_2}{l} = \frac{y - y_2}{m} = \frac{z - z_2}{n}, \quad (3.3.26)$$

care trec prin punctele  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  și  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ . Planul pe care îl căutăm este cel care trece prin punctul  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  și este paralel cu vectorii  $\mathbf{v}(l, m, n)$  și  $\overrightarrow{M_1M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ , deci ecuația lui va fi

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0. \quad (3.3.27)$$



### 3.3.8 Proiecția unei drepte pe un plan

Considerăm dreapta

$$(D) : \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (3.3.28)$$

și planul

$$(P) : Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3.3.29)$$

Este ușor de constatat că dacă proiectăm ortogonal toate punctele dreptei (D) pe planul (P) obținem o dreaptă situată în plan, pe care o vom numi *proiecția dreptei (D) pe planul (P)*. Dacă dreapta este *perpendiculară* pe plan, atunci dreapta aceasta, de fapt, se reduce la un singur punct, cel în care dreapta întâlnește planul. De aceea, în cele ce urmează, vom admite că dreapta *nu* este perpendiculară pe plan.

Dreapta pe care o căutăm o vom scrie ca intersecție a două plane: planul (P) și planul (P'), care trece prin dreapta (D) și este perpendicular pe planul (P). În practică, acest plan este planul care trece prin punctul  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  de pe dreaptă și este paralel cu vectorul director al dreptei,  $\mathbf{v}(l, m, n)$  și vectorul normal la planul (P),  $\mathbf{n}(A, B, C)$ . Datorită ipotezei pe care am făcut-o mai sus, cei doi vectori sunt necoliniari, deci punctul și cei doi vectori determină, în mod unic, planul (P').

După cum am văzut, ecuația planului (P') este

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l & m & n \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0. \quad (3.3.30)$$

Așadar, ecuațiile proiecției drepte pe plan sunt

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l & m & n \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0, \\ Ax + By + Cz + D = 0. \end{cases} \quad (3.3.31)$$

### 3.3.9 Poziția relativă a două drepte în spațiu

Presupunem că se dau două drepte în spațiu, prin intermediul ecuațiilor lor parametrice

$$x = x_1 + l_1 t, \quad y = y_1 + m_1 t, \quad z = z_1 + n_1 t, \quad (3.3.32)$$

$$x = x_2 + l_2 s, \quad y = y_2 + m_2 s, \quad z = z_2 + n_2 s, \quad (3.3.33)$$

și vrem să stabilim poziția lor relativă.

Din considerente geometrice, este clar că putem avea următoarele situații:

- (a) dreptele sunt concurente;
- (b) dreptele coincid;
- (c) dreptele sunt paralele, dar nu coincid;
- (d) dreptele sunt necoplanare (strâmbe).

Vom stabili acum legăturile dintre coeficienții celor două drepte pentru fiecare situație. Considerăm vectorii directori ai celor două drepte:

$$\mathbf{a}_1(l_1, m_1, n_1), \mathbf{a}_2(l_2, m_2, n_2).$$

Presupunem că acești vectori sunt coliniari, adică

$$l_1 = \lambda l_2, m_1 = \lambda m_2, n_1 = \lambda n_2. \quad (3.3.34)$$

Atunci dreptele sunt paralele, adică fie coincid, fie sunt paralele și nu au nici un punct comun. Dreptele coincid dacă și numai dacă vectorul  $\overrightarrow{M_1M_2}$ , unde  $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ,  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , este paralel cu vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$ , adică:

$$x_2 - x_1 = \mu l_1, y_2 - y_1 = \mu m_1, z_2 - z_1 = \mu n_1. \quad (3.3.35)$$

Astfel, egalitățile (3.3.34) și (3.3.35) reprezintă condițiile necesare și suficiente pentru ca dreptele (3.3.32) și (3.3.33) să coincidă. Pentru ca aceste drepte să fie paralele, fără să coincidă, este necesar și suficient ca condiția (3.3.34) să fie verificată, iar condiția (3.3.35) – nu.

Să presupunem acum că vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  sunt necoliniari, adică nu este verificată condiția (3.3.34). Atunci dreptele (3.3.32) și (3.3.33) se intersectează într-un punct sau sunt necoplanare. Dacă se intersectează și, prin urmare, se află într-un același plan  $\Pi$ , atunci vectorii  $\mathbf{a}_1$ ,  $\mathbf{a}_2$  și  $\overrightarrow{M_1M_2}$  sunt coplanari. De aceea:

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.3.36)$$

Invers, să presupunem că vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  sunt necoliniari și este verificată condiția (3.3.36). Alegem punctele  $A_1$  și  $A_2$  astfel încât să avem  $\overrightarrow{M_1A_1} = \mathbf{a}_1$  și  $\overrightarrow{M_2A_2} = \mathbf{a}_2$ . Atunci segmentele  $M_1M_2$ ,  $M_1A_1$  și  $M_2A_2$  determină un plan, în care sunt situate dreptele (3.3.32) și (3.3.33). Cum vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  sunt necoliniari, dreptele sunt concurente. Astfel, dreptele (3.3.32) și (3.3.33) sunt concurente dacă și numai dacă vectorii lor directori sunt

necoliniari și este verificată egalitatea (3.3.36). Remarcăm că această egalitate are loc și dacă dreptele sunt paralele, pentru că în acest caz a doua și a treia linie a determinantului sunt proporționale. Prin urmare, condiția necesară pentru ca dreptele noastre să fie *necoplanare* este

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

În restul acestui capitol vom presupune că reperul cu care lucrăm este ortonormat.

### 3.3.10 Distanța de la un punct la o dreaptă în spațiu

Vom stabili, în cele ce urmează, o formulă care ne dă distanța  $d$  de la un punct  $M_1$ , de vector de poziție  $\mathbf{r}_1$ , în spațiu, la o dreaptă  $\Delta$ , de ecuație vectorială  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}$ . Alegem, mai întâi, un punct  $M_2$  pe dreapta  $\Delta$  astfel încât să avem  $\overrightarrow{M_0M_2} = \mathbf{a}$ .

Construim un paralelogram pe vectorii  $\overrightarrow{M_0M_1}$  și  $\overrightarrow{M_0M_2}$ . Atunci distanța  $d$  căutată este egală cu lungimea perpendicularei  $M_1N$ , coborâte din vârful  $M_1$  pe latura opusă a paralelogramului. Cum aria paralelogramului este egală cu

$$\|(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \times \mathbf{a}\| = \|\mathbf{a}\|d,$$

formula

$$d = \frac{\|(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{a}\|}$$

ne dă distanța de la punctul  $M_1$ , de vector de poziție  $\mathbf{r}_1$  la dreapta  $\Delta$ .

### 3.3.11 Perpendiculara comună a două drepte strâmbе

Considerăm două drepte în spațiu,

$$(\Delta_1) : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1} \quad (3.3.37)$$

și

$$(\Delta_2) : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}, \quad (3.3.38)$$

astfel încât cele două drepte să fie *necoplanare*, adică

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

După cum se știe din geometria elementară, există o singură dreaptă care intersectează ambele drepte date și este perpendiculară pe fiecare dintre ele. De aceea, ea se și numește *perpendiculara comună* a celor două drepte.

Metoda de construire a perpendiculararei comune este cât se poate de simplă. Mai întâi determinăm vectorul director al acestei perpendicularare. Fie  $\mathbf{a}_1(l_1, m_1, n_1)$ , respectiv  $\mathbf{a}_2(l_2, m_2, n_2)$  vectorii directori ai dreptelor  $\Delta_1$  și  $\Delta_2$ . Atunci vectorul  $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2$  este, conform definiției, un vector care este perpendicular atât pe vectorul  $\mathbf{a}_1$ , cât și pe vectorul  $\mathbf{a}_2$ , prin urmare el este, în mod evident, un vector director al perpendiculararei comune. Cum

$$\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix},$$

componentele acestui vector sunt

$$\beta_1 \equiv \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}, \quad \beta_2 \equiv \begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix}, \quad \beta_3 \equiv \begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix}. \quad (3.3.39)$$

Acum scriem ecuațiile perpendiculararei comune ca intersecție de două plane: unul care trece prin prima dreaptă și este perpendicular pe cea de-a doua și unul care trece prin a doua dreaptă și este perpendicular pe prima dreaptă.

Primul plan se va putea scrie, prin urmare:

$$\pi_1 : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Într-adevăr, acest plan trece prin dreapta  $\Delta_1$  și este paralel cu perpendiculara comună, deci, în particular, este perpendicular pe dreapta  $\Delta_2$ . În același mod, cel de-al doilea plan se va scrie:

$$\pi_2 : \begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = 0,$$

prin urmare ecuațiile perpendiculararei comune vor fi:

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = 0, \\ \begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = 0. \end{cases}$$

### 3.3.12 Lungimea perpendicularei comune a două drepte necoplanare

Considerăm, din nou, dreptele necoplanare (3.3.37) și (3.3.38). Consideră, de asemenea, planul  $\pi$  care trece prin prima dreaptă și este paralel cu cea de-a doua, adică planul de ecuație

$$\pi : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Vectorul normal la acest plan este, în mod evident,  $\mathbf{n}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ , unde  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  sunt date de (3.3.39).

Atunci lungimea perpendicularei comune (adică distanța dintre dreptele necoplanare date), va fi egală cu distanța de la un punct oarecare al dreptei  $\Delta_2$  (de exemplu punctul  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ) până la planul  $\pi$ . Conform formulei pentru distanța de la un punct la un plan, obținem:

$$d(\Delta_1, \Delta_2) = d(M_2, \pi) = \frac{\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix}}{\sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2}}.$$

### 3.3.13 Unghiul dintre o dreaptă și un plan

Presupunem că se dă dreapta

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt \quad (3.3.40)$$

și planul

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3.3.41)$$

Vom nota cu  $\varphi$  unghiul dintre dreaptă și plan (mai precis, unghiul dintre dreaptă și proiecția sa pe plan). Dacă dreapta este perpendiculară pe plan vom pune  $\varphi = \pi/2$ . Vom considera că  $0 \leq \varphi \leq \pi/2$ . Cum vectorul  $\mathbf{n}(A, B, C)$  este perpendicular pe planul (3.3.41), unghiul format de vectorul director  $\mathbf{a}(l, m, n)$  al dreptei (3.3.40) cu vectorul  $\mathbf{n}$  este fie  $\psi = \pi/2 - \varphi$ , fie  $\psi = \pi/2 + \varphi$ . Prin urmare,

$$\sin \varphi = |\cos \psi| = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

Condiția ca dreapta să fie paralelă cu planul este ca vectorul normal la plan să fie perpendicular pe vectorul director al dreptei, adică

$$Al + Bm + Cn = 0,$$

în timp ce condiția ca dreapta să fie perpendiculară pe plan este ca vectorul normal la plan să fie paralel cu vectorul director al dreptei, adică

$$\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}.$$

### 3.4 Probleme

**Problem 3.1.** Stabiliți ecuația unui plan care trece prin  $A(1, 3, 0)$  și este paralel cu dreptele

$$\begin{cases} x + y - z + 3 = 0 \\ 2x - y + 5z + 1 = 0 \end{cases}$$

și

$$\begin{cases} -x + y = 1 \\ 5x + y - z + 2 = 0 \end{cases}.$$

**Problem 3.2.** Stabiliți ecuația unui plan care trece prin dreapta

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{2}$$

și este paralel cu dreapta

$$\frac{x}{5} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{3}.$$

**Problem 3.3.** Stabiliți ecuația unui plan care trece prin dreapta

$$\begin{cases} x = 3 + t, \\ y = 2 + 5t, \\ z = -1 + 3t, \end{cases}$$

și este paralel cu dreapta

$$\begin{cases} x = 4 - 2t, \\ y = -8 + t, \\ z = 5 + 2t. \end{cases}$$

**Problem 3.4.** Determinați ecuația unui plan care trece prin punctul  $A(-1, 1, 2)$  și prin dreapta de ecuații

$$\begin{cases} x = 1 + 5t, \\ y = -1 + t, \\ z = 2t. \end{cases}$$

**Problem 3.5.** Determinați ecuația unui plan care trece prin punctul  $A(-1, 1, 2)$  și prin dreapta de ecuații

$$\begin{cases} x + 5y - 7z + 1 = 0, \\ 3x - y + 2z + 3 = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.6.** Stabiliți ecuația planului care trece prin dreptele paralele

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1} \quad \text{și} \quad \frac{x-2}{5} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{1}.$$

**Problem 3.7.** Demonstrați că următoarele două drepte sunt concurente și stabiliți ecuația planului determinat de ele:

$$\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4} \quad \text{și} \quad \frac{x+5}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{-1}.$$

**Problem 3.8.** Demonstrați că următoarele două drepte sunt concurente și stabiliți ecuația planului determinat de ele:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t, \\ y = -1 + 4t, \\ z = 2 + 5t \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} x = 1 - t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = 2 + 4t. \end{cases}$$

**Problem 3.9.** O dreaptă se proiectează pe planul  $yOz$ , paralel cu axa  $Ox$ . Stabiliți ecuația proiecției dacă dreapta este dată de ecuațiile:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 3t, \\ z = 1 - t. \end{cases}$$

**Problem 3.10.** Stabiliți ecuațiile unei drepte care trece prin  $O(0, 0, 0)$  și intersectează dreptele

$$\begin{cases} x - y + z + 2 = 0, \\ x - 2y + 3z - 8 = 0 \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} y - z + 1 = 0, \\ x + y - 2z + 4 = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.11.** Stabiliți ecuațiile unei drepte care trece prin  $O(0, 0, 0)$  și intersectează dreptele

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 2 + 3t, \\ z = -t \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} x = 4t, \\ y = 5 - 5t, \\ z = 3 + 2t. \end{cases}$$

**Problem 3.12.** Stabiliți ecuațiile unei drepte care trece prin  $A(-1, 1, -1)$  și intersectează dreptele

$$\begin{cases} x - y + z + 2 = 0, \\ x - 2y + 3z - 8 = 0 \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} y - z = 0, \\ x + y - 2z + 4 = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.13.** În fascicolul de plane determinat de planele  $x + 2y - 3z + 5 = 0$  și  $4x - y + 3z + 5 = 0$  să se determine două plane perpendiculare, dintre care unul dintre care să treacă prin punctul  $M(1, 3, 1)$ .

**Problem 3.14.** Să se determine coordonatele unui punct  $A$  situat pe dreapta

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z - 1}{-1}$$

și este egal de părtat de punctele  $B(3, 0, -2)$  și  $C(-1, 1, 5)$ .

**Problem 3.15.** Determinați coordonatele unui punct  $A$ , situat pe dreapta

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z + 1}{1},$$

aflat la distanța  $\sqrt{3}$  față de planul  $x + y + z + 3 = 0$ .

**Problem 3.16.** Determinați coordonatele unui punct  $A$ , situat pe dreapta

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 3}{3} = \frac{z + 4}{-5},$$

egalo depărtat de punctul  $B(0, 1, 1)$  și de planul  $2x - y + 2z + 1 = 0$ .

**Problem 3.17.** Punctele  $A(1, -1, 2)$  și  $B(3, 0, 4)$  sunt vârfuri ale cubului  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ . Vectorul  $\overrightarrow{AD}$  este perpendicular pe dreapta

$$\begin{cases} x = 0, \\ y - z = 0, \end{cases}$$

iar orientarea bazei  $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$  este directă, în timp ce suma coordonatelor vectorului  $\overrightarrow{AA_1}$  este negativă. Stabiliți ecuațiile fețelor cubului.



**Problem 3.18.** Stabiliți ecuațiile simetrice dreptei

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{4}$$

față de planul  $5x - y + z - 4 = 0$ .

**Problem 3.19.** Stabiliți ecuațiile proiecției ortogonale pe planul  $x + 5y - z - 25 = 0$  ale dreptei

$$\begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ 3x - y + 2z = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.20.** Stabiliți ecuațiile proiecției ortogonale pe planul  $x + 5y - z - 25 = 0$  ale dreptei

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}.$$

**Problem 3.21.** Determinați unghiul dintre planul  $4x + 4y - 7z + 1 = 0$  și dreapta

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0, \\ 2x + y + 3z + 2 = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.22.** Stabiliți ecuațiile dreptei care trece prin  $A(1, 3, 2)$ , este paralelă cu planul  $xOy$  și formează un unghi de  $45^\circ$  cu dreapta

$$\begin{cases} x = z, \\ z = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.23.** Stabiliți ecuațiile dreptei care trece prin  $A(1, 3, 2)$ , este paralelă cu planul  $xOy$  și formează un unghi de  $\arcsin(1\sqrt{10})$  cu planul  $x - y = 1$ .

**Problem 3.24.** Stabiliți ecuația planului care trece prin  $A(-1, 2, 1)$ , este paralel cu dreapta

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{-1}$$

și formează un unghi de  $60^\circ$  cu dreapta

$$\begin{cases} x = z, \\ z = 0. \end{cases}$$

**Problem 3.25.** Laturile egale ale unui triunghi isoscel se intersectează în vârful  $A(3, 4, 5)$ . Celelalte două vârfuri sunt situate pe axele  $Ox$  și  $Oy$ , iar planul triunghiului este paralel cu axa  $Oz$ . Determinați unghiurile triunghiului și scrieți ecuația planului său.

**Problem 3.26.** Determinați coordonatele unui punct  $A$  de pe dreapta

$$\begin{cases} x - y - 3 = 0, \\ 2y + z = 0, \end{cases}$$

situat la distanța  $\sqrt{6}$  față de dreapta  $x = y = z$ .

**Problem 3.27.** Determinați distanța dintre dreptele

$$\frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{6} = \frac{z-1}{-2} \quad \text{și} \quad \frac{x-5}{-6} = \frac{y}{-12} = \frac{z}{4}.$$

**Problem 3.28.** Punctele  $A(-1, -3, 1)$ ,  $B(5, 3, 8)$ ,  $C(-1, -3, 5)$  și  $D(2, 1, -4)$  sunt vârfurile unui tetraedru. Determinați înălțimea tetraedrului coborâtă din vârful  $D$  pe fața  $ABC$ .

**Problem 3.29.** Punctele  $A(-1, -3, 1)$ ,  $B(5, 3, 8)$ ,  $C(-1, -3, 5)$  și  $D(2, 1, -4)$  sunt vârfurile unui tetraedru. Determinați înălțimea feței  $ABC$ , coborâte din  $C$  pe latura  $AB$ .

**Problem 3.30.** Punctele  $A(-1, -3, 1)$ ,  $B(5, 3, 8)$ ,  $C(-1, -3, 5)$  și  $D(2, 1, -4)$  sunt vârfurile unui tetraedru. Determinați distanța dintre muchiile (strâmbe)  $AD$  și  $BC$ .

**Problem 3.31.** Lungimea muchiei cubului  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  este egală cu 1. Determinați distanța dintre vârful  $A$  și planul  $B_1 C D_1$ .

**Problem 3.32.** Fețele  $ABCD$ ,  $ABB_1 A_1$  și  $ADD_1 A_1$  ale paralelipipedului  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  sunt situate în planele  $2x + 3y + 4z + 8 = 0$ ,  $x + 3y - 6 = 0$ , respectiv  $z + 5 = 0$ . Vârful  $C_1$  are coordonatele  $(6, -5, 1)$ . Determinați distanța de la vârful  $A_1$  la planul  $B_1 B D$ .

**Problem 3.33.** Fețele  $ABCD$ ,  $ABB_1 A_1$  și  $ADD_1 A_1$  ale paralelipipedului  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  sunt situate în planele  $2x + 3y + 4z + 8 = 0$ ,  $x + 3y - 6 = 0$ , respectiv  $z + 5 = 0$ . Vârful  $C_1$  are coordonatele  $(6, -5, 1)$ . Determinați distanța de la vârful  $D$  la dreapta  $AB$ .

**Problem 3.34.** Fețele  $ABCD$ ,  $ABB_1 A_1$  și  $ADD_1 A_1$  ale paralelipipedului  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  sunt situate în planele  $2x + 3y + 4z + 8 = 0$ ,  $x + 3y - 6 = 0$ , respectiv  $z + 5 = 0$ . Vârful  $C_1$  are coordonatele  $(6, -5, 1)$ . Determinați distanța dintre dreptele  $AC$  și  $A_1 C_1$ .

# CAPITOLUL 4

---

## Conice

---

### Cuprins

---

<b>4.1</b>	<b>Elipsa . . . . .</b>	<b>109</b>
<b>4.2</b>	<b>Hiperbola . . . . .</b>	<b>119</b>
<b>4.3</b>	<b>Parabola . . . . .</b>	<b>128</b>
<b>4.4</b>	<b>Cercul . . . . .</b>	<b>136</b>
4.4.1	Definiția și ecuația canonică . . . . .	136
4.4.2	Ecuația generală a cercului . . . . .	137
4.4.3	Ecuația cercului care trece prin trei puncte . . . . .	138
4.4.4	Intersecția dintre o dreaptă și un cerc. Tangenta la cerc într-un punct al său . . . . .	139
<b>4.5</b>	<b>Probleme . . . . .</b>	<b>143</b>

---

## 4.1 Elipsa

### Definiție și ecuație canonică

**Definiția 4.1.** Se numește *elipsă* locul geometric al punctelor din plan pentru care suma distanțelor de la ele până la două puncte fixe  $F_1$  și  $F_2$ , numite *focare* este constantă, egală cu  $2a$ , presupunându-se că distanța dintre cele două focare este  $2c$ , unde  $c$  este un număr real pozitiv sau nul, verificând inegalitatea  $c < a$ .

Desigur, dacă focarele sunt confundate, elipsa este un cerc.

Pentru a deduce ecuația elipsei, construim un sistem de coordonate ortonormat în plan în modul următor. Alegem ca origine mijlocul segmentului  $F_1F_2$  și alegem ca axă  $Ox$  dreapta  $F_1F_2$  orientată astfel încât  $F_2$  să aibă abscisă pozitivă. Prin urmare, focarele vor avea coordonatele  $F_1(-c, 0)$  și  $F_2(c, 0)$ . Axa  $Oy$  se alege astfel încât să se completeze un sistem ortonormat drept (deci, în particular, ca dreaptă, această axă nu este altceva decât mediatoarea segmentului  $F_1F_2$ ). Dacă cumva elipsa este un cerc (adică  $c = 0$ ), atunci orice sistem de coordonate drept ortonormat, cu originea în centrul cercului, va satisface necesitățile noastre.

Fie  $M(x, y)$  un punct oarecare al elipsei. Atunci avem, pe de-o parte,

$$F_1M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad F_2M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}. \quad (4.1.1)$$

Pe de altă parte, din definiția elipsei, trebuie să avem

$$F_1M + F_2M = 2a. \quad (4.1.2)$$

Combinând aceste două ecuații, obținem:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a. \quad (4.1.3)$$

Aceasta este, de fapt, ecuația elipsei, întrucât punctele elipsei, și numai ele, verifică această ecuație.

Vom stabili acum o altă formă, mai atractivă, pentru ecuația (4.1.3) a elipsei. Trecem ultimul termen din ecuație în membrul drept și ridicăm la pătrat. După reducerea termenilor asemenea, obținem:

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx.$$

Ridicând din nou la pătrat și regrupând termenii, obținem:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

sau, încă,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1. \quad (4.1.4)$$

Introducem acum o nouă cantitate,

$$b = \sqrt{a^2 - c^2};$$

conform ipotezelor noastre, această cantitate este reală. Avem, prin urmare,

$$b^2 = a^2 - c^2, \quad (4.1.5)$$

prin urmare ecuația (4.1.4) devine

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (4.1.6)$$

Am demonstrat până acum că fiecare punct al elipsei verifică ecuația (4.1.6). Vom arăta acum că și afirmația inversă este adevărată, în sensul că orice punct  $M(x, y)$  ale cărui coordonate verifică ecuația (4.1.6), este un punct al elipsei, adică verifică ecuația (4.1.2). Din ecuația (4.1.6), obținem

$$y^2 = b^2 \left( 1 - \frac{x^2}{a^2} \right).$$

Utilizând această relație și egalitatea (4.1.5), obținem

$$\begin{aligned} F_1 M &= \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2} = \\ &= \sqrt{\frac{c^2}{a^2}x^2 + 2cx + a^2} + \sqrt{\left(\frac{c}{a} + a\right)^2} = \left| a + \frac{c}{a}x \right|. \end{aligned}$$

Cum, în virtutea relației (4.1.6),  $|x| \leq a$  și, în plus,  $c < a$ , avem

$$F_1 M = a + \frac{c}{a}x. \quad (4.1.7)$$

Exact la fel se obține

$$F_1 M = a - \frac{c}{a}x. \quad (4.1.8)$$

Însumând ultimele două egalități, obținem egalitatea (4.1.2). Astfel, relația (4.1.6) este ecuația elipsei. Ea se numește *ecuația canonică a elipsei*.

**Studiul formei.** Plecând de la ecuația (4.1.6), vom studia forma elipsei. Coordonatele punctelor de pe elipsă sunt supuse restricțiilor  $|x| \leq a$  și  $|y| \leq b$ . Prin urmare, elipsa este mărginită de un dreptunghi de laturi  $2a$  și  $2b$ , cu laturile paralele cu axele și cu centrul în origine. Mai departe, remarcăm că în ecuația (4.1.6) a elipsei apar numai puteri pare ale coordonatelor, de aceea elipsa este simetrică față de axe și, deci, și față de origine. Aceasta înseamnă că dacă punctul  $M(x, y)$  aparține elipsei, atunci același lucru este valabil pentru punctele  $M(-x, y)$ ,  $M(x, -y)$  și  $M(-x, -y)$ . Prin urmare, pentru a determina forma elipsei, este suficient să considerăm porțiunea ei cuprinsă în primul cadran al axelor de coordonate, iar în celelalte cadrane construcția ei se poate face prin simetrie. Pentru primul cadran, din ecuația (4.1.6) se obține:

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}. \quad (4.1.9)$$




Figura 4.1 – Elipsa




Figura 4.2 – Porțiunea din elipsă cuprinsă în cadranul I

Prin urmare, avem de studiat graficul funcției

$$f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Este cât se poate de clar că nu avem de studiat limite la  $\pm\infty$  sau asimptote, deci începem prin a calcula derivatele. Avem:

$$f'(x) = \frac{-bx}{a\sqrt{a^2 - x^2}}$$

În ceea ce privește derivata a doua, se obține:

$$f''(x) = \frac{ab}{(x-a)(x+a)\sqrt{a^2 - x^2}}$$

Se observă imediat că ambele derivate sunt negative, deci funcția este strict descrescătoare și concavă pe întreg domeniul de definiție, ceea ce înseamnă că graficul său este cel din figura 4.2.

Axele de simetrie ale elipsei (axele  $Ox$  și  $Oy$ ), se numesc, pur și simplu, *axe*, iar centrul de simetrie (originea coordonatelor), se numește *centrul elipsei*. Punctele  $A_1, A_2, B_1$  și  $B_2$ , în care axele se intersectează cu elipsa, se numesc *vârfuri* ale elipsei. Termenul de *semiaxe* se folosește atât pentru segmentele  $OA_1, OA_2, OB_1$  și  $OB_2$ , cât și pentru lungimile lor,  $a$  și  $b$ . În ipotezele noastre, când focarele elipsei sunt pe axa  $Ox$ , din relația (4.1.5) rezultă că  $a > b$ . În acest caz,  $a$  se numește *semiaxă mare*, iar  $b$  – *semiaxă mică*. Totuși, ecuația (4.1.6) are sens și în cazul în care  $a < b$ ; aceasta va fi, însă, ecuația unei elipse care are focarele pe axa  $Oy$ , în loc de  $Ox$ , iar semiaxa mare va fi egală cu  $b$ .

Un al treilea caz posibil este cel în care  $a = b$ . În acest caz, ecuația (4.1.6) se transformă în

$$x^2 + y^2 = a^2. \quad (4.1.10)$$

În cele ce urmează vom privi cercul ca un caz particular de elipsă, în care cele două semiaxe sunt egale, iar focarele coincid cu centrul cercului.

**Excentricitatea.** Se numește *excentricitate* a elipsei numărul real

$$\varepsilon = c/a. \quad (4.1.11)$$

Întrucât, din ipoteza făcută inițial,  $c < a$ , rezultă că  $\varepsilon < 1$ . În cazul cercului, focarele coincid, de aceea  $c = 0$ , iar excentricitatea este  $\varepsilon = 0$ .

Rescriem egalitatea (4.1.11) sub forma

$$\varepsilon = \sqrt{1 - (b/a)^2}.$$

De aici se observă că excentricitatea determină forma elipsei: cu cât  $\varepsilon$  este mai aproape de zero, cu atât elipsa este mai apropiată de un cerc; dacă excentricitatea elipsei crește, elipsa devine tot mai turtită.

**Razele focale.** Se numesc *raze focale* ale unui punct  $M$  al elipsei segmentele de dreaptă care unesc acest punct cu focarele  $F_1$  și  $F_2$  ale elipsei. Lungimile lor,  $r_1$  și  $r_2$  sunt date de formulele (4.1.7), respectiv (4.1.8), pe care le putem rescrie sub forma

$$\begin{aligned} r_1 &= a + \varepsilon x, \\ r_2 &= a - \varepsilon x. \end{aligned}$$

**Intersecția cu o dreaptă. Tangenta la o elipsă.** Vom studia numărul de puncte de intersecție pe care îl poate avea o dreaptă cu o elipsă. Vom presupune, mai întâi, că dreapta nu este paralelă cu axa  $Oy$ . Atunci ecuația sa se poate scrie cu ajutorul pantei:

$$y = kx + m. \quad (4.1.12)$$

Pentru a determina punctele de intersecție ale acestei drepte cu elipsa (4.1.6), înlocuim expresia lui  $y$  din formula (4.1.12) în ecuația (4.1.6). Obținem:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(kx + m)^2}{b^2} = 1$$

sau

$$(\alpha^2 k^2 + b^2)x^2 + 2\alpha^2 kmx + \alpha^2(m^2 - b^2) = 0.$$

Această ecuație ne dă abscisele punctelor de intersecție. Întrucât este o ecuație de gradul doi, vor fi întotdeauna două puncte de intersecție (distincte, confundate sau imaginare). Discriminantul ecuației este:

$$\begin{aligned} \Delta &= 4\alpha^4 k^2 m^2 - 4\alpha^2(m^2 - b^2)(\alpha^2 k^2 + b^2) = 4\alpha^4 k^2 m^2 - 4\alpha^4 k^2 m^2 - \\ &- 4\alpha^2 m^2 b^2 + 4\alpha^2 b^2 k^2 + 4\alpha^2 b^4 = 4\alpha^2 b^2(\alpha^2 k^2 + b^2 - m^2). \end{aligned}$$

Semnul discriminantului este dat de factorul  $s = \alpha^2 k^2 + b^2 - m^2$ . Putem avea, deci, următoarele situații:

1. dacă  $-\sqrt{\alpha^2 k^2 + b^2} < m < \sqrt{\alpha^2 k^2 + b^2}$ , atunci  $\Delta > 0$ , iar dreapta și elipsa au două puncte comune;
2. dacă  $m = \pm\sqrt{\alpha^2 k^2 + b^2}$ , atunci  $\Delta = 0$ , adică dreapta are un singur punct comun cu elipsa (dreapta este tangentă elipsei);
3. dacă  $m \in (-\infty, -\sqrt{\alpha^2 k^2 + b^2}) \cup (\sqrt{\alpha^2 k^2 + b^2}, \infty)$ , atunci  $\Delta < 0$ , iar dreapta și elipsa nu au puncte comune.

Prin urmare, pentru orice pantă  $k$  există două tangente la elipsă, având această pantă, anume

$$y = kx \pm \sqrt{\alpha^2 k^2 + b^2}. \quad (4.1.13)$$

Dacă dreapta este paralelă cu axa  $Oy$ , atunci ecuația sa este de forma  $x = h$ . Dacă înlocuim în ecuația elipsei, obținem

$$\frac{h^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$






Figura 4.3 – Tangentele la o elipsă paralele cu o dreaptă dată

de unde

$$y^2 = b^2 \left( 1 - \frac{h^2}{a^2} \right).$$

De aici se observă imediat că dreapta  $x = h$  intersectează elipsa în două puncte distincte dacă  $h \in (-a, a)$ , este tangentă elipsei dacă  $h = \pm a$  și nu intersectează elipsa dacă  $h \in (-\infty, -a) \cup (a, \infty)$ .

Problema tangentei la o elipsă se poate aborda și într-un alt mod. Anume, presupunem că vrem să determinăm ecuația tangentei într-un punct dat  $(x_0, y_0)$  al elipsei. Pentru a fixa ideile, presupunem că  $x_0$  și  $y_0$  sunt ambele pozitive. Atunci ele se află pe o ramură a elipsei care poate fi descrisă prin ecuația

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}.$$

Pentru a scrie ecuația tangentei, avem nevoie, mai întâi, de derivata lui  $y$  în  $x_0$ :

$$y'(x_0) = b \frac{-\frac{x_0}{a^2}}{\sqrt{1 - \frac{x_0^2}{a^2}}} = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x_0}{y_0},$$

unde am ținut cont de faptul că punctul  $(x_0, y_0)$  verifică ecuația elipsei. Prin urmare, după cum se știe din analiză, ecuația tangentei este

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0) = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x_0}{y_0} x + \frac{b^2}{y_0} \frac{x_0^2}{a^2}.$$

Dacă înmulțim această ecuație cu  $\frac{y_0}{b^2}$  obținem

$$\frac{yy_0}{b^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = -\frac{xx_0}{a^2} + \frac{x_0^2}{a^2}$$

sau, folosind din nou ecuația elipsei (pentru  $(x_0, y_0)$ ),

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1,$$

adică ecuația tangentei într-un punct al unei elipse se poate scrie prin dedublare. Același rezultat se obține, fără dificultate, și dacă punctul de pe elipsă se află pe una dintre celelalte ramuri.

Vom descrie, în cele ce urmează, o altă metodă de a obține ecuația tangentei într-un punct al unei elipse. Fie, prin urmare,  $M_0(x_0, y_0)$  un punct al elipsei

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ecuatiile parametrice ale unei drepte care trece prin  $M_0$  vor fi:

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt. \end{cases}$$

Dacă înlocuim în ecuația elipsei, obținem:

$$b^2(x_0^2 + 2tlx_0 + l^2t^2) + a^2(y_0^2 + 2tmy_0 + m^2t^2) - a^2b^2 = 0$$

sau, grupând după puterile lui  $t$ ,

$$t^2 (b^2l^2 + a^2m^2) + 2t(a^2lx_0 + b^2my_0) + b^2x_0^2 + a^2y_0^2 - a^2b^2 = 0.$$

Cum punctul  $M_0$  este pe elipsă, termenul liber al ecuației trebuie să fie egal cu zero, deci ecuația se reduce la

$$t^2 (b^2l^2 + a^2m^2) + 2t(b^2lx_0 + a^2my_0) = 0.$$

Pentru ca dreapta să fie tangentă elipsei, este necesar ca ecuația de mai sus să aibă rădăcină dublă. Aceasta se poate întâmpla dacă și numai dacă termenul de gradul întâi dispare, adică dacă avem

$$b^2lx_0 + a^2my_0 = 0.$$

Dacă vectorul director al dreptei este  $\mathbf{v}(l, m)$ , ecuația de mai sus înseamnă că vectorul  $\mathbf{n}(b^2x_0, a^2y_0)$  este perpendicular pe dreaptă, adică acest vector este vectorul perpendicular pe tangentă. De aici rezultă că ecuația tangentei se poate scrie sub forma

$$b^2x_0(x - x_0) + a^2y_0(y - y_0) = 0$$

sau

$$b^2x_0x + a^2y_0y - b^2x_0^2 - a^2y_0^2 = 0.$$

Cum, din nou, punctul  $M_0$  este pe elipsă, termenul liber este  $-a^2b^2$ , deci ecuația tangentei se scrie

$$b^2x_0x + a^2y_0y - a^2b^2 = 0$$

sau

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (4.1.14)$$

În fine, vom discuta cazul în care ni se cere să determinăm tangentele duse dintr-un punct la o elipsă. Plecăm, din nou, de la ecuația canonică a elipsei,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

După cum am văzut mai sus, ecuația unei tangente neverticale la această elipsă se poate scrie sub forma

$$y = kx + \sqrt{a^2k^2 + b^2}.$$

Cerem ca această tangentă să treacă printr-un punct  $M(x_1, y_1)$ . Asta înseamnă că

$$y_1 = kx_1 + \sqrt{a^2k^2 + b^2}$$

sau

$$(y_1 - kx_1)^2 - a^2k^2 - b^2 = 0$$

sau, încă,

$$k^2(x_1^2 - a^2) - 2kx_1y_1 + y_1^2 - b^2 = 0. \quad (4.1.15)$$

Discriminantul ecuației (4.1.15) este

$$\Delta = 4(b^2x_1^2 + a^2y_1^2 - a^2b^2). \quad (4.1.16)$$

Pentru a avea două tangente prin punctul  $M$  trebuie să avem  $\Delta > 0$ , adică

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1 > 0. \quad (4.1.17)$$

Aceasta înseamnă că punctul  $M$  este exterior elipsei. Pantele celor două tangente vor fi

$$k_{1,2} = \frac{-x_1 y_1 \pm \sqrt{b^2 x_1^2 + a^2 y_1^2 - a^2 b^2}}{x_1^2 - a^2}.$$

Pentru a avea o singură tangentă, trebuie să avem  $\Delta = 0$ , adică

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1 = 0. \quad (4.1.18)$$

De data asta, punctul trebuie să fie pe elipsă, iar panta unicei tangente va fi

$$k = \frac{-x_1 y_1}{x_1^2 - a^2}.$$

Este ușor de constatat că, în acest caz, ecuația tangentei este chiar cea care se obține prin dedublare, adică

$$\frac{x x_1}{a^2} + \frac{y y_1}{b^2} - 1 = 0.$$

În fine, nu avem tangente dacă  $\Delta < 0$ , adică dacă

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1 < 0 \quad (4.1.19)$$

sau, ceea ce este același lucru, dacă punctul  $M$  este în interiorul elipsei. Examinăm acum cazul în care una dintre tangentele duse din punctul  $M$  este verticală. Este clar, atunci, că această tangentă trebuie să aibă ecuația

$$x = \pm a.$$

Așadar, vom avea  $M = M(\pm a, y_1)$ . Ce-a de-a doua tangentă din  $M$  nu poate să fie tot verticală, deci ecuația sa trebuie să fie de forma

$$y = kx \pm \sqrt{a^2 k^2 + b^2}. \quad (4.1.20)$$

Pentru ca tangenta să treacă prin  $M$ , trebuie să avem

$$y_1 = \pm ka \pm \sqrt{a^2 k^2 + b^2} \quad (4.1.21)$$




Figura 4.4 – Tangente (neverticale) la elipsă dintr-un punct exterior

sau, ridicând la pătrat,

$$(y_1 \mp ka)^2 = a^2k^2 + b^2 \tag{4.1.22}$$

adică

$$y_1^2 \mp 2y_1ka + a^2k^2 = a^2k^2 + b^2$$

sau

$$\pm 2y_1ak = y_1^2 - b^2. \tag{4.1.23}$$

Dacă  $y_1 = 0$ , atunci ecuația de mai sus (în  $k$ ) nu are soluție, ceea ce este normal, pentru că, în acest caz  $M$  este unul dintre vârfurile de pe  $Ox$  ale elipsei, deci nu există decât o singură tangentă, cea verticală. În caz contrar, din ecuația (4.1.23) rezultă că

$$k = \pm \frac{y_1^2 - b^2}{2ay_1}, \tag{4.1.24}$$

semnul alegându-se în funcție de vârful prin care trece tangenta verticală.

## 4.2 Hiperbola

**Definiția și deducerea formei canonice** Considerăm că se dau, în plan, două puncte  $F_1$  și  $F_2$ , distanța dintre care este egală cu  $2c$ . Mai alegem un număr real  $a$ , care verifică inegalitatea

$$0 < a < c. \tag{4.2.1}$$




Figura 4.5 – Tangente la elipsă, cu o tangentă verticală

**Definiția 4.2.** Se numește *hiperbolă* figura geometrică formată din toate punctele din plan pentru care valoarea absolută a diferenței distanțelor până la punctele fixe  $F_1$  și  $F_2$  este constantă, egală cu  $2a$ . Punctele  $F_1$  și  $F_2$  se numesc *focare* ale hiperbolei.

Este clar acum de ce am impus dubla inegalitate (4.2.1): dacă  $a = 0$ , atunci figura este neinteresantă, întrucât ea se reduce la o dreaptă (mediatoarea segmentului  $F_1F_2$ ), în timp ce dacă  $a > c$ , figura este mulțimea vidă.

Vom stabili acum ecuația hiperbolei. În acest scop, alegem un reper cartezian în care axa  $Ox$  să coincidă cu dreapta  $F_1F_2$ , cu sensul de la  $F_1$  înspre  $F_2$ . Originea  $o$  alegem în mijlocul segmentului  $F_1F_2$ . Prin urmare, coordonatele focarelor vor fi  $F_1(-c, 0)$  și  $F_2(c, 0)$ . Dacă  $M(x, y)$  este un punct oarecare al hiperbolei, atunci, în conformitate cu definiția, avem

$$|F_1M - F_2M| = 2a$$

sau

$$F_1M - F_2M = \pm 2a. \quad (4.2.2)$$

Dacă înlocuim în ecuația (4.2.2) expresiile

$$F_1M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad F_2M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

obținem

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} - \sqrt{(x-c)^2+y^2} = \pm 2a. \quad (4.2.3)$$

Aceasta este ecuația hiperbolei. În cele ce urmează, vom obține o formă mai simplă a ei. Trecem al doilea radical în membrul drept și ridicăm ambii membri la pătrat și obținem

$$cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

Dacă ridicăm din nou la pătrat și reducem termenii asemenea, obținem

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

sau

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1. \quad (4.2.4)$$

introducem acum mărimea

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}.$$

În virtutea inegalității (4.2.1), ea este reală. Atunci

$$b^2 = c^2 - a^2, \quad (4.2.5)$$

iar ecuația (4.2.4) capătă forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (4.2.6)$$

Am demonstrat până acum că toate punctele hiperbolei, care verifică, deci, ecuația (4.2.3), verifică, de asemenea, ecuația (4.2.6). Vom demonstra, acum, că și afirmația inversă este adevărată. Fie, prin urmare,  $M(x, y)$  un punct ce verifică ecuația (4.2.6). Atunci

$$y^2 = b^2 \left( \frac{x^2}{a^2} - 1 \right).$$

Folosind această relație și egalitatea (4.2.5), obținem

$$\begin{aligned} F_1M &= \sqrt{(x+c)^2+y^2} = \sqrt{x^2+2cx+c^2+\frac{b^2}{a^2}x^2-b^2} = \\ &= \sqrt{\frac{c^2}{a^2}x^2+2cx+a^2} = \left| \frac{c}{a}x+a \right|. \end{aligned} \quad (4.2.7)$$

În mod analog, se obține

$$F_2M = \left| \frac{c}{a}x-a \right|. \quad (4.2.8)$$




Figura 4.6 – Hiperbola

Cum din egalitatea (4.2.6) rezultă că  $|x| \geq a$ , iar, în virtutea inegalității (4.2.1),  $c > a$ , rezultă că pentru  $x \geq a$  formulele (4.2.7) și (4.2.8) ne conduc la

$$F_1M = \frac{c}{a}x + a, \quad F_2M = \frac{c}{a}x - a. \quad (4.2.9)$$

Prin urmare,

$$F_1M - F_2M = 2a.$$

Pentru  $x \leq -a$  avem

$$F_1M = -\frac{c}{a}x - a, \quad F_2M = -\frac{c}{a}x + a. \quad (4.2.10)$$

Prin urmare,

$$F_1M - F_2M = -2a.$$

Așadar, orice punct care verifică ecuația (4.2.6) verifică, de asemenea, ecuația (4.2.2), deci și ecuația (4.2.3). Prin urmare, ecuația (4.2.6) este echivalentă cu ecuația hiperbolei. Ea se numește *ecuația canonică a hiperbolei*.

**Studiul formei hiperbolei. Asimptote.** Din ecuația (4.2.6) se vede imediat că  $|x| \geq a$ . Aceasta înseamnă că hiperbola este situată, în întregime, în afara benzii verticale delimitată de dreptele  $x = -a$  și  $x = a$ .



Ca și în cazul elipsei, în ecuația canonică a hiperbolei intră numai puteri pare ale variabilelor  $x$  și  $y$ , ceea ce înseamnă că și hiperbola are două axe de simetrie (axele de coordonate) și un centru de simetrie (originea coordonatelor). De aceea, este suficient să studiem forma hiperbolei în primul cadran al axelor de coordonate, întrucât în celelalte trei se poate, apoi, deduce prin simetrie. În acest cadran, se obține, din ecuația (4.2.6):

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}, \quad x \geq a. \quad (4.2.11)$$

Graficul acestei funcții, care începe din punctul  $A(a, 0)$  este nemărginit la dreapta și superior. Este ușor de constatat că dreapta

$$y = \frac{b}{a}x \quad (4.2.12)$$

este asimptotă oblică la  $+\infty$  a acestui grafic. Este, de asemenea, clar, din motive de simetrie, că dreptele

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

sunt, ambele, asimptote oblice la graficul hiperbolei, atât la  $+\infty$ , cât și la  $-\infty$ .

În cazul elipsei, am văzut că există un dreptunghi, cu centrul în origine și de laturi  $2a$ , respectiv  $2b$ , cu laturile paralele cu axele de coordonate, care conține întreaga elipsă și care este, de asemenea, tangenț elipsei. Un rol asemănător îl joacă în cazul hiperbolei același dreptunghi, atâta doar că:

- hiperbola se află în exteriorul dreptunghiului;
- doar două dintre laturile dreptunghiului sunt tangente la elipsă și
- diagonalele acestui dreptunghi (dreptele lor suport, de fapt) sunt chiar asimptotele hiperbolei.

Hiperbola este o figură alcătuită din două ramuri. Semnul “+” din egalitatea (4.2.2) corespunde ramurii din dreapta, în timp ce semnul “-” corespunde ramurii din stânga. Centrul de simetrie al hiperbolei se numește, pur și simplu, *centrul* hiperbolei. Axele sale de simetrie se numesc *axele hiperbolei*. Mai precis, axa care intersectează hiperbola se numește *axă reală*, în timp ce axa ce nu o intersectează se numește *axă imaginară*. Punctele  $A_1$  și  $A_2$ , în care axa reală intersectează hiperbola se numesc *vârfuri* ale hiperbolei. De asemenea, ca și în cazul elipsei, numerele  $a$  și  $b$  se numesc *semiaxe* ale hiperbolei. Dacă  $a = b$ , atunci hiperbola se numește *echilaterală*. E ușor de constatat că în cazul unei hiperbole echilaterale asimptotele formează un unghi de  $45^\circ$  cu axa  $Ox$ .

Alături de hiperbola (4.2.6), se poate considera și curba de ecuație

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (4.2.13)$$

Se poate vedea cu ușurință că și această curbă este o hiperbolă, pentru care focarele sunt situate pe axa  $Oy$ . Vom spune despre cele două hiperbole (care au aceleași axe și aceleași asimptote) că sunt *conjugate*.

**Excentricitatea.** Se numește *excentricitate* a hiperbolei numărul

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}.$$

Este clar, din însăși definiția hiperbolei, că  $\varepsilon > 1$ . Excentricitatea determină forma dreptunghiului fundamental, deci, în ultimă instanță, forma hiperbolei. Astfel, cu cât excentricitatea este mai mare, cu atât cele două ramuri ale hiperbolei se apropie mai mult de axa  $Oy$  și, cu cât excentricitatea este mai apropiată de 1, cu atât hiperbola se apropie mai tare de axa  $Ox$ .

**Intersecția hiperbolei cu o dreaptă. Tangenta la o hiperbolă.** Analog cu ceea ce am făcut în cazul elipsei, ne vom ocupa acum de problema intersecției dintre o hiperbolă dată de ecuația implicită (4.2.6) și o dreaptă.

Să presupunem, mai întâi, că dreapta nu este orizontală. Atunci ecuația ei se poate scrie cu ajutorul pantei, adică

$$y = kx + m. \quad (4.2.14)$$

Dacă înlocuim pe  $y$  din formula de mai sus în ecuația (4.2.6) a hiperbolei, obținem ecuația care ne dă abscisa (sau abscisele) punctului (sau punctelor) de intersecție:

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2a^2kmx - a^2(b^2 + m^2) = 0. \quad (4.2.15)$$

Această ecuație se numește *ecuația de intersecție*. Dacă  $b^2 - a^2k^2 \neq 0$ , atunci ecuația (4.2.15) este de gradul doi, deci pentru a determina numărul rădăcinilor sale reale trebuie să facem apel la discriminantul ecuației. Avem

$$\Delta = -4a^2b^2(-b^2 + a^2k^2 - m^2). \quad (4.2.16)$$

Pentru ca dreapta să fie tangentă la hiperbolă, trebuie să avem  $\Delta = 0$ , adică

$$a^2k^2 = b^2 + m^2.$$




Figura 4.7 – Tangenta la o hiperbolă, de direcție dată

Este clar că, întrucât  $b \neq 0$ , vom avea, întotdeauna, două tangente, pentru un  $m$  dat. Dacă  $\Delta > 0$ , adică dacă

$$a^2k^2 < b^2 + m^2,$$

atunci dreapta și hiperbola vor avea două puncte în comun.

Dacă  $\Delta < 0$ , adică dacă

$$a^2k^2 > b^2 + m^2,$$

atunci dreapta și hiperbola nu vor avea în comun.

Dacă, pe de altă parte,  $b^2 - a^2k^2 = 0$ , atunci sunt posibile două situații:

1.  $m = 0$ ;
2.  $m \neq 0$ .

În prima situație, avem două drepte, de pantă  $k = \pm b/a$ , care trec prin origine. Este clar că aceste două drepte nu sunt altceva decât asimptotele hiperbolei, despre care știm, deja, că nu au puncte comune cu hiperbola.

În ce-a de-a doua situație, avem de-a face cu drepte care sunt paralele cu asimptotele hiperbolei, așadar ele intersectează hiperbola exact într-un punct.

**Ecuția tangentei la hiperbolă prin dedublare.** Utilizând exact aceeași metodă ca și în cazul elipsei, se obține

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

pentru ecuația tangentei în punctul  $M_0(x_0, y_0)$  al hiperbolei.

**Tangente la hiperbolă duse dintr-un punct exterior.** Procedăm exact ca și în cazul elipsei. Începem cu situația în care nici una dintre tangentele duse din  $M(x_1, y_1)$  nu este verticală. Atunci, după cum am văzut, ecuația tangentei este de forma

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 - b^2}.$$

Pentru ca tangenta să treacă prin  $M$ , trebuie să avem

$$y_1 - kx_1 = \pm \sqrt{a^2k^2 - b^2}$$

sau, ridicând la pătrat,

$$(y_1 - kx_1)^2 = a^2k^2 - b^2.$$

Se obține, astfel, ecuația




Figura 4.8 – Tangente la hiperbolă dintr-un punct exterior (tangente neverticale)

$$(x_1^2 - a^2)k^2 - 2x_1y_1k + (y_1^2 + b^2) = 0.$$

Aceasta este ecuația care ne dă pantele celor două tangente. Discriminantul ei este:

$$\Delta = 4(a^2y_1^2 - b^2x_1^2 + a^2b^2) = -4a^2b^2 \left( \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1 \right).$$

Se observă imediat că:

- avem două tangente dacă

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1 < 0,$$

adică punctul este între cele două ramuri ale hiperbolei;

- avem o singură tangentă dacă

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1 = 0,$$

adică dacă punctul este pe hiperbolă;

- nu avem tangente dacă

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1 > 0,$$

adică dacă punctul este în interiorul uneia dintre ramurile hiperbolei.




Figura 4.9 – Tangente la hiperbolă dintr-un punct exterior (o tangentă verticală)

Examinăm acum cazul în care una dintre tangente este verticală, ceea ce înseamnă că are ecuația

$$x = \pm a.$$

Așadar, vom avea  $M = M(\pm a, y_1)$ . Ce-a de-a doua tangentă din  $M$  nu poate să fie tot verticală, deci ecuația sa trebuie să fie de forma

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 - b^2}. \quad (4.2.17)$$

Pentru ca tangenta să treacă prin  $M$ , trebuie să avem

$$y_1 = \pm ka \pm \sqrt{a^2k^2 - b^2} \quad (4.2.18)$$

sau, ridicând la pătrat,

$$(y_1 \mp ka)^2 = a^2k^2 - b^2 \quad (4.2.19)$$

adică

$$y_1^2 \mp 2y_1ka + a^2k^2 = a^2k^2 - b^2$$

sau

$$\pm 2y_1ak = y_1^2 + b^2. \quad (4.2.20)$$

Dacă  $y_1 = 0$ , atunci ecuația de mai sus (în  $k$ ) nu are soluție, ceea ce este normal, pentru că, în acest caz  $M$  este unul dintre vârfurile de pe  $Ox$  ale elipsei, deci nu există decât o singură tangentă, cea verticală. În caz contrar, din ecuația (4.1.23) rezultă că

$$k = \pm \frac{y_1^2 + b^2}{2ay_1}, \quad (4.2.21)$$

semnul alegându-se în funcție de vârful prin care trece tangenta verticală.

### 4.3 Parabola

#### Definiția și ecuația canonică

**Definiția 4.3.** Se numește *parabolă* locul geometric al punctelor din plan care sunt egal depărtate de o dreaptă fixă  $\Delta$ , numită *directoare* și de un punct fix  $F$ , numit *focar*.

Fie  $p$  distanța de la punctul  $F$  la dreapta  $\Delta$ . Construim un sistem rectangular de coordonate în plan în modul următor. În calitate de axă  $Ox$  alegem perpendiculara coborâtă din punctul  $F$  pe dreapta  $\Delta$ , cu sensul de la directoare înspre focar, în timp ce axa  $Oy$  va fi mediatoarea segmentului determinat de  $F$  și piciorul perpendicularei coborâte din  $F$  pe  $\Delta$ , cu sensul ales astfel încât reperul  $xOy$  să fie drept, unde  $O$  este punctul de intersecție a celor două axe de coordonate. Aceasta înseamnă că punctul  $F$  are coordonatele  $(p/2, 0)$ , în timp ce ecuația dreptei  $\Delta$  este  $x = -p/2$ . Fie, acum,  $M(x, y)$  un punct oarecare al parabolei. Atunci, distanța de la  $M$  la  $F$  este egală cu

$$d(M, F) = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2},$$

în timp ce distanța de la  $M$  la  $\Delta$  este

$$d(M, \Delta) = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

Așadar, ecuația parabolei este, conform definiției,

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|. \quad (4.3.1)$$




Figura 4.10 – Parabola

Este ușor de constatat că egalitatea (4.3.1) poate avea loc doar dacă

$$\left|x + \frac{p}{2}\right| = x + \frac{p}{2},$$

adică dacă

$$x \geq -\frac{p}{2}.$$

ceea ce înseamnă că ecuația parabolei, (4.3.1) se poate rescrie sub forma

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}. \quad (4.3.2)$$

Prin ridicare la pătrat, această ecuație este echivalentă (în acest caz particular!!) cu ecuația

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

sau, după reducerea termenilor asemenea, cu ecuația

$$y^2 = 2px. \quad (4.3.3)$$

Ecuația (4.3.3) se numește *ecuația canonică a parabolei de parametru p*.

**Forma parabolei.** Remarcăm, înainte de toate, că din ecuația canonică (4.3.3) rezultă imediat că  $x$  poate lua doar valori nenegative, prin urmare parabola dată de această ecuație este situată de partea dreaptă a axei  $Oy$ .

Cum ecuația (4.3.3) conține variabila  $y$  doar la puterea a doua, rezultă că parabola este simetrică față de axa  $Ox$  și, deci, pentru studiul formei, este suficient să examinăm partea din parabolă situată în primul cadran. În acest cadran, ecuația parabolei se poate scrie sub forma

$$y = \sqrt{2px}. \quad (4.3.4)$$

Dacă se calculează primele două derivate ale lui  $y$ , se obține imediat că

$$y' = \frac{1}{\sqrt{2px}}, \quad (4.3.5)$$

respectiv

$$y'' = -\frac{\sqrt{2}p^2}{4(px)^{3/2}}. \quad (4.3.6)$$

Așadar, pe intervalul  $(0, \infty)$ ,  $y' > 0$ , în timp ce  $y'' < 0$ . Aceasta înseamnă că funcția  $y$  este strict crescătoare și concavă pe acest interval. Forma curbei în cadranul al patrulea se obține din cea din cadranul 1, printr-o reflexie față de axa  $Ox$ .

Axa de simetrie a parabolei (4.3.3), adică axa  $Ox$ , se numește *axa parabolei*, în timp ce punctul în care parabola intersectează axa (originea, în cazul nostru), se numește *vârful parabolei*.

**Parametrul parabolei.** Mărimea  $p$  care apare în ecuația canonică (4.3.3) se numește *parametru focal* sau, pur și simplu, *parametru* al parabolei. Vom indica, șn cele ce urmează, o altă interpretare geometrică a acestui parametru. Considerăm dreapta care trece prin focarul parabolei și este perpendiculară pe axa parabolei. Se observă, imediat, că ecuația acestei drepte este

$$x = \frac{p}{2}. \quad (4.3.7)$$

Fie  $M_1$  și  $M_2$  punctele de intersecție dintre această dreaptă și parabolă. Rezolvând sistemul de ecuații format de ecuațiile (4.3.3) și (4.3.7), obținem  $y = \pm p$ , prin urmare

$$p = FM_1. \quad (4.3.8)$$

Astfel, *parametrul  $p$  al parabolei este egal cu lungimea perpendicularei ridicate pe axa parabolei, între focarul parabolei și punctul în care perpendiculara intersectează parabola.*

Parametrul este cel care definește forma și dimensiunile parabolei.



*Observație.* Alături de ecuația (4.3.3), tot parabole definesc și următoarele trei ecuații (canonice!):

$$y^2 = -2px, \quad x^2 = 2py, \quad x^2 = -2py. \quad (4.3.9)$$

Astfel, prima ecuație ne dă o parabolă simetrică față de axa  $Oy$  în raport cu parabola (4.3.3), iar celelalte două parabole se obțin aplicând o rotație de  $90^\circ$ , respectiv  $-90^\circ$ , parabolei (4.3.3), în jurul originii.

**Intersecția parabolei cu o dreaptă. Tangenta la o parabolă.** Considerăm parabola (4.3.3) și o dreaptă, pe care o considerăm, în prima instanță, neverticală. Pentru a determina punctele de intersecție, trebuie să rezolvăm sistemul

$$\begin{cases} y^2 = 2px, \\ y = kx + b. \end{cases}$$

Înlocuind cea de-a doua ecuație în prima, obținem ecuația în  $x$ :

$$k^2x^2 + 2(kb - p)x + b^2 = 0. \quad (4.3.10)$$

Această ecuație se numește *ecuația de intersecție* dintre parabolă și dreaptă. Cum ea este o ecuație de gradul doi în  $x$ , înseamnă că parabola și dreapta pot avea în comun două puncte distincte, un singur punct (sau două puncte confundate) sau niciun punct, în funcție de discriminantul ecuației (4.3.10).

Un calcul simplu ne arată că discriminantul este dat de

$$\Delta = 4p(p - 2bk). \quad (4.3.11)$$

Prin urmare,

(i) Parabola și dreapta au două puncte distincte în comun dacă

$$\Delta > 0, \quad \text{adică} \quad kb < \frac{p}{2}.$$

(ii) Parabola și dreapta au două puncte confundate în comun (adică, de fapt, un singur punct) dacă

$$\Delta = 0, \quad \text{adică} \quad kb = \frac{p}{2}.$$

În acest caz parabola și dreapta sunt tangente. De remarcat că, întrucât parametrul  $p$  al parabolei este strict pozitiv, rezultă că (de vreme ce  $kb \neq 0$ ):

- tangenta la o parabolă nu poate fi orizontală (mai precis, în cazul general, nu poate fi paralelă cu axa parabolei);
- nu există tangente neverticale la o parabolă care să treacă prin vârful parabolei.

(iii) Parabola și dreapta nu puncte în comun dacă

$$\Delta < 0, \quad \text{adică} \quad kb > \frac{p}{2}.$$

În particular, orice dreaptă paralelă cu axa parabolei (adică orizontală) intersectează parabola în două puncte distincte; de asemenea, orice dreaptă (nevertică) care trece prin origine intersectează parabola în două puncte distincte.

Să analizăm, acum, intersecția dintre parabola (4.3.3) și o dreaptă verticală. În acest caz, avem de rezolvat sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} y^2 = 2px, \\ x = a, \end{cases}$$

care ne conduce la ecuația de intersecție (în  $y$  de data aceasta);

$$y^2 - 2ap = 0. \tag{4.3.12}$$

Cum, din nou,  $p > 0$ , intersecția este:

- o pereche de puncte distincte, dacă  $a > 0$ ;
- o pereche de puncte confundate (adică un singur punct) dacă  $a = 0$ . Dreapta este, în acest caz tangență parabolei. Ea coincide cu axa  $Oy$ .
- mulțimea vidă, dacă  $a < 0$ .

**Ecuția tangentei într-un punct al parabolei.** Plecăm, din nou, de la ecuația canonică a parabolei și considerăm o dreaptă care intersectează parabola într-un punct  $M_0(x_0, y_0)$ . Ecuațiile parametrice ale dreptei vor fi, deci

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt. \end{cases}$$

Înlocuind în ecuația parabolei, obținem

$$(y_0 + mt)^2 = 2p(x_0 + lt)$$




Figura 4.11 – Tangenta la o parabolă, paralelă cu o direcție

sau, după ce facem calculele,

$$m^2 t^2 + 2t(-pl + my_0) + y_0^2 - 2p_0 = 0.$$

Termenul liber se anulează, deoarece  $M_0$  se află pe parabolă, deci ecuația se reduce

$$m^2 t^2 + 2t(-pl + my_0) = 0.$$

Condiția de tangență înseamnă, ca și în cazul celorlalte conice, că ecuația de intersecție trebuie să aibă soluție dublă, deci, în cazul nostru, coeficientul lui  $t$  trebuie să fie zero:

$$-pl + my_0 \equiv \mathbf{v}(l, m) \cdot \mathbf{n}(-p, y_0) = 0,$$

adică vectorul  $\mathbf{n}(-p, y_0)$  este vectorul normal al tangentei. Prin urmare, ecuația tangentei este:

$$-p(x - x_0) + y_0(y - y_0) = 0$$

sau

$$yy_0 = p(x + x_0),$$

unde am utilizat, din nou, faptul că punctul  $M_0$  aparține parabolei. Și de data aceasta, ca și în cazul conicelor cu centru, spunem că această formă a ecuației parabolei a fost obținută prin dedublare. E o mică diferență față de cazul celorlalte două conice, pentru că aici apare  $x$  la puterea întâi. De data asta, regula de dedublare înseamnă că:

- $x$  se înlocuiește cu  $(x + x_0)/2$ ;
- $y^2$  se înlocuiește cu  $yy_0$ .

**Tangente duse dintr-un punct exterior parabolei.** Considerăm un punct  $M(x_1, y_1)$ . Începem, ca de obicei, cu cazul tangențelor neverticale. Am văzut că ele au ecuația de forma

$$y = kx + \frac{p}{2k}.$$

Pentru ca  $M$  să se afle pe tangentă, trebuie să avem




Figura 4.12 – Tangente neverticale la o parabolă, dintr-un punct exterior

$$y_1 = kx_1 + \frac{p}{2k},$$

de unde

$$2x_1k^2 - 2y_1k + p = 0.$$

Discriminantul este

$$\Delta = 4(y_1^2 - 2px_1).$$

Prin urmare:

- avem două tangente dacă  $y_1^2 - 2px_1 > 0$  (punctul e în afara parabolei);

- avem o singură tangentă dacă  $y_1^2 - 2px_1 = 0$  (punctul este pe parabolă);
- nu avem tangente dacă  $y_1^2 - 2px_1 < 0$  (punctul este în interiorul parabolei).

Ecuția tangentei este de forma

$$y - y_1 = k(x - x_1),$$

cu  $k$  dat de ecuația de gradul doi de mai sus.

Să vedem ce se întâmplă dacă una dintre tangente este verticală. Ea trebuie să aibă ecuația

$$x = 0.$$

Căutăm panta celei de-a doua tangente. Remarcăm, mai întâi, că  $x_1 = 0$ . Ecuția




Figura 4.13 – Tangente la parabolă dintr-un punct exterior (o tangentă verticală)

Figura 4.14 – parabola4

tangentei trebuie să fie

$$y = kx + \frac{p}{2k}.$$

Ca să treacă prin  $M$ ,

$$y_1 = \frac{p}{2k}.$$

Dacă  $y_1 = 0$ , atunci avem o singură tangentă (cea verticală). În caz contrar,

$$k = \frac{p}{2y_1},$$

adică ecuația tangentei este

$$y - y_1 = \frac{p}{2y_1}x.$$

## 4.4 Cercul

### 4.4.1 Definiția și ecuația canonică

Spre deosebire de celelalte conice, în cazul cercului presupunem că avem, de la bun început, fixat un sistem de coordonate ortonormat.

**Definiția 4.4.** Fie  $C(h, k)$  un punct din plan și  $r > 0$  un număr real. Se numește *cerc de centru C și rază r* locul geometric al punctelor  $M$  din plan pentru care distanța de la  $M$  la  $C$  este egală cu  $r$ .

Ca și în cazul elipsei (dar mult mai simplu!) se poate stabili ecuația pe care trebuie să o verifice punctele cercului, și numai ele.

**Propoziția 1.** Punctul  $M$ , de coordonate  $(x, y)$  aparține cercului  $\mathcal{C}$ , de centru  $C$  și rază  $r$  dacă și numai dacă cele două coordonate ale sale verifică ecuația

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2. \quad (4.4.1)$$

*Demonstrație* Distanța de la punctul  $M$  la centrul  $C$  este egală cu

$$CM = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2},$$

deci  $CM = r$  dacă și numai dacă are loc relația (4.4.1).  $\square$

Ecuația (4.4.1) se numește *ecuația redusă* a cercului. Dacă originea sistemului de coordonate se alege astfel încât centrul cercului să coincidă cu originea, atunci ecuația redusă devine

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (4.4.2)$$

Această ecuație se numește *ecuația canonică* a cercului de rază  $r$ .

Cazuri particulare ale ecuației reduse:

1. Dacă cercul este tangent axei  $Ox$ , atunci raza cercului este  $r = |k|$ , deci ecuația redusă se transformă în

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = k^2.$$

2. Dacă cercul este tangent axei  $Oy$ , atunci raza sa este  $r = |h|$ , deci ecuația redusă se transformă în

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = h^2.$$

3. Dacă cercul este tangent ambelor axe de coordonate, atunci  $r = |h| = |k|$ , deci ecuația cercului va fi

$$(x - h)^2 + (y \pm h)^2 = h^2.$$

#### 4.4.2 Ecuația generală a cercului

Dacă dezvoltăm pătratele din ecuația redusă a cercului, obținem

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0.$$

Această ecuație este de forma

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (4.4.3)$$

Ecuația (4.4.2) se numește *ecuația generală* a cercului. Ea, însă, nu este întotdeauna ecuația unui cerc. Ca să fie, trebuie să impunem niște condiții asupra coeficienților  $D, E, F$ . Ideea este că ecuația (4.4.3) trebuie să poată fi adusă la forma (4.4.1).

În acest scop, completăm pătratele în membrul stâng în modul următor:

$$\left(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}\right) + \left(y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}\right) - \frac{D^2}{4} - \frac{E^2}{4} + F = 0$$

sau

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F. \quad (4.4.4)$$

Ecuația (4.4.4) este de forma (4.4.1) dacă și numai dacă membrul drept al ecuației este pozitiv. În fapt, avem următoarele trei situații:

1. Dacă  $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F < 0$ , atunci membrul drept al ecuației (4.4.4) este strict negativ, ceea ce înseamnă că mulțimea descrisă de ecuația (4.4.3) este mulțimea vidă.
2. Dacă  $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F = 0$ , atunci membrul drept al ecuației (4.4.4) este egal cu zero, ceea ce înseamnă că mulțimea descrisă de ecuația (4.4.3) se reduce la punctul  $C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ .

3. Dacă  $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F > 0$ , atunci membrul drept al ecuației (4.4.4) este strict mai mare decât zero, ceea ce înseamnă că mulțimea descrisă de ecuația (4.4.3) este cercul de centru  $C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$  și de rază

$$r = \sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F}.$$

În concluzie, ecuația (4.4.3) este ecuația unui cerc dacă și numai dacă  $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F > 0$ .

Putem accepta și situația în care  $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F = 0$ , dacă acceptăm că un punct este un cerc de rază zero.

#### 4.4.3 Ecuația cercului care trece prin trei puncte

Fie  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ ,  $C(x_3, y_3)$  trei puncte necoliniare din plan. După cum se știe din geometria elementară, aceste puncte determină în mod unic un cerc, așa-numitul *cerc circumscris* al triunghiului  $ABC$ . Vrem să determinăm ecuația generală a acestui cerc. În acest scop, presupunem că ecuația generală este de forma

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (4.4.5)$$

Ecuația (4.4.5) trebuie să fie verificată de coordonatele punctelor  $A$ ,  $B$  și  $C$ , ceea ce înseamnă că următorul sistem de ecuații trebuie să fie verificat:

$$\begin{cases} Dx_1 + Ey_1 + F = -x_1^2 - y_1^2, \\ Dx_2 + Ey_2 + F = -x_2^2 - y_2^2, \\ Dx_3 + Ey_3 + F = -x_3^2 - y_3^2. \end{cases} \quad (4.4.6)$$

Determinantul acestui sistem este dat de

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

și este, în mod evident, diferit de zero, deoarece, dacă ar fi egal cu zero, atunci punctele  $A$ ,  $B$  și  $C$  ar fi coliniare, contrar ipotezei.

Am putea, în continuare, să rezolvăm sistemul și să determinăm coeficienții  $D$ ,  $E$  și  $F$ . Vom proceda, totuși, altfel.



Fie  $M(x, y)$  un punct din plan.  $M$  aparține cercului dacă și numai dacă cele două coordonate ale sale verifică, de asemenea, ecuația (4.4.5). Suntem, astfel, conduși la sistemul

$$\begin{cases} Dx + Ey + F = -x^2 - y^2, \\ Dx_1 + Ey_1 + F = -x_1^2 - y_1^2, \\ Dx_2 + Ey_2 + F = -x_2^2 - y_2^2, \\ Dx_3 + Ey_3 + F = -x_3^2 - y_3^2. \end{cases} \quad (4.4.7)$$

Sistemul de ecuații (4.4.7) este compatibil (și determinat, după cum am văzut mai sus!) dacă și numai dacă rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei extinse. Dar, după cum știm deja, rangul matricei sistemului este egal cu trei, deci sistemul este compatibil dacă și numai dacă singurul determinant de ordinul 4 care se poate forma cu elementele matricei extinse este egal cu zero, adică dacă și numai dacă

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 & -x^2 - y^2 \\ x_1 & y_1 & 1 & -x_1^2 - y_1^2 \\ x_2 & y_2 & 1 & -x_2^2 - y_2^2 \\ x_3 & y_3 & 1 & -x_3^2 - y_3^2 \end{vmatrix} = 0$$

sau, ceea ce este același lucru, dacă și numai dacă

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (4.4.8)$$

Prin urmare, punctul  $M$  aparține cercului circumscris triunghiului  $ABC$  atunci și numai atunci când coordonatele sale verifică ecuația (4.4.8).

*Observație.* Ecuația cercului circumscris triunghiului se poate obține și pe altă cale. După cum se știe din geometria elementară, centrul cercului circumscris unui triunghi este punctul de intersecție a mediatoarelor laturilor triunghiului. Așadar, putem determina coordonatele centrului rezolvând sistemul de ecuații format din ecuațiile a două dintre mediatoare. Raza cercului se determină calculând distanța de la centrul astfel determinat până la oricare dintre vârfurile triunghiului.

#### 4.4.4 Intersecția dintre o dreaptă și un cerc. Tangenta la cerc într-un punct al său

Considerăm un cerc de rază  $r$ . Pentru a fi în acord cu modul de investigare a celorlalte conice, vom considera că centrul cercului este în origine, adică presupunem că ecuația

cercului este ecuația canonică:

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (4.4.9)$$

### Cazul dreptelor neverticale

Dacă  $\Delta$  este o dreaptă neverticală, atunci ecuația sa se poate scrie

$$y = kx + m.$$

Așadar, pentru a studia intersecția dintre dreaptă și cerc, trebuie să investigăm sistemul de ecuații

$$\begin{cases} y = kx + m, \\ x^2 + y^2 = r^2, \end{cases}$$

care ne conduce la

$$x^2 + (kx + m)^2 = r^2$$

sau

$$(1 + k^2)x^2 + 2kmx + m^2 - r^2 = 0. \quad (4.4.10)$$

Ecuația (4.4.10) se numește *ecuația de intersecție*. Pentru a determina tipul de intersecție, calculăm discriminantul acestei ecuații:

$$\Delta = 4k^2m^2 - 4(1 + k^2)(m^2 - r^2) = 4(k^2m^2 - b^2 + r^2 - k^2m^2 + k^2r^2)$$

sau

$$\Delta = 4(r^2 + k^2r^2 - m^2). \quad (4.4.11)$$

Avem trei situații:

1. Dacă  $\Delta > 0$ , ecuația de intersecție are două soluții, adică dreapta este *secantă* cercului.  $\Delta > 0$  dacă și numai dacă

$$m \in \left(-\infty, -r\sqrt{1 + k^2}\right) \cup \left(r\sqrt{1 + k^2}, \infty\right). \quad (4.4.12)$$

2. Dacă  $\Delta = 0$ , adică

$$m = \pm r\sqrt{1 + k^2}, \quad (4.4.13)$$

atunci dreapta este tangentă la cerc (dreapta și cercul au două puncte confundate în comun). Prin urmare, ecuația tangentei de pantă  $k$  la cerc va fi

$$y = kx \pm r\sqrt{1 + k^2}. \quad (4.4.14)$$

Evident, sunt două tangente de pantă  $k$ , care trec prin puncte diametral opuse ale cercului.

3. Dacă  $\Delta < 0$ , adică

$$m \in \left( -r\sqrt{1+k^2}, r\sqrt{1+k^2} \right), \quad (4.4.15)$$

ecuația de intersecție nu are soluții, ceea ce înseamnă că dreapta și cercul nu au puncte comune (dreapta este exterioară cercului).

### Cazul dreptelor verticale

Dreptele verticale au ecuația de forma  $x = a$ , ceea ce ne conduce la ecuația de intersecție

$$y^2 = r^2 - a^2. \quad (4.4.16)$$

Este clar că, și de data aceasta, avem trei situații posibile:

1. Dacă  $a \in (-\infty, -r) \cup (r, \infty)$ , dreapta  $x = a$  nu se intersectează cu cercul, deci este exterioară cercului.
2. Dacă  $a = \pm r$ , atunci dreapta  $x = a$  este tangentă cercului.
3. Dacă  $a \in (-r, r)$ , dreapta  $x = a$  are două puncte în comun cu cercul (dreapta este secantă cercului).

### Tangenta la cerc într-un punct al său

Fie  $M_0(x_0, y_0)$  un punct de pe cercul cu centrul în origine și de rază  $r$ . O dreaptă oarecare care trece prin punctul  $M_0$  are ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt. \end{cases} \quad (4.4.17)$$

Dacă înlocuim (4.4.17) în ecuația cercului, obținem

$$(x_0 + lt)^2 + (y_0 + mt)^2 = r^2$$

sau, după ce facem calculele și ordonăm după puterile lui  $t$ ,

$$(l^2 + m^2) t^2 + 2(x_0 l + y_0 m) t = 0, \quad (4.4.18)$$

unde am utilizat faptul că punctul  $M_0$  se află pe cerc. Pentru ca dreapta să fie tangentă la cerc în  $M_0$ , punctul  $M_0$  trebuie să fie singurul punct de intersecție dintre dreaptă și cerc, ceea ce înseamnă că, în ecuația (4.4.18), coeficientul lui  $t$  trebuie să fie egal cu zero (altfel,

pe lângă  $M_0$ , care corespunde lui  $t = 0$ , ar mai exista încă un punct de intersecție). Dar condiția aceasta ne conduce la

$$x_0l + y_0m = 0,$$

ceea ce ne spune că tangenta este perpendiculară pe raza vectorie a punctului  $M_0$ , adică putem lua ca vector director al său vectorul  $\mathbf{v}(y_0, -x_0)$ , care este, în mod evident, perpendicular pe vectorul de componente  $(x_0, y_0)$ . Prin urmare, ecuația tangentei se poate scrie

$$\frac{x - x_0}{y_0} = \frac{y - y_0}{-x_0}$$

sau

$$-x_0x + x_0^2 = yy_0 - y_0^2$$

ceea ce este totuna cu

$$x_0x + y_0y = x_0^2 + y_0^2.$$

Cum punctul  $M_0$  trebuie să verifice ecuația cercului, ecuația de mai sus se transformă în

$$x_0x + y_0y = r^2. \quad (4.4.19)$$

Aceasta este ecuația tangentei în  $M_0$ , obținută din ecuația cercului prin *dedublare*.

### Tangenta dusă la cerc dintr-un punct exterior cercului

Fie  $M(x_1, y_1)$  un punct exterior cercului (adică avem  $x_1^2 + y_1^2 > r^2$ ). După cum știm din geometria elementară, din acest punct putem duce două tangente la cerc.

Presupunem, mai întâi, că nici una dintre cele două tangente nu este verticală. Atunci tangentele trebuie să aibă ecuații de forma

$$y = kx \pm r\sqrt{1 + k^2}.$$

Deoarece punctul  $M$  se află pe tangentă, el trebuie să verifice ecuația

$$y_1 = kx_1 \pm r\sqrt{1 + k^2}.$$

ceea ce ne conduce la

$$(y_1 - kx_1)^2 = r^2(1 + k^2)$$

sau

$$k^2(x_1^2 - r^2) - 2kx_1y_1 + y_1^2 - r^2 = 0. \quad (4.4.20)$$

Ecuția (4.4.20) este o ecuație de gradul al doilea (coeficientul termenului de gradul 2 nu se poate anula, deoarece nici una dintre tangente nu este verticală). Discriminantul ecuației este

$$\Delta = 4x_1^2y_1^2 - 4(x_1^2y_1^2 - x_1^2r^2 - y_1^2r^2 - r^4)$$

sau

$$\Delta = 4r^2(x_1^2 + y_1^2 - r^2). \quad (4.4.21)$$

Punctul  $M$  fiind exterior cercului, discriminantul este strict pozitiv, deci avem două tangente distincte. Pantele celor două tangente vor fi

$$k_{1,2} = \frac{2x_1y_1 \pm \sqrt{\Delta}}{x_1^2 - r^2}. \quad (4.4.22)$$

Cazul tangentei verticale se tratează exact ca și în cazul, mai general, al elipsei și este lăsat pe seama cititorului.

## 4.5 Probleme

**Problem 4.1.** Determinați locul geometric al mijloacelor coardelor elipsei  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ , care sunt paralele cu dreapta  $x + 2y = 1$ .

**Problem 4.2.** Se consideră elipsa  $x^2 + 4y^2 = 25$ . Să se determine coardele care trec prin  $A(7/2, 7/4)$  pentru care punctul  $A$  este mijlocul lor.

**Problem 4.3.** Prin punctul  $M(0, 3)$  să se ducă o dreaptă care să intersecteze elipsa  $x^2 + 4y^2 = 20$  în două puncte  $A$  și  $B$  astfel încât  $MA = 2MB$ .

**Problem 4.4.** Se consideră elipsa  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . Să se găsească punctele  $M$  de pe elipsă pentru care unghiul  $\widehat{F_1MF_2}$  este drept.

**Problem 4.5.** Se consideră elipsa  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . Să se găsească punctele  $M$  de pe elipsă pentru care unghiul  $\widehat{F_1MF_2}$  este de  $60^\circ$ .

**Problem 4.6.** Se consideră elipsa  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . Să se găsească punctele  $M$  de pe elipsă pentru care unghiul  $\widehat{F_1MF_2}$  este maxim.

**Problem 4.7.** Determinați tangentele la elipsa  $\frac{x^2}{10} + \frac{2y^2}{5} = 1$  care sunt paralele cu dreapta

$$3x + 2y + 7 = 0.$$

**Problem 4.8.** Determinați tangentele la elipsa  $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{24} = 1$  care sunt paralele cu dreapta

$$4x - 2y + 23 = 0$$

și calculați distanța dintre ele.

**Problem 4.9.** Determinați locul geometric al mijloacelor coardelor hiperbolei  $x^2 - 2y^2 = 1$ , care sunt paralele cu dreapta  $2x - y = 0$ .

**Problem 4.10.** Se consideră hiperbola  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ . Să se găsească punctele  $M$  de pe hiperbolă pentru care unghiul  $\widehat{F_1MF_2}$  este drept.

**Problem 4.11.** Se consideră hiperbola  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ . Să se găsească punctele  $M$  de pe hiperbolă pentru care unghiul  $\widehat{F_1MF_2}$  este de  $60^\circ$ .

**Problem 4.12.** Se consideră hiperbola  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ . Să se găsească punctele  $M$  de pe hiperbolă pentru care unghiul  $\widehat{F_1MF_2}$  este maxim.

**Problem 4.13.** Calculați aria formată de asimptotele hiperbolei  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$  și de dreapta

$$3x + 2y - 7 = 0.$$

**Problem 4.14.** Determinați tangentele la hiperbola  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{8} = 1$  care sunt paralele cu dreapta

$$4x + 2y - 5 = 0.$$

**Problem 4.15.** Determinați tangenta la parabola  $y^2 = 16x$  care trece prin punctul  $(-2, 2)$ .

**Problem 4.16.** Determinați tangentele comune la elipsele

$$\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{și} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{18} = 1.$$

**Problem 4.17.** Determinați relația dintre coordonatele punctului  $(x_0, y_0)$  astfel încât din el să nu se poată duce nici o tangentă la hiperbola

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

**Problem 4.18.** Pe hiperbola  $\frac{x^2}{24} - \frac{y^2}{18} = 1$  determinați punctul  $M$  cel mai apropiat de dreapta

$$3x + 2y + 1 = 0$$

și determinați distanța de la acest punct la dreaptă.

**Problem 4.19.** Determinați ecuațiile tangentelor duse din punctul  $A(-1, -7)$  la hiperbola  $x^2 - y^2 = 16$ .

**Problem 4.20.** Din punctul  $P(1, -5)$  se duc tangente la hiperbola  $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{5} = 1$ . Determinați distanța de la punctul  $P$  la coarda hiperbolei care unește punctele de contact ale tangentelor cu hiperbola.

**Problem 4.21.** Determinați valorile pantei  $k$  pentru care dreapta  $y = kx + 2$  este tangentă la parabola  $y^2 = 4x$ .

**Problem 4.22.** Scrieți ecuația tangentei la parabola  $y^2 = 8x$  care este paralelă cu dreapta

$$3x + 2y - 3 = 0.$$

**Problem 4.23.** Scrieți ecuația tangentei la parabola  $y^2 = 16x$  care este perpendiculară pe dreapta

$$4x + 2y + 7 = 0.$$

**Problem 4.24.** Scrieți ecuația tangentei la parabola  $y^2 = 12x$  care este paralelă cu dreapta

$$3x - 2y + 30 = 0$$

și determinați distanța dintre tangentă și această dreaptă.

**Problem 4.25.** Scrieți ecuațiile tangentelor la parabola  $y^2 = 36x$  duse din punctul  $A(2, 9)$ .

**Problem 4.26.** Din punctul  $A(5, 12)$  se duc tangente la parabola  $y^2 = 5x$ . Scrieți ecuația dreptei care unește punctele de contact.

**Problem 4.27.** Din punctul  $P(-3, 12)$  se duc tangente la parabola  $y^2 = 10x$ . Calculați distanța de la punctul  $P$  la coarda parabolei care unește punctele de contact.





# CAPITOLUL 5

---

## Cuadrice

---

### Cuprins

---

5.1	Cuadrice pe ecuații reduse . . . . .	147
5.2	Elipsoidul . . . . .	148
5.3	Conul de gradul al doilea . . . . .	155
5.4	Hiperboloidul cu o pânză. . . . .	158
5.5	Hiperboloidul cu două pânze . . . . .	162
5.6	Paraboloidul eliptic . . . . .	165
5.7	Paraboloidul hiperbolic . . . . .	169
5.8	Cilindrul eliptic . . . . .	172
5.9	Cilindrul hiperbolic . . . . .	176
5.10	Cilindrul parabolic . . . . .	178
5.11	Probleme . . . . .	181

---

## 5.1 Cuadrice pe ecuații reduse

Se numește *cuadrică* în  $\mathbb{R}^3$  mulțimea punctelor  $P(x, y, z)$  ale căror coordonate verifică o ecuație de gradul al doilea, adică o ecuație de forma

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + a_{22}y^2 + a_{23}yz + a_{33}z^2 + a_{10}x + a_{20}y + a_{30}z + a_{00} = 0, \quad (5.1.1)$$

unde toți coeficienții sunt numere reale, iar coeficienții termenilor de gradul al doilea nu sunt toți nuli (adică, altfel spus, ecuația este, realmente, de gradul al doilea). În această secțiune nu vom aborda teoria generală a cuatricelor, ci ne vom mulțumi să studiem acele quadrice care sunt scrise sub forma canonică, adică, în esență, termenii de gradul al doilea micști nu sunt prezenți, iar termenii de gradul întâi, dacă este posibil, sunt absenți, de asemenea. Vom vedea ca aceasta nu este întotdeauna cazul. Urmează să vedem, mai târziu, că, printr-o schimbare de coordonate, orice quadrică se reduce la una dintre aceste quadrice pe care le vom studia mai jos.

## 5.2 Elipsoidul

O submulțime  $S \subset \mathbb{R}^3$  se numește *elipsoid* dacă există un sistem de coordonate cartezian și trei numere  $a, b, c$ , strict pozitive, astfel încât

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \right\}. \quad (5.2.1)$$

Altfel spus, un elipsoid este o suprafață de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (5.2.2)$$

Numerele  $a, b, c$  se numesc *semiaxe* ale elipsoidului. Dacă ele sunt distincte două câte două, atunci elipsoidul se numește *elipsoid triaxial*. Dacă două dintre ele sunt egale (de exemplu  $a = b$ ), atunci elipsoidul nostru este ceea ce se numește un *elipsoid de rotație*:

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

și se poate obține prin rotirea unei elipse în jurul unei axe (axa Oz), în cazul nostru). Dacă, în sfârșit, toate semiaxele sunt egale:  $a = b = c$ , elipsoidul nostru este o sferă de rază  $a$ .

Vom enumera acum o serie de proprietăți ale elipsoidului care ne vor permite, în cele din urmă, să stabilim forma acestei suprafețe.

**Proprietatea 1.** *Elipsoidul (5.2.2) este mărginit de un paralelipiped dreptunghic, cu fețele paralele cu planele de coordonate, cu centrul în origine, de muchii egale, respectiv, cu  $2a, 2b, 2c$  Așadar, în particular, elipsoidul, ca mulțime de puncte, este o mulțime mărginită.*

*Demonstrație* Într-adevăr, ecuația (5.2.2) se poate rescrie sub forma

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}.$$




Figura 5.1 – Elipsoidul

Cum membrul stâng al acestei ecuații este, în mod evident, pozitiv, același lucru trebuie să se întâmple și cu membrul drept, ceea ce ne conduce la inegalitatea

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1,$$

de unde  $x \in [-a, a]$ . Perfect analog rezultă că  $y \in [-b, b]$  și  $z \in [-c, c]$ , adică tocmai ceea ce voiam să demonstrăm, că  $(x, y, z) \in [-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$ .  $\square$

Elipsoidul este o figură care are un grad destul de înalt de simetrie:

**Proprietatea 2.** *Elipsoidul are trei plane de simetrie:  $xOy, yOz, zOx$ , trei axe de simetrie:  $Ox, Oy, Oz$ , precum și un centru de simetrie, originea  $O(0, 0, 0)$  a axelor de coordonate. În plus, dacă elipsoidul nu este triaxial, el poate avea și alte plane și axe de simetrie (nu și alte centre de simetrie, însă).*

*Demonstrație* Fie  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  un punct al elipsoidului. Atunci coordonatele sale verifică ecuația

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1.$$

Pentru a demonstra că, de exemplu, planul  $xOy$  este plan de simetrie, este suficient să demonstrăm că simetricul lui  $M_0$  față de acest plan aparține, de asemenea, elipsoidului. Dar este evident că simetricul lui  $M_0$  este punctul de coordonate  $(x_0, y_0, -z_0)$ , ale cărui coordonate, în mod evident, verifică ecuația elipsoidului, deci aparține elipsoidului. Raționamentul este analog pentru celelalte plane de coordonate. Planele de coordonate se mai numesc și *plane principale* ale elipsoidului, întrucât ele sunt plane de simetrie.

Faptul că axele de coordonate sunt axe de simetrie rezultă imediat din observațiile de mai sus, întrucât ele sunt intersecții de plane de simetrie. De asemenea, originea coordonatelor este centru de simetrie, deoarece este intersecția a două (de fapt chiar trei) axe de simetrie. Axele de coordonate, ca axe de simetrie ale elipsoidului, se mai numesc și *axe principale* ale acestuia.

Să presupunem acum că elipsoidul nostru este elipsoid de rotație, de exemplu, în jurul axei  $Oz$ . Afirmăm că orice plan care trece prin axa de rotație este plan de simetrie.

Am văzut că ecuația unui plan care trece prin axa  $Oz$  are o ecuație de forma  $\Pi : Ax + By = 0$ . Să presupunem, ca mai sus, că  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  este un punct de pe elipsoid, care acum este elipsoid de rotație în jurul axei  $Oz$ , deci coordonatele sale verifică ecuația:

$$\frac{x_0^2 + y_0^2}{a^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1.$$

Vom stabili coordonatele simetricului  $M'_0$  al lui  $M_0$  relativ la planul  $\Pi$ . Ecuațiile normalei la planul  $\Pi$  care trece prin  $M_0$  sunt

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{0}.$$

Determinăm mai întâi punctul de intersecție  $M_1$  dintre această normală și planul  $\Pi$ . Evident, coordonatele acestui punct sunt date de sistemul

$$\begin{cases} Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0 \\ z = z_0 \\ Ax + By = 0 \end{cases}.$$

Obținem, prin urmare,  $x_1 = \frac{B^2x_0 - AB y_0}{A^2 + B^2}$ ,  $y_1 = \frac{A^2y_0 - ABx_0}{A^2 + B^2}$ ,  $z_1 = z_0$ . Punctul  $M_1$  trebuie să fie mijlocul segmentului  $M_0M'_0$ , deci trebuie să avem

$$\begin{cases} x'_0 = 2x_1 - x_0 \\ y'_0 = 2y_1 - y_0 \\ z'_0 = 2z_1 - z_0. \end{cases}$$

Așadar,

$$x'_0 = \frac{2B^2x_0 - 2AB y_0}{A^2 + B^2} - x_0 = \frac{(B^2 - A^2)x_0 - 2AB y_0}{A^2 + B^2},$$

$$y'_0 = \frac{2A^2y_0 - 2ABx_0}{A^2 + B^2} - y_0 = \frac{-2ABx_0 + (A^2 - B^2)y_0}{A^2 + B^2},$$

$$z'_0 = z_0.$$

Avem, prin urmare,

$$\begin{aligned} \frac{x_0'^2 + y_0'^2}{a^2} + \frac{z_0'^2}{c^2} &= \frac{(B^2 - A^2)^2 x_0^2 + 4A^2 B^2 y_0^2 - 4AB(B^2 - A^2)x_0 y_0}{a^2(A^2 + B^2)^2} + \\ &+ \frac{(B^2 - A^2)^2 y_0^2 + 4A^2 B^2 x_0^2 + 4AB(B^2 - A^2)x_0 y_0}{a^2(A^2 + B^2)^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = \\ &= \frac{(A^2 + B^2)^2 x_0^2 + (A^2 + B^2)^2 y_0^2}{a^2(A^2 + B^2)^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = \frac{x_0^2 + y_0^2}{a^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1, \end{aligned}$$

deci punctul  $M'_0$  aparține elipsoidului, ceea ce înseamnă că planul  $\Pi$  este plan de simetrie al elipsoidului.

În mod analog, în cazul sferei se demonstrează că orice plan care trece prin originea coordonatelor este plan de simetrie și, în mod implicit, orice dreaptă care trece prin originea coordonatelor este axă de simetrie.  $\square$

În demersul nostru de a stabili forma elipsoidului, începem prin a determina curbele după care planele de simetrie îl intersectează:

**Proprietatea 3.** *Intersecțiile planelor de simetrie ale unui elipsoid cu elipsoidul sunt trei elipse reale.*

*Demonstrație* Intersecția elipsoidului cu planul  $xOy$  este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}.$$

Acestea sunt, în mod evident, ecuațiile unei elipse situate în planul  $xOy$ , de semiaxe  $a$  și  $b$ .

Intersecția elipsoidului cu planul  $yOz$  este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} .$$

Acestea sunt ecuațiile unei elipse situate în planul  $yOz$ , de semiaxe  $b$  și  $c$ .

Intersecția elipsoidului cu planul  $zOx$  este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} .$$

Acestea sunt ecuațiile unei elipse situate în planul  $zOx$ , de semiaxe  $a$  și  $c$ . □

(1) Vom studia acum intersecțiile elipsoidului cu plane de ecuații  $z = k$ , unde  $k$  este un număr real (plane paralele cu planul  $xOy$ ). Această intersecție este dată de ecuațiile

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ z = k \end{cases} \quad \text{sau} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2} \\ z = k \end{cases} .$$

Din același motiv ca la punctul (1), al doilea dintre sistemele de mai sus are soluție nevidă dacă și numai dacă  $1 - \frac{k^2}{c^2} \geq 0$ , adică dacă și numai dacă  $-c \leq k \leq c$ . Dacă  $k = \pm c$ , atunci intersecția se reduce la un punct. Este vorba de punctul  $(0, 0, c)$ , dacă avem  $k = c$ , respectiv punctul  $(0, 0, -c)$ , dacă avem  $k = -c$ . Remarcăm că aceste puncte sunt, de fapt, punctele în care axa  $Oz$ , de ecuații  $x = 0, y = 0$ , intersectează elipsoidul. Vom vedea că mai există patru puncte analoage, pe celelalte două axe de coordonate. Ele se numesc *vârfuri* ale elipsoidului.

Situația cu adevărat interesantă, care ne dă o primă idee relativ la forma elipsoidului (și care justifică denumirea) este cea în care  $-c < k < c$ . În acest caz, intersecția este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} = 1 \\ z = k \end{cases} ,$$

care, din moment ce numitorii sunt strict pozitivi, este, în mod evident, o elipsă, situată în planul  $z = k$ , de semiaxe egale, respectiv, cu  $a\sqrt{\left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)}$  și  $b\sqrt{\left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)}$ . Este clar că lungimile semiaxelor descresc pe măsură ce  $|k|$  crește. În particular, ele au valoarea maximă pentru cazul în care  $k = 0$ , adică pentru cazul în care planul de intersecție este chiar planul de coordonate  $xOy$ . Atunci ecuațiile elipsei de intersecție sunt

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases} .$$

- (2) Intersecțiile cu plane paralele cu planele de coordonate  $xOz$  și  $yOz$  sunt analoage și ne conduc la rezultate analoage.

### Planul tangent într-un punct al unui elipsoid

Considerăm elipsoidul (5.2.2) și un punct  $M(x_0, y_0, z_0)$  al său. Vom studia intersecția unei drepte oarecare ce trece prin  $M_0$  cu elipsoidul. Ecuațiile parametrice ale unei astfel de drepte sunt:

$$(\Delta) : \begin{cases} x = x_0 + l \cdot t, \\ y = y_0 + m \cdot t, \\ z = z_0 + n \cdot t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}. \quad (5.2.3)$$

$\mathbf{v}(l, m, n)$  este, desigur, vectorul director al dreptei  $\Delta$ . Pentru a determina punctele de intersecție dintre elipsoid și dreapta  $\Delta$ , înlocuim  $x, y, z$  din ecuațiile dreptei (5.2.3) în ecuația elipsoidului. Se obține:

$$\frac{(x_0 + lt)^2}{a^2} + \frac{(y_0 + mt)^2}{b^2} + \frac{(z_0 + nt)^2}{c^2} - 1 = 0$$

sau, după ce facem calculele și grupăm după puterile lui  $t$ ,

$$t^2 \left( b^2 c^2 l^2 + a^2 c^2 m^2 + a^2 b^2 n^2 \right) + 2t \left( b^2 c^2 x_0 l + a^2 c^2 y_0 m + a^2 b^2 z_0 n \right) + b^2 c^2 x_0^2 + a^2 c^2 y_0^2 + a^2 b^2 z_0^2 - a^2 b^2 c^2 = 0.$$

Termenul liber al ecuației de mai sus este egal cu zero, deoarece punctul coordonatele punctului  $M_0$  verifică ecuația elipsoidului. Ca atare, ecuația se transformă în

$$t^2 \left( b^2 c^2 l^2 + a^2 c^2 m^2 + a^2 b^2 n^2 \right) + 2t \left( b^2 c^2 x_0 l + a^2 c^2 y_0 m + a^2 b^2 z_0 n \right) = 0. \quad (5.2.4)$$

Această ecuație o vom numi *ecuație de intersecție* dintre elipsoid și dreapta  $\Delta$ . Este clar că ecuația de intersecție este, întotdeauna, de gradul al doilea și ea va admite două soluții reale, care corespund punctului  $M_0$  și celui de-al doilea punct de intersecție. Pentru ca dreapta să fie *tangentă* elipsoidului, este necesară (și suficientă) ca ecuația de intersecție să admită o soluție dublă (evident,  $t = 0$ ). Pentru aceasta, coeficientul termenului de gradul întâi în  $t$  din ecuația (5.2.4) trebuie să fie egal cu zero, adică

$$b^2c^2x_0l + a^2c^2y_0m + a^2b^2z_0n = 0. \quad (5.2.5)$$

Ecuația (5.2.5) are o interpretare geometrică remarcabilă. Considerăm vectorul

$$\mathbf{n} \left( b^2c^2x_0, a^2c^2y_0, a^2b^2z_0 \right).$$

Atunci ecuația (5.2.5) se poate scrie

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (5.2.6)$$

Semnificația acestei ecuații este aceea că *fiecare dreaptă care trece prin  $M_0$  și al cărui vector director verifică ecuația (5.2.5) este perpendiculară pe vectorul  $\mathbf{n}$* . Prin urmare, mulțimea acestor drepte prin  $M_0$ , tangente la elipsoid, formează un plan, *planul tangent la elipsoid în punctul  $M_0$* , care are vectorul normal  $\mathbf{n}$ . Prin urmare, ecuația planului tangent în  $M_0$  se scrie

$$b^2c^2x_0(x - x_0) + a^2c^2y_0(y - y_0) + a^2b^2z_0(z - z_0) = 0$$

sau

$$b^2c^2x_0x + a^2c^2y_0y + a^2b^2z_0z - b^2c^2x_0^2 - a^2c^2y_0^2 - a^2b^2z_0^2 = 0.$$

Din ecuația elipsei rezultă că termenul liber al ecuației de mai sus este egal cu  $-a^2b^2c^2$ , deci ecuația devine

$$b^2c^2x_0x + a^2c^2y_0y + a^2b^2z_0z - a^2b^2c^2 = 0$$

sau, după ce împărțim la  $a^2b^2c^2$ ,

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1. \quad (5.2.7)$$

Ecuația (5.2.7) se numește *ecuația planului tangent la elipsoid în punctul  $M_0$  de pe elipsoid, obținută prin dedublare*, pentru că se obține din ecuația elipsoidului, înlocuind pe  $x^2$  cu  $xx_0$ , pe  $y^2$  cu  $yy_0$  și pe  $z^2$  cu  $zz_0$ .



### 5.3 Conul de gradul al doilea

**Definiția 5.1.** Se numește *con de gradul al doilea* mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relative la un sistem ortonormat verifică o ecuație de forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (5.3.1)$$

unde  $a, b, c$  sunt numere reale strict pozitive.

Conul de gradul al doilea are aceleași simetrii ca și elipsoidul, ele fiind legate direct de faptul că în ecuația sa toate coordonatele apar exclusiv la puterea a doua:

- (1) trei plane de simetrie (planele de coordonate);
- (2) trei axe de simetrie (axele de coordonate);
- (3) un centru de simetrie (originea).

O proprietate remarcabilă a conului de gradul al doilea este aceea că *este o suprafață riglată*: prin fiecare punct al său trece o dreaptă (care se numește *generatoare* a conului).

Mai precis, *dacă*  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  *este un punct oarecare al conului, iar*  $O$  *este originea coordonatelor, atunci fiecare punct*  $M(x, y, z)$  *al dreptei*  $OM_0$  *se află pe con. Demonstrația acestei afirmații este foarte simplă. Într-adevăr, este foarte ușor de constatat*




Figura 5.2 – Conul de gradul al doilea

că ecuațiile parametrice ale dreptei  $OM_0$  sunt:

$$\begin{cases} x = x_0 \cdot t, \\ y = y_0 \cdot t, \\ z = z_0 \cdot t. \end{cases}$$

Dacă înlocuim în ecuația conului, obținem:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = t^2 \underbrace{\left( \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} \right)}_{=0} = 0,$$

deci punctele dreptei verifică, într-adevăr, ecuația conului.

Datorită proprietății de mai sus se spune că  $O$  este vârful conului.

### Intersecții cu plane paralele cu planele de coordonate

Utilizăm, și în cazul conului de gradul al doilea, această metodă de a identifica forma suprafeței.

- (1) *Plane paralele cu  $xOy$ .* Un astfel de plan are, în mod evident, ecuația de forma  $z = k$ , unde  $k$  este o constantă reală. O astfel de intersecție este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \\ z = k \end{cases} \quad \text{sau} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2} \\ z = k \end{cases} .$$

În cazul în care  $k \neq 0$ , al doilea sistem de ecuații se poate rescrie sub forma

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2 k^2 / c^2} + \frac{y^2}{b^2 k^2 / c^2} = 1 \\ z = k \end{cases} .$$

Evident, aceste ecuații descriu o elipsă de semiaxe  $\frac{a|k|}{c}$  și  $\frac{b|k|}{c}$ , situată în planul  $z = k$ .

Dacă, pe de altă parte,  $k = 0$  (adică intersecția se face cu planul  $xOy$ ), atunci sistemul de ecuații de intersecție se reduce la

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \\ z = 0 \end{cases} ,$$

iar acest sistem este verificat de un singur punct (originea, adică vârful conului).

- (2) *Intersecții cu plane paralele cu planul xOz.* În acest caz, sistemul de ecuații care ne dă punctele de intersecție se scrie

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \end{cases}$$

ceea ce ne conduce la

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{h^2}{b^2}. \end{cases} \quad (5.3.2)$$

Ecuațiile (5.3.2) reprezintă, dacă  $h \neq 0$ , ecuațiile unei hiperbole situate în planul  $y = h$ , de semiaxe  $\frac{a|h|}{b}$  (pe axa paralelă cu Ox), respectiv  $\frac{c|h|}{b}$  (pe axa paralelă cu Oz). Este de remarcat că axa paralelă cu Oz este cea care intersectează hiperbola, în timp ce axa paralelă cu Ox nu o intersectează.

Pe de altă parte, dacă  $h = 0$ , aceleași ecuații reprezintă o pereche de drepte (generatoare ale conului), de ecuații

$$\begin{cases} y = 0, \\ \frac{z}{c} - \frac{x}{a} = 0, \end{cases} \quad \text{respectiv} \quad \begin{cases} y = 0, \\ \frac{z}{c} + \frac{x}{a} = 0. \end{cases}$$

- (3) *Intersecția cu plane paralele cu planul yOz.* – Este perfect analogă cu cazul precedent.

*Observație.* Se poate demonstra că, utilizând plane care nu sunt neapărat oarelele cu planele de coordonate, prin secțiunile plane ale conului de gradul al doilea se pot obține toate conicele. De fapt, acesta este motivul pentru care conicele se mai numesc și *secțiuni conice*.

**Planul tangent într-un punct al conului de gradul al doilea.** Ecuația planului tangent într-un punct  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  al conului de gradul al doilea se obține prin dedublare, ca și în cazul elipsoidului, așa că nu vom mai repeta raționamentul. Prin urmare, ecuația planului tangent în  $M_0$  este

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = 0. \quad (5.3.3)$$

O proprietate remarcabilă a planului tangent într-un punct al conului este aceea că el conține generatoarea care trece prin acel punct. Într-adevăr, neneratoarea care trece prin

$M_0(x_0, y_0, z_0)$  are ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = x_0 t, \\ y = y_0 t, \\ z = z_0 t. \end{cases}$$

Dacă înlocuim în membrul stâng al ecuației planului tangent, obținem

$$\frac{x_0^2 t}{a^2} + \frac{y_0^2 t}{b^2} - \frac{z_0^2 t}{c^2} = t \left( \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} \right) = 0,$$

ceea ce înseamnă că, într-adevăr, planul tangent conține generatoarea rectilinie a conului care trece prin punctul de tangență.

**Con de rotație.** În cazul în care  $a = b$ , ecuația conului devine

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

De data aceasta, secțiunile cu plane paralele cu planul  $xOy$  sunt cercuri. Conurile de acest tip se numesc *conuri de rotație*. Vom vedea mai târziu că suprafețele de acest tip se pot obține prin rotirea unei drepte care trece prin origine în jurul axei  $Oz$ .

## 5.4 Hiperboloidul cu o pânză.

**Definiția 5.2.** Se numește *hiperboloid cu o pânză* locul geometric al punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem rectangular verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (5.4.1)$$

une  $a, b, c$  sunt numere reale strict pozitive, care se numesc *semiaxele* hiperboloidului.

Simetriile hiperboloidului cu o pânză sunt aceleași cu cele ale elipsoidului, prin urmare nu le vom mai descrie. Ne ocupăm, însă, de intersecțiile sale cu plane paralele cu planele de coordonate.

(1) *Plane paralele cu planul  $xOy$ .* În acest caz, avem de studiat sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$




Figura 5.3 – Hiperboloidul cu o pânză

ceea ce ne conduce la

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} + 1. \end{cases}$$

Cum membrul drept este întotdeauna strict pozitiv, ecuațiile se pot rescrie ca

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}\right)^2} = 1. \end{cases}$$

Acestea sunt ecuațiile unei elipse de semiaxe  $a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}$  și  $b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}$ , pentru orice valori ale lui  $h$ . Un caz particular important este cel în care  $h = 0$  (adică suntem în planul de coordonate  $xOy$ ). Elipsa care se obține (de semiaxe minime!) se numește *elipsă de stricțiune* sau de *gâtuire*.

(2) *Plane paralele cu planul  $xOz$ .* În acest caz, curba de intersecție are ecuațiile

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$

adică

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{b^2}. \end{cases} \quad (5.4.2)$$

Aici avem trei situații de analizat:

(a) Dacă  $1 - \frac{h^2}{c^2} < 0$ , adică  $h^2 > c^2$ , atunci sistemul (5.4.2) se poate scrie sub forma

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{h^2}{b^2} - 1 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{z^2}{\left(c\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}\right)^2} - \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

adică avem de-a face cu o hiperbolă de semiaxe  $c\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}$  și  $a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}$ , situată într-un plan paralel cu planul  $xOz$ , la care axa care intersectează hiperbola este paralelă cu axa  $Oz$ , iar cealaltă axă este paralelă cu axa  $Ox$ .

(b) Dacă  $1 - \frac{h^2}{c^2} = 0$ , adică  $h = \pm c$ , atunci sistemul (5.4.2) se poate scrie sub forma

$$\begin{cases} y = \pm c, \\ \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 0 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = \pm c, \\ \left(\frac{z}{c} - \frac{x}{a}\right) \left(\frac{z}{c} + \frac{x}{a}\right) = 0. \end{cases} \quad (5.4.3)$$

Pentru fiecare valoare a lui  $h$  ( $c$  sau  $-c$ ) ecuația de mai sus reprezintă o pereche de drepte. Pentru  $h = c$ , obținem

$$\begin{cases} y = c, \\ \frac{z}{c} - \frac{x}{a} = 0 \end{cases} \quad \text{sau} \quad \begin{cases} y = c, \\ \frac{z}{c} + \frac{x}{a} = 0, \end{cases}$$

în timp ce pentru  $h = -c$ , obținem

$$\begin{cases} y = -c, \\ \frac{z}{c} - \frac{x}{a} = 0 \end{cases} \quad \text{sau} \quad \begin{cases} y = -c, \\ \frac{z}{c} + \frac{x}{a} = 0. \end{cases}$$

(c) Dacă  $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$ , adică  $h^2 < c^2$ , atunci sistemul (5.4.2) se poate scrie sub forma

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{\left(a\sqrt{1-\frac{h^2}{b^2}}\right)^2} - \frac{z^2}{\left(c\sqrt{1-\frac{h^2}{b^2}}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

adică avem de-a face cu o hiperbolă de semiaxe  $a\sqrt{1-\frac{h^2}{b^2}}$  și  $c\sqrt{1-\frac{h^2}{b^2}}$ , situată într-un plan paralel cu planul  $xOz$ , la care axa care intersectează hiperbola este paralelă cu axa  $Ox$ , iar cealaltă axă este paralelă cu axa  $Oz$ .

(3) *Plane paralele cu planul  $yOz$ .* Acest caz este perfect analog cu cazul precedent.

**Generatoarele rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză.** După cum am văzut mai sus, pe hiperboloidul cu o pânză există linii drepte. Patru dintre ele au fost găsite mai devreme, ca intersecții dintre planele  $xOz$  și  $yOz$  cu suprafața. Pe suprafață, însă, există mult mai multe drepte. Practic, prin fiecare punct al suprafeței trece câte o pereche de drepte, conținute în întregime pe suprafață. Aceste drepte se numesc *generatoare rectilinii* ale hiperboloidului cu o pânză.

Pentru a ne convinge de acest fapt, rescriem ecuația hiperboloidului cu o pânză sub forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2},$$

ecuație care se mai poate scrie și sub forma

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \left(1 - \frac{y}{b}\right) \left(1 + \frac{y}{b}\right).$$

Considerăm acum sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \lambda \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \mu \left(1 - \frac{y}{b}\right), \\ \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \lambda \left(1 + \frac{y}{b}\right), \end{cases} \quad (5.4.4)$$

unde  $\lambda$  și  $\mu$  sunt două numere reale care nu se anulează simultan.

Întrucât, după cum am spus, cei doi parametri nu se anulează simultan, sistemul (5.4.4) reprezintă o dreaptă. Dacă înmulțim membru cu membru cele două ecuații ale sistemului obținem fie  $0 = 0$ , dacă unul dintre parametri se anulează, fie ecuația hiperboloidului

cu o pânză. Aceasta înseamnă că dreapta (5.4.4) se află pe hiperboloid. Dacă lăsăm cei doi parametri să varieze, obținem o familie de drepte, care formează *prima familie de generatoare rectilinii ale hiperboloidului*.

Cea de-a doua familie de generatoare rectilinii se obține în același mod, identificând în mod diferit factorii de gradul întâi. Ea are ecuațiile

$$\begin{cases} \alpha \left( \frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = \beta \left( 1 + \frac{y}{b} \right), \\ \beta \left( \frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) = \alpha \left( 1 - \frac{y}{b} \right), \end{cases} \quad (5.4.5)$$

unde  $\alpha$  și  $\beta$  sunt, din nou, parametri reali care nu se anulează simultan.

## 5.5 Hiperboloidul cu două pânze

**Definiția 5.3.** Se numește *hiperboloid cu două pânze* locul geometric al punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem de coordonate ortogonal, verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \quad (5.5.1)$$

unde  $a, b, c$  sunt constante reale strict pozitive.




Figura 5.4 – Hiperboloidul cu două pânze

**Forma hiperboloidului cu două pânze.** *Simetriile* sunt aceleași ca și în cazul elipsoidului, așa că trecem direct la studiul intersecțiilor cu plane paralele cu planele de coordonate.



(1) *Intersecții cu plane paralele cu planul xOy.* Avem de studiat soluțiile sistemului de ecuații

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1. \end{cases} \quad (5.5.2)$$

Avem de analizat trei cazuri:

- (a) Dacă  $\frac{h^2}{c^2} - 1 < 0$ , adică  $-c < h < c$ , atunci sistemul (5.5.2) nu admite soluții, deci planul și suprafața nu se intersectează.
- (b) Dacă  $\frac{h^2}{c^2} - 1 = 0$ , adică  $h = \pm c$ , sistemul are o singură soluție pentru fiecare valoare a lui  $h$  ( $c$  sau  $-c$ ). În acest caz, planul este, de fapt, tangent la suprafață (în punctul  $(0, 0, c)$ , respectiv în punctul  $(0, 0, -c)$ ).
- (c) Dacă  $\frac{h^2}{c^2} - 1 > 0$ , adică  $|h| > c$ , atunci sistemul (5.5.2) este echivalent cu sistemul

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

care reprezintă ecuațiile unei elipse de semiaxe  $a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$  și  $b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ , situată în planul  $z = h$ .

(2) *Intersecții cu plane paralele cu planul xOz.* De data aceasta avem de studiat soluțiile sistemului de ecuații

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 - \frac{h^2}{b^2}. \end{cases} \quad (5.5.3)$$

Acest sistem este echivalent cu sistemul

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{h^2}{b^2}, \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{z^2}{\left(c\sqrt{\frac{h^2}{b^2} + 1}\right)^2} - \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} + 1}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

care reprezintă, indiferent de valoarea lui  $h$ , ecuațiile unei hiperbole de semiaxe  $c\sqrt{\frac{h^2}{b^2} + 1}$  și  $a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} + 1}$ , situată în planul  $y = h$ , astfel încât axa hiperbolei care intersectează curba este paralelă cu axa  $Oz$ , iar cealaltă axă este paralelă cu axa  $Ox$ .

- (3) *Intersecții cu plane paralele cu planul  $yOz$ .* Situația este perfect analogă cu cea discutată la punctul precedent.

**Hiperboloidul cu două pânze de rotație.** Dacă  $a = b$ , ecuația hiperboloidului cu două pânze se scrie

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

Acest tip particular de hiperboloid se numește *hiperboloid cu două pânze de rotație*, deoarece, după cum vom vedea în capitolul următor, el se poate obține prin rotirea unei hiperbole în jurul axei  $Oz$ . Este de remarcat că, în cazul hiperboloizilor cu două pânze de rotație, *orice plan care trece prin axa  $Oz$  este plan de simetrie al hiperboloidului.*

**Planul tangent într-un punct al hiperboloidului cu două pânze.** Dacă  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  este un punct oarecare al hiperboloidului cu două pânze, se poate arăta, exact ca în cazul elipsoidului, că ecuația planului tangent în  $M_0$  la hiperboloid va fi

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = -1,$$

adică ea se poate obține prin dedublarea ecuației hiperboloidului cu două pânze.

## 5.6 Paraboloidul eliptic

**Definiția 5.4.** Se numește *paraboloid eliptic* mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem cartezian de coordonate verifică o ecuație de forma

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \quad (5.6.1)$$

unde  $p$  și  $q$  sunt numere reale strict pozitive, care se numesc *parametrii paraboloidului eliptic*.




Figura 5.5 – Paraboloidul eliptic

**Forma paraboloidului eliptic.** *Simetriile* paraboloidului eliptic nu sunt atât de numeroase ca în cazul cuadricelor studiate până acum. Astfel, el are:

- (1) două plane de simetrie ( $yOz$  și  $xOz$ , deoarece coordonatele  $x$  și  $z$  apar doar la puterea a doua);
- (2) o axă de simetrie, axa  $Oz$ , ca intersecție a celor două plane de simetrie.

Mai departe, ca și mai înainte, vom studia intersecția dintre paraboloidul eliptic și plane paralele cu cele trei plane de coordonate.

- (1) *Intersecții cu plane paralele cu planul  $xOy$ .* Avem de studiat soluțiile sistemului

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h. \end{cases} \quad (5.6.2)$$

Avem trei situații de examinat:

- (a) Dacă  $h < 0$ , atunci sistemul (5.6.2) nu admite soluții, adică planul și suprafața nu au puncte comune.
- (b) Dacă  $h = 0$ , atunci sistemul (5.6.2) admite o soluție unică,  $(0, 0, 0)$ , adică originea. În fapt, aceasta înseamnă că planul de coordonate  $xOy$  este tangent la paraboloidul hiperbolic în originea coordonatelor.
- (c) Dacă  $h > 0$ , sistemul (5.6.2) se poate scrie

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{(\sqrt{2ph})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2qh})^2} = 1, \end{cases}$$

ceea ce reprezintă ecuațiile unei elipse, situată în planul  $z = h$ , de semiaxe  $\sqrt{2ph}$  și  $\sqrt{2qh}$ .

- (2) *Intersecții cu plane paralele cu planul  $xOz$ .* De data aceasta, avem de studiat sistemul

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ x^2 = 2pz - \frac{ph^2}{q}, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile unei parabole de parametru  $p$ , situată în planul  $y = h$ .

- (3) *Intersecții cu plane paralele cu planul  $yOz$ .* Avem de studiat soluțiile sistemului

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} x = h, \\ y^2 = 2qz - \frac{qh^2}{p}, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile unei parabole de parametru  $q$ , situată în planul  $x = h$ .

**Paraboloidul eliptic de rotație.** Dacă cei doi parametri ai paraboloidului sunt egali,  $p = q$ , atunci ecuația suprafeței devine

$$\frac{x^2 + y^2}{p} = 2z$$

sau

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

Acest paraboloid particular se numește *paraboloid eliptic de rotație*. Suprafața se poate obține, într-adevăr, prin rotirea unei parabole în jurul axei  $Oz$ , așa cum vom vedea mai târziu.

**Planul tangent într-un punct al paraboloidului eliptic.** Fie  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  un punct oarecare al paraboloidului eliptic (5.6.1). Studiem mai întâi intersecția dintre paraboloid și o dreaptă oarecare ce trece prin punctul  $M_0$ . Ecuațiile parametrice ale unei astfel de drepte se pot scrie:

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases}$$

Înlocuind în ecuația paraboloidului, obținem:

$$\frac{(x_0 + lt)^2}{p} + \frac{(y_0 + mt)^2}{q} = 2(z_0 + nt)$$

sau

$$q(x_0 + lt)^2 + p(y_0 + mt)^2 - 2pq(z_0 + nt) = 0.$$

După ce facem calculele și grupăm după puterile lui  $t$ , ecuația de mai sus se transformă în:

$$t^2(ql^2 + pm^2) + 2t(qx_0l + py_0m - pqn) + qx_0^2 + py_0^2 - 2pqz_0 = 0.$$

Termenul liber este egal cu zero, deoarece  $M_0$  se află pe paraboloid, deci ecuația de intersecție devine

$$t^2(ql^2 + pm^2) + 2t(qx_0l + py_0m - pqn) = 0. \quad (5.6.3)$$

Pentru ca dreapta și paraboloidul să aibă un singur punct (dublu) în comun, ecuația de intersecție (5.6.3) trebuie să aibă soluție dublă. Dar o soluție este, întotdeauna,  $t = 0$ , prin urmare și a doua soluție trebuie să fie zero, ceea ce este posibil doar dacă termenul de gradul întâi în  $t$  dispare, adică dacă avem

$$qx_0l + py_0m - pqn = 0. \quad (5.6.4)$$

Dacă punem  $\mathbf{n}$  este vectorul de componente  $(qx_0, py_0, -pq)$ , iar  $\mathbf{v}(l, m, n)$  este vectorul director al dreptei, atunci ecuația (5.6.4) este echivalentă cu  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$ , adică *orice dreaptă care trece prin  $M_0$ , iar vectorul său director verifică ecuația (5.6.4) este perpendiculară pe vectorul  $\mathbf{n}$* . Dar aceasta nu înseamnă altceva decât că  $\mathbf{n}$  este vectorul normal la planul tangent la paraboloidul eliptic în punctul  $M_0$ . Ca atare, ecuația planului tangent în  $M_0$  este:

$$qx_0(x - x_0) + py_0(y - y_0) - pq(z - z_0) = 0$$

sau

$$qx_0x + py_0y - pqz - qx_0^2 - py_0^2 + pqz_0 = 0$$

sau, încă,

$$qx_0x + py_0y - pqz - pqz_0 - (qx_0^2 - py_0^2 + 2pqz_0) = 0.$$

Termenul din paranteză din ecuația de mai sus este egal cu zero, din nou, pentru că  $M_0$  se află pe paraboloid, deci ecuația devine:

$$qx_0x + py_0y = pq(z + z_0)$$

sau, dacă împărțim prin  $pq$ ,

$$\frac{xx_0}{p} + \frac{yy_0}{q} = p(z + z_0). \quad (5.6.5)$$

Este de remarcat că, și în cazul paraboloidului eliptic, ca și în cazul celorlalte quadrice studiate până acum ecuația planului tangent se obține din ecuația paraboloidului (5.6.1) prin *dedublare*. Diferența este că de data aceasta apar și termeni de gradul întâi. Regulile de dedublare sunt, deci:

- $x^2$  și  $y^2$  se înlocuiesc cu  $xx_0$  (respectiv  $yy_0$ );
- $x$  se înlocuiește cu  $(z + z_0)/2$ .

## 5.7 Paraboloidul hiperbolic

**Definiția 5.5.** Se numește *paraboloid hiperbolic* mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem cartezian de coordonate verifică o ecuație de forma

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \quad (5.7.1)$$

unde  $p$  și  $q$  sunt numere reale strict pozitive, care se numesc *parametrii paraboloidului hiperbolic*.




Figura 5.6 – Paraboloidul hiperbolic

**Forma paraboloidului hiperbolic.** *Simetriile* paraboloidului hiperbolic sunt aceleași cu cele ale paraboloidului eliptic:

- (1) două plane de simetrie ( $yOz$  și  $xOz$ , deoarece coordonatele  $x$  și  $z$  apar doar la puterea a doua);
- (2) o axă de simetrie, axa  $Oz$ , ca intersecție a celor două plane de simetrie.

Mai departe, vom studia intersecția dintre paraboloidul hiperbolic și plane paralele cu cele trei plane de coordonate.

- (1) *Intersecții cu plane paralele cu planul  $xOy$ .* Avem de studiat soluțiile sistemului

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h. \end{cases} \quad (5.7.2)$$

Avem trei situații de examinat:

(a) Dacă  $h < 0$ , atunci  $-h > 0$ , iar sistemul (5.7.2) se poate rescrie sub forma

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{y^2}{(\sqrt{-2qh})^2} - \frac{x^2}{(\sqrt{-2ph})^2} = 1, \end{cases}$$

ceea ce reprezintă ecuațiile unei hiperbole de semiaxe  $\sqrt{-2qh}$  și  $\sqrt{-2ph}$ , situată în planul  $z = h$ , astfel încât semiaxa care intersectează hiperbola este paralelă cu axa  $Oy$ , iar cealaltă semieaxă este paralelă cu axa  $Ox$ .

(b) Dacă  $h = 0$ , atunci sistemul (5.7.2) devine

$$\begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0. \end{cases}$$

Acestea sunt ecuațiile unei perechi de drepte concurente, situate în planul  $xOy$ , care trec prin origine:

$$\begin{cases} z = 0, \\ \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \end{cases} \quad \text{respectiv} \quad \begin{cases} z = 0, \\ \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0. \end{cases}$$

(c) Dacă  $h > 0$ , sistemul (5.7.2) se poate scrie

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{(\sqrt{2ph})^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{2qh})^2} = 1, \end{cases}$$

ceea ce reprezintă ecuațiile unei hiperbole de semiaxe  $\sqrt{2ph}$  și  $\sqrt{2qh}$ , situată în planul  $z = h$ , astfel încât semiaxa care intersectează hiperbola este paralelă cu axa  $Ox$ , iar cealaltă semieaxă este paralelă cu axa  $Oy$ .



(2) *Intersecții cu plane paralele cu planul xOz.* De data aceasta, avem de studiat sistemul

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ x^2 = 2pz + \frac{ph^2}{q}, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile unei parabole de parametru  $p$ , situată în planul  $y = h$ .

(3) *Intersecții cu plane paralele cu planul yOz.* Avem de studiat soluțiile sistemului

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} x = h, \\ y^2 = -2qz + \frac{qh^2}{p}, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile unei parabole de parametru  $q$ , situată în planul  $x = h$ .

**Generatoarele rectilinii ale paraboloidului hiperbolic.** Paraboloidul hiperbolic are o importantă trăsătură comună cu hiperboloidul cu o pânză: pe ambele există două familii de drepte, câte o pereche de drepte prin fiecare punct al paraboloidului. Pentru a determina ecuațiile acestor familii de drepte, numite *generatoare rectilinii ale paraboloidului hiperbolic*, procedăm ca și în cazul hiperboloidului cu o pânză.

Rescriem, mai întâi, ecuația paraboloidului hiperbolic sub forma

$$\left( \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) \cdot \left( \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 2z \cdot 1.$$

Pornind de la această ecuație, putem obține o familie de drepte:

$$\begin{cases} \lambda \left( \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 2\mu z, \\ \mu \left( \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = \lambda, \end{cases} \quad (5.7.3)$$

unde  $\lambda$  și  $\mu$  sunt doi parametri reali, care nu se anulează simultan. Dacă înmulțim membru cu membru cele două ecuații din sistemul (5.7.3), obținem fie  $0 = 0$ , dacă unul dintre parametri se anulează, fie ecuația paraboloidului hiperbolic, ceea ce înseamnă că dreapta se află pe paraboloid, pentru orice valori acceptabile ale celor doi parametri<sup>1</sup>.

Exact în același mod se demonstrează că dreptele

$$\begin{cases} \alpha \left( \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 2\beta z, \\ \beta \left( \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = \alpha, \end{cases} \quad (5.7.4)$$

unde  $\alpha$  și  $\beta$  sunt doi parametri reali, care nu se anulează simultan, sunt situate pe paraboloidul hiperbolic (5.7.1).

Se poate demonstra că prin fiecare punct al hiperboloidului trece exact o pereche de generatoare rectilinii, câte una din fiecare familie.

**Planul tangent într-un punct al paraboloidului hiperbolic.** Se poate arăta ușor, ca în cazul paraboloidului eliptic, că ecuația planului tangent la paraboloid într-un punct  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  al său se poate obține prin dedublare, plecând de la ecuația suprafeței, adică ecuația planului tangent este

$$\frac{xx_0}{p} - \frac{yy_0}{q} = z + z_0. \quad (5.7.5)$$

## 5.8 Cilindrul eliptic

**Definiția 5.6.** Se numește *cilindru eliptic* locul geometric al punctelor din spațiu ale căror coordonate față de un sistem ortogonal de coordonate verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (5.8.1)$$

unde  $a, b$  sunt două numere reale strict pozitive, numite *semiaxele cilindrului eliptic*.

**Forma cilindrului eliptic.** Începem prin a examina simetriile cilindrului. Este clar, înainte de toate, că cilindrul admitiv admite toate simetriile elipsoidului și hiperboloidelor:

- trei plane de simetrie (planele de coordonate);

<sup>1</sup>“acceptabil” înseamnă că  $\lambda^2 + \mu^2 \neq 0$ .




Figura 5.7 – Cilindrul eliptic

- trei axe de simetrie (axele de coordonate);
- un centru de simetrie (originea).

În plus, deoarece ecuația cilindrului nu conține coordonata  $z$ , cilindrul eliptic mai are o familie de plane de simetrie (toate planele paralele cu planul  $xOy$ ) și două familii de axe de simetrie:

- orice dreaptă care este paralelă cu axa  $Ox$  și intersectează axa  $Oz$ ;
- orice dreaptă care este paralelă cu axa  $Oy$  și intersectează axa  $Oz$ .

Mai mult, orice punct de pe axa  $Oz$  este un centru de simetrie.

Ne ocupăm, acum, de intersecțiile cu plane paralele cu planele de coordonate.

(1) *Plane paralele cu planul  $xOz$ .* Avem de analizat sistemul

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$$

ceea ce reprezintă, pentru orice  $h$  real, ecuațiile unei elipse situate în planul  $z = h$ , de semiaxe egale cu  $a$  și  $b$ .

(2) *Plane paralele cu planul  $xOy$ .* De data asta, sistemul de studiat este

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ x^2 = a^2 \left( 1 - \frac{h^2}{b^2} \right). \end{cases} \quad (5.8.2)$$

Aici avem trei situații de examinat.

- (a) Dacă  $1 - \frac{h^2}{c^2} < 0$ , adică  $h^2 > b^2$ , atunci sistemul (5.8.2) nu admite soluții, ceea ce înseamnă că planul și cilindrul nu se intersectează.
- (b) Dacă  $1 - \frac{h^2}{c^2} = 0$ , adică  $h = \pm b$ , atunci sistemul (5.8.2) se reduce la

$$\begin{cases} y = \pm b, \\ x = 0, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile unei drepte paralele cu Oz (e clar, câte o dreaptă pentru fiecare valoare a lui  $h$  ( $c$  sau  $-c$ )).

- (c) Dacă  $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$ , adică  $h^2 < b^2$ , atunci sistemul (5.8.2) se reduce la

$$\begin{cases} y = h, \\ x = \pm a \sqrt{\left( 1 - \frac{h^2}{b^2} \right)}, \end{cases}$$

adică obținem câte o pereche de drepte (paralele cu Oz și de data aceasta) pentru fiecare valoare admisibilă a lui  $h$

- (3) *Plane paralele cu planul  $yOz$ .* Analiza este perfect analoagă cu cea de la punctul precedent.

*Observație.* Cilindrul eliptic este o așa numită *suprafață cilindrică*, generată de o familie de drepte paralele cu o dreaptă dată (axa Oz, în cazul nostru), numite *generatoare* și care intersectează o curbă dată. În cazul nostru, acea curbă dată poate fi aleasă să fie oricare dintre elipsele (egale) care se obțin prin intersecții cu planul  $xOy$ .

**Cilindrul eliptic de rotație (cilindrul circular).** Dacă cele două semiaxe ale cilindrului sunt egale,  $a = b$ , atunci ecuația cilindrului se poate scrie

$$x^2 + y^2 = a^2.$$

Această suprafață se numește *cilindru de rotație sau circular* de rază  $a$  și se poate obține prin rotirea oricăreia dintre generatoarele sale în jurul axei Oz.

**Planul tangent într-un punct al cilindrului eliptic.** Fie  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  un punct oarecare al cilindrului eliptic (5.8.1). Vom studia, ca de obicei, condiția ca o dreaptă care trece prin  $M_0$  să fie tangentă cilindrului. Ne reamintim că ecuațiile unei drepte oarecare prin  $M_0$  sunt:

$$(\Delta) \begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases}$$

Dacă înlocuim în ecuația cilindrului, obținem:

$$\frac{(x_0 + lt)^2}{a^2} + \frac{(y_0 + mt)^2}{b^2} = 1$$

sau

$$b^2(x_0 + lt)^2 + a^2(y_0 + mt)^2 - a^2b^2 = 0.$$

După efectuarea calculelor, obținem ecuația

$$t^2(b^2l^2 + a^2m^2) + 2t(b^2x_0l + a^2y_0m) + b^2x_0^2 + a^2y_0^2 - a^2b^2 = 0.$$

Cum  $M_0$  aparține cilindrului, termenul liber este egal cu zero, deci ecuația de intersecție se reduce la

$$t^2(b^2l^2 + a^2m^2) + 2t(b^2x_0l + a^2y_0m) = 0. \quad (5.8.3)$$

Pentru ca dreapta și cilindrul să aibă un singur punct (dublu) în comun, ecuația de intersecție (5.8.3) trebuie să aibă soluție dublă. Dar o soluție este, întotdeauna,  $t = 0$ , prin urmare și a doua soluție trebuie să fie zero, ceea ce este posibil doar dacă termenul de gradul întâi în  $t$  dispăre, adică dacă avem

$$b^2x_0l + a^2y_0m = 0. \quad (5.8.4)$$

Dacă  $\mathbf{n}$  este vectorul de componente  $(b^2x_0, a^2y_0, 0)$ , iar  $\mathbf{v}(l, m, n)$  este vectorul director al dreptei, atunci ecuația (5.8.4) este echivalentă cu  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$ , adică *orice dreaptă care trece prin  $M_0$ , iar vectorul său director verifică ecuația (5.8.4) este perpendiculară pe vectorul  $\mathbf{n}$ .* Dar aceasta nu înseamnă altceva decât că  $\mathbf{n}$  este vectorul normal la planul tangent la cilindrul eliptic în punctul  $M_0$ . Ca atare, ecuația planului tangent în  $M_0$  este:

$$b^2x_0(x - x_0) + a^2y_0(y - y_0) = 0$$

sau, după ce facem calculele și ținem cont, încă o dată, de faptul că  $M_0$  aparține cilindrului,

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1, \quad (5.8.5)$$

adică, și de data aceasta, ecuația planului tangent se poate obține prin dedublare, plecând de la ecuația cilindrului eliptic.

## 5.9 Cilindrul hiperbolic

**Definiția 5.7.** Se numește *cilindru hiperbolic* locul geometric al punctelor din spațiu ale căror coordonate față de un sistem ortogonal de coordonate verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (5.9.1)$$

unde  $a, b$  sunt două numere reale strict pozitive, numite *semiaxele cilindrului hiperbolic*.




Figura 5.8 – Cilindrul hiperbolic

**Forma cilindrului .** Simetriile cilindrului hiperbolic sunt aceleași cu simetriile cilindrului eliptic, așa că nu le vom mai discuta încă o dată.

Ne ocupăm, acum, de intersecțiile cu plane paralele cu planele de coordonate.

(1) *Plane paralele cu planul  $xOz$ .* Avem de analizat sistemul

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$$

ceea ce reprezintă, pentru orice  $h$  real, ecuațiile unei hiperbole situate în planul  $z = h$ , de semiaxe egale cu  $a$  și  $b$ .

(2) *Plane paralele cu planul  $xOz$ .* De data asta, sistemul de studiat este

$$\begin{cases} y = h, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ x^2 = a^2 \left( 1 + \frac{h^2}{b^2} \right). \end{cases} \quad (5.9.2)$$

ceea ce reprezintă, pentru fiecare  $h$  real, o pereche de drepte distincte

$$\begin{cases} y = h, \\ x = \pm a \sqrt{1 + \frac{h^2}{b^2}}. \end{cases}$$

(3) *Plane paralele cu planul  $yOz$ .* Sistemul care ne dă intersecția este, acum,

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ y^2 = b^2 \left( \frac{h^2}{a^2} - 1 \right). \end{cases} \quad (5.9.3)$$

Aici avem trei situații de examinat.

- (a) Dacă  $\frac{h^2}{a^2} - 1 < 0$ , adică  $h^2 < a^2$ , atunci sistemul (5.9.3) nu admite soluții, ceea ce înseamnă că planul și cilindrul nu se intersectează.
- (b) Dacă  $\frac{h^2}{a^2} = 0$ , adică  $h = \pm a$ , atunci sistemul (5.9.3) se reduce la

$$\begin{cases} x = \pm a, \\ y = 0, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile unei drepte paralele cu  $Oz$  (e clar, câte o dreaptă pentru fiecare valoare a lui  $h$  ( $a$  sau  $-a$ )).

- (c) Dacă  $\frac{h^2}{a^2} - 1 > 0$ , adică  $h^2 > a^2$ , atunci sistemul (5.9.3) se reduce la

$$\begin{cases} x = h, \\ y = \pm b \sqrt{\left( \frac{h^2}{a^2} - 1 \right)}, \end{cases}$$

adică obținem câte o pereche de drepte (paralele cu  $Oz$  și de data aceasta) pentru fiecare valoare admisibilă a lui  $h$

*Observație.* Cilindrul hiperbolic este, ca și cilindrul eliptic, o *suprafață cilindrică*, generată de o familie de drepte paralele cu o dreaptă dată (axa Oz, în cazul nostru), numite *generatoare* și care intersectează o curbă dată. În cazul nostru, acea curbă dată poate fi aleasă să fie oricare dintre hiperbolele (egale) care se obțin prin intersecții cu planul xOy.

**Planul tangent într-un punct al cilindrului hiperbolic.** Exact ca și în cazul cilindrului eliptic, se demonstrează că planul tangent într-un punct  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  al cilindrului hiperbolic se poate obține plecând de la ecuația suprafeței, prin dedublare, adică ecuația planului tangent este

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (5.9.4)$$

## 5.10 Cilindrul parabolic

**Definiția 5.8.** Se numește *cilindru parabolic* locul geometric al punctelor din spațiu ale căror coordonate față de un sistem ortogonal de coordonate verifică ecuația

$$y^2 = 2px, \quad (5.10.1)$$

unde  $p$  este un număr real strict pozitiv, numit *parametrul cilindrului parabolic*.




Figura 5.9 – Cilindrul parabolic

**Forma cilindrului parabolic.** Cilindrul parabolic (5.10.1) este simetric relativ la:

- planul yOz;
- planul xOy și orice plan paralel cu el;



- axa  $Oy$  și orice dreaptă paralelă cu ea care intersectează axa  $Oz$ .

Ne ocupăm, acum, de intersecțiile cu plane paralele cu planele de coordonate.

(1) *Plane paralele cu planul  $xOy$ .* Avem de analizat sistemul

$$\begin{cases} z = h, \\ y^2 = 2px, \end{cases}$$

ceea ce reprezintă, pentru orice  $h$  real, ecuațiile unei parabole de parametru  $p$ , situată în planul  $z = h$ .

(2) *Plane paralele cu planul  $xOz$ .* De data asta, sistemul de studiat este

$$\begin{cases} y = h, \\ y^2 = 2px \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} y = h, \\ x = \frac{h^2}{2p}. \end{cases} \quad (5.10.2)$$

Ecuația (5.10.2) reprezintă o dreaptă paralelă cu axa  $Oz$ , pentru orice valoare a lui  $h$ . *Plane paralele cu planul  $yOz$ .* Avem de investigat sistemul

$$\begin{cases} x = h, \\ y^2 = 2px \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} x = h, \\ y^2 = 2ph. \end{cases} \quad (5.10.3)$$

Aici avem trei situații de examinat.

- Dacă  $h < 0$ , atunci sistemul (5.10.3) nu admite soluții, ceea ce înseamnă că planul și cilindrul nu se intersectează.
- Dacă  $h = 0$ , atunci sistemul (5.10.3) se reduce la

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \end{cases}$$

care sunt ecuațiile axei  $Oz$ .

(c) Dacă  $h > 0$ , atunci sistemul (5.10.3) se reduce la

$$\begin{cases} x = h, \\ y = \pm\sqrt{2ph}, \end{cases}$$

adică obținem câte o pereche de drepte (paralele cu Oz) pentru fiecare valoare admisibilă a lui  $h$

*Observație.* Cilindrul parabolic este și el o *suprafață cilindrică*, generată de o familie de drepte paralele cu o dreaptă dată (axa Oz, în cazul nostru), numite *generatoare* și care intersectează o curbă dată. În cazul nostru, acea curbă dată poate fi aleasă să fie oricare dintre parabolele (egale) care se obțin prin intersecții cu planul  $xOy$ .

**Planul tangent într-un punct al cilindrului parabolic.** Fie  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  un punct oarecare al cilindrului parabolic (5.10.1). Vom studia, ca de obicei, condiția ca o dreaptă care trece prin  $M_0$  să fie tangentă cilindrului. Ne reamintim că ecuațiile unei drepte oarecare prin  $M_0$  sunt:

$$(\Delta) \begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases}$$

Dacă înlocuim în ecuația cilindrului, obținem:

$$(y_0 + mt)^2 = 2p(x_0 + lt).$$

După efectuarea calculelor, obținem ecuația

$$m^2t^2 + 2t(-pl + y_0m) + y_0^2 - 2px_0 = 0.$$

Cum  $M_0$  aparține cilindrului, termenul liber este egal cu zero, deci ecuația de intersecție se reduce la

$$m^2t^2 + 2t(-pl + y_0m) = 0. \quad (5.10.4)$$

Pentru ca dreapta și cilindrul să aibă un singur punct (dublu) în comun, ecuația de intersecție (5.10.4) trebuie să aibă soluție dublă. Dar o soluție este, întotdeauna,  $t = 0$ , prin urmare și a doua soluție trebuie să fie zero, ceea ce este posibil doar dacă termenul de gradul întâi în  $t$  dispare, adică dacă avem

$$-pl + y_0m = 0. \quad (5.10.5)$$

Dacă  $\mathbf{n}$  este vectorul de componente  $(-p, y_0, 0)$ , iar  $\mathbf{v}(l, m, n)$  este vectorul director al dreptei, atunci ecuația (5.10.5) este echivalentă cu  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$ , adică *orice dreaptă care*

trece prin  $M_0$ , iar vectorul său director verifică ecuația (5.10.5) este perpendiculară pe vectorul  $\mathbf{n}$ . Dar aceasta nu înseamnă altceva decât că  $\mathbf{n}$  este vectorul normal la planul tangent la cilindrul parabolic în punctul  $M_0$ . Ca atare, ecuația planului tangent în  $M_0$  este:

$$-p(x - x_0) + y_0(y - y_0) = 0$$

sau, după ce facem calculele și ținem cont, încă o dată, de faptul că  $M_0$  aparține cilindrului,

$$yy_0 = p(x + x_0), \quad (5.10.6)$$

adică, și de data aceasta, ecuația planului tangent se poate obține prin dedublare, plecând de la ecuația cilindrului parabolic și aplicând regulile de dedublare.

- $y^2$  se înlocuiește cu  $yy_0$ ;
- $x$  se înlocuiește cu  $(x + x_0)/2$ .

## 5.11 Probleme

**Problem 5.1.** Să se găsească punctele de intersecție ale elipsoidului

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{4} = 1$$

cu dreapta

$$x = 4 + 2t, \quad y = -6 + 3t, \quad z = -2 - 2t.$$

**Problem 5.2.** Să se determine curbele de intersecție ale elipsoidului

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$$

cu planele de coordonate.

**Problem 5.3.** Să se scrie ecuația planului tangent la elipsoidul

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{9} = 1$$

în punctele lui de intersecție cu planul  $x = y = z$ .

**Problem 5.4.** Să se scrie ecuațiile planelor tangente la elipsoidul

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{8} = 1,$$

paralele cu planul

$$3x - 2y + 5z + 1 = 0.$$

**Problem 5.5.** Determinați unghiul pe care îl formează generatoarele conului

$$x^2 + y^2 - \frac{z^2}{6} = 0$$

cu axa Oz.

**Problem 5.6.** Determinați punctele de intersecție ale elipsoidului

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{4} = 1$$

cu dreapta

$$\frac{x-4}{2} = \frac{y+6}{-3} = \frac{z+2}{-2}.$$

**Problem 5.7.** Determinați punctele de intersecție ale hiperboloidului cu două pânze

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{9} = -1$$

cu dreapta

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{3}.$$

**Problem 5.8.** Determinați punctele de intersecție ale hiperboloidului cu o pânză

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{1} = 1$$

cu dreapta

$$\frac{x-4}{4} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{1}.$$

**Problem 5.9.** Determinați punctele de intersecție ale paraboloidului hiperbolic

$$x^2 - 4y^2 = 4z$$

cu dreapta

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-2}.$$

**Problem 5.10.** Determinați o dreaptă care să treacă prin punctul  $M(5, 1, 2)$  și care să aibă un singur punct comun cu suprafața

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{1} = 1.$$

**Problem 5.11.** Determinați generatoarele rectilinii ale suprafeței

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$$

care trec prin punctul  $M(6, 2, 8)$ .

**Problem 5.12.** Determinați generatoarele rectilinii ale suprafeței

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = z$$

care sunt paralele cu planul  $3x + 2y - 4z = 0$ .

**Problem 5.13.** Stabiliți ecuația planului tangent la suprafața

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{4} = -1$$

în punctul  $M(-6, 2, 6)$ .

**Problem 5.14.** Să se scrie ecuația planului tangent la hiperboloidul

$$-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{17} - 1 = 0$$

în punctul  $M\left(2, -1, \frac{17}{3}\right)$ .

**Problem 5.15.** Să se scrie ecuația planului tangent la hiperboloidul

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{5} + 1 = 0$$

în punctul  $M\left(4, -\sqrt{15}, 10\right)$ .

**Problem 5.16.** Să se scrie ecuația planului tangent la hiperboloidul

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} - 1 = 0,$$

paralel cu planul

$$2x + 3y - z + 11 = 0.$$

**Problem 5.17.** Să se scrie ecuația planului tangent la hiperboloidul

$$3x^2 - 12y^2 + z^2 - 3 = 0,$$

paralel cu planul

$$2x + 3y - z + 11 = 0.$$

**Problem 5.18.** Să se scrie ecuațiile dreptelor care trec prin punctul  $M(6, 2, 8)$  și se află pe hiperboloidul

$$16x^2 + 36y^2 - 9z^2 - 144 = 0.$$

**Problem 5.19.** Să se găsească punctele de intersecție ale dreptei

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$$

cu paraboloidul eliptic

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 2z.$$

**Problem 5.20.** Să se găsească punctele de intersecție ale dreptei

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$$

cu paraboloidul hiperbolic

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 2z.$$

**Problem 5.21.** Să se scrie ecuațiile planelor tangente la paraboloidul eliptic

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 2z$$

în punctele de intersecție cu dreapta

$$x = y = z.$$

**Problem 5.22.** Să se scrie ecuațiile planelor tangente la paraboloidul hiperbolic

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 2z$$

în punctele de intersecție cu dreapta

$$x = y = z.$$

**Problem 5.23.** Să se scrie ecuația planului tangent la paraboloidul eliptic

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = z,$$

paralel cu planul

$$x - 3y + 2z - 1 = 0.$$

**Problem 5.24.** Să se scrie ecuația planului tangent la paraboloidul hiperbolic

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = 3z,$$

paralel cu planul

$$x - 3y + 2z - 1 = 0.$$

**Problem 5.25.** Să se scrie ecuațiile generatoarelor rectilinii ale paraboloidului hiperbolic

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = z$$

care sunt paralele cu planul

$$3x + 2y - 4z = 0.$$

**Problem 5.26.** Să se scrie ecuațiile generatoarelor rectilinii ale paraboloidului hiperbolic

$$4x^2 - 9y^2 = 36z$$

care trec prin punctul  $M(3\sqrt{2}, 2, 1)$ .

**Problem 5.27.** Se dă paraboloidul hiperbolic

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = z$$

și unul dintre planele sale tangente,

$$10x - 2y - z - 21 = 0.$$

Determinați ecuațiile celor două drepte de intersecție dintre paraboloid și plan.

**Problem 5.28.** Determinați planele tangente la paraboloidul

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = z$$

care sunt paralele cu planul

$$x - y - 2z = 0.$$





---

## Bibliografie

---

- [1] Anand, V.B., *Computer Graphics and Geometric Modeling for Engineers*, John Wiley & Sons, 1993
- [2] Andrica, D., Topan, L., *Analytical Geometry*, Cluj University Press, 2005
- [3] Blaga, P.A., *Lectures on Classical Differential Geometry*, Risoprint, 2005
- [4] Boehm, W., Prautzsch, H., *Geometric Foundations of Geometric Design*, AK Peters, 1992
- [5] Farin, G., *Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design*, 4th edition, Academic Press, 1997
- [6] Fenn, R., *Geometry*, Springer, 2001
- [7] Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F., *Computer Graphics – Principles and Practice*, 2nd edition, Addison-Wesley, 1990
- [8] Gallier, J., *Geometric Methods and Applications for Computer Science and Engineering*, Springer, 2000
- [9] Hoggart, S.G., *Mathematics for Computer Graphics*, Cambridge University Press, 1992
- [10] Mortenson, M., *Geometric Modeling*, Wiley, 1985

- [11] Mortenson, M., *Computer Graphics – An Introduction to the Mathematics and Geometry*, Industrial Press Inc., 1989
- [12] Plastock, R.A., Kalley, G., *Schaum's Outline of Theory and Problems of Computer Graphics*, McGraw-Hill Publishing Company, 1986
- [13] Rogers, D.F., Adams, J.A., *Mathematical Elements for Computer Graphics*, 2nd edition, McGraw Hill, 1990
- [14] Salomon, D., *Curves and Surfaces for Computer Graphics*, Springer, 2006
- [15] Salomon, D., *Transformations and Projections in Computer Graphics*, Springer, 2006
- [16] Schneider, P.J., Eberly, D.H., *Geometric Tools for Computer Graphics*, Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2003
- [17] Sharma, A.K., *Encyclopedia of Analytical Geometry*, vol. 1–3, Dominant Publishers and Distributors, New Delhi, 2001
- [18] Snyder, V., Sisam, C.H., *Analytic Geometry of Space*, Henry Holt and Company, 1914
- [19] Taylor, W.T., *The Geometry of Computer Graphics*, Wadsworth & Brooks/Cole, 1992