

**ANALIZĂ MATEMATICĂ**  
**Specializarea Matematică Informatică,**  
**iunie 2019**

coordonator: Dorel I. Duca



## Cuprins

Capitolul 1. Serii de numere reale	1
1. Definiție și terminologie	1
2. Serii cu termeni pozitivi	6
3. Probleme propuse spre rezolvare - serii	18
Capitolul 2. Formula lui Taylor	21
1. Polinomul lui Taylor: definiție, proprietăți	21
2. Formula lui Taylor	22
3. Forme ale restului formulei lui Taylor	24
4. Probleme propuse spre rezolvare	28
Capitolul 3. Integrala Riemann	31
1. Diviziuni ale unui interval compact	31
2. Integrala Riemann	33
3. Primitive	35
4. Formula lui Leibniz-Newton	40
5. Metode de calcul a primitivelor	42
6. Probleme propuse spre rezolvare	47
Bibliografie	51
Glosar	53



## CAPITOLUL 1

### Serii de numere reale

#### 1. Definiție și terminologie

Noțiunea de *serie* este extensia naturală a noțiunii de sumă finită. Studiul seriilor se reduce la studiul unor siruri de numere. Determinarea sumei unei serii se reduce la calculul unei limite.

Însumarea progresiilor geometrice infinite cu rația mai mică în modul decât 1 se efectua deja din antichitate (Arhimede). Divergența seriei armonice a fost stabilită de învățatul italian Mengoli în 1650. Seriile apar constant în calculele savanților din secolul al XVIII-lea, dar neacordându-se totdeauna atenția necesară problemelor convergenței. O teorie riguroasă a seriilor a început cu lucrările lui Gauss (1812), Bolzano (1817) și, în sfârșit, Cauchy (1821) care dă pentru prima dată definiția valabilă și azi, a sumei unei serii convergente și stabilește teoremele de bază.

**1.1. Noțiuni generale.** În acest paragraf vom defini noțiunile de serie de numere, serie convergentă, serie divergentă, sumă a unei serii de numere.

**Definiția 1.1.1** Se numește **serie de numere reale** orice pereche ordonată  $((u_n), (s_n))_{n \in \mathbb{N}}$  unde  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un sir de numere reale, iar

$$s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}. \diamond$$

Prin tradiție seria  $((u_n), (s_n))$  se notează

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad \text{sau} \quad \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n \quad \text{sau} \quad \sum_{n \geq 1} u_n \quad \text{sau} \quad u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

sau, când nu este pericol de confuzie, se notează simplu prin

$$\sum u_n.$$

Numărul real  $u_n$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  se numește **termenul general** al seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ , iar sirul  $(u_n)$  **sirul termenilor** seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ . Numărul real  $s_n$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  se numește **suma parțială de rang  $n$**  a seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ , iar sirul  $(s_n)$  **sirul sumelor parțiale** ale seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ .

**Definiția 1.1.2** Spunem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = ((u_n), (s_n))$  este **convergentă** dacă și sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale este convergent.

Orice serie care nu este convergentă se numește **divergentă**.  $\diamond$

Dacă și sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale ale seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = ((u_n), (s_n))$  are limita  $s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ , atunci spunem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  **are suma**  $s$  (sau că  $s$  **este suma** seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ) și vom scrie

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s.$$

**Exemplul 1.1.3** Seria

$$(1.1.1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

are termenul general  $u_n = 1/(n(n+1))$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) și suma parțială de rang  $n \in \mathbb{N}$  egală cu

$$s_n = u_1 + \cdots + u_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Întrucât și sirul sumelor parțiale este convergent, seria (1.1.1) este convergentă. Deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$ , suma seriei (1.1.1) este 1; prin urmare scriem

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1. \diamond$$

**Exemplul 1.1.4** Se numește **serie geometrică** (de rație  $q$ ) orice serie de forma

$$(1.1.2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1},$$

unde  $q$  este un număr real fixat. Evident termenul general al seriei geometrice (1.1.2) este  $u_n = q^{n-1}$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ), iar suma parțială de rang  $n \in \mathbb{N}$  este

$$s_n = 1 + q + \cdots + q^{n-1} = \begin{cases} \frac{1-q^n}{1-q}, & \text{dacă } q \neq 1 \\ n, & \text{dacă } q = 1. \end{cases}$$

De aici deducem imediat că seria geometrică (1.1.2) este convergentă dacă și numai dacă  $|q| < 1$ . Dacă  $|q| < 1$ , atunci seria geometrică (1.1.2) are suma  $1/(1-q)$  și scriem

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \frac{1}{1-q}.$$

Dacă  $q \geq 1$ , atunci seria geometrică (1.1.2) este divergentă; în acest caz seria are suma  $+\infty$  și scriem

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = +\infty.$$

Dacă  $q \leq -1$ , atunci seria geometrică (1.1.2) este divergentă și nu are sumă.  $\diamond$

Studiul unei serii comportă două probleme:

- 1) Stabilirea naturii seriei, adică a faptului că seria este convergentă sau divergentă.
- 2) În cazul în care seria este convergentă, determinarea sumei seriei.

Dacă pentru rezolvarea primei probleme dispunem de criterii de convergență și divergență, pentru rezolvarea celei de a doua probleme nu dispunem de metode de determinare a sumei unei serii decât pentru câteva serii particulare.

În cele ce urmează vom da câteva criterii de convergență și divergență pentru serii.

**Teorema 1.1.5** (*criteriul general de convergență, criteriul lui Cauchy*) Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă dacă și numai dacă pentru fiecare număr real  $\varepsilon > 0$  există un număr natural  $n_\varepsilon$  cu proprietatea că oricare ar fi numerele naturale  $n$  și  $p$  cu  $n \geq n_\varepsilon$  avem

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon.$$

**Demonstrație.** Fie  $s_n = u_1 + \cdots + u_n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ . Atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă dacă și numai dacă sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale este convergent, prin urmare, în baza teoremei lui Cauchy, dacă și numai dacă sirul  $(s_n)$  este fundamental, adică dacă și numai dacă oricare ar fi numărul real  $\varepsilon > 0$  există un număr natural  $n_\varepsilon$  cu proprietatea că oricare ar fi numerele naturale  $n$  și  $p$  cu  $n \geq n_\varepsilon$  avem  $|s_{n+p} - s_n| < \varepsilon$ . Întrucât

$$s_{n+p} - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}, \text{ oricare ar fi } n, p \in \mathbb{N},$$

teorema este demonstrată. ■

**Exemplul 1.1.6** Seria

$$(1.1.3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

numită *seria armonică*, este divergentă și are suma  $+\infty$ .

**Soluție.** Presupunem prin absurd că seria armonică (1.1.3) este convergentă; atunci, în baza criteriului general de convergență (teorema 1.1.5), pentru  $\varepsilon = 1/2 > 0$  există un număr natural  $n_0$  cu proprietatea că oricare ar fi numerele naturale  $n$  și  $p$  cu  $n \geq n_0$  avem

$$\left| \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+p} \right| < \frac{1}{2}.$$

De aici, luând  $p = n = n_0 \in \mathbb{N}$ , obținem

$$(1.1.4) \quad \frac{1}{n_0 + 1} + \cdots + \frac{1}{n_0 + n_0} < \frac{1}{2}.$$

Pe de altă parte, din  $n_0 + k \leq n_0 + n_0$ , oricare ar fi  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k \leq n_0$  deducem

$$\frac{1}{n_0 + 1} + \cdots + \frac{1}{n_0 + n_0} \geq \frac{n_0}{2n_0} = \frac{1}{2}$$

și deci inegalitatea (1.1.4) nu are loc. Această contradicție ne conduce la concluzia că seria armonică (1.1.3) este divergentă. Deoarece sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale este strict crescător avem că

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

■

**Exemplul 1.1.7** Seria

$$(1.1.5) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$$

este convergentă.

**Soluție.** Fie  $u_n = (\sin n) / 2^n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ; atunci pentru fiecare  $n, p \in \mathbb{N}$  avem

$$\begin{aligned} |u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{\sin(n+p)}{2^{n+p}} \right| \leq \\ &\leq \frac{|\sin(n+1)|}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{|\sin(n+p)|}{2^{n+p}} \leq \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} = \\ &= \frac{1}{2^n} \left( 1 - \frac{1}{2^p} \right) < \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

Fie  $\varepsilon > 0$ . Întrucât sirul  $(1/2^n)$  este convergent către 0, deducem că există un număr natural  $n_\varepsilon$  cu proprietatea că  $1/2^n < \varepsilon$ , oricare ar fi numărul natural  $n \geq n_\varepsilon$ . Atunci

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \frac{1}{2^n} < \varepsilon,$$

oricare ar fi numerele naturale  $n, p$  cu  $n \geq n_\varepsilon$ . Prin urmare seria (1.1.5) este convergentă.

■

**Teorema 1.1.8** Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă, atunci sirul  $(u_n)$  este convergent către zero.

**Demonstrație.** Fie  $\varepsilon > 0$ ; atunci, în baza criteriului general de convergență al lui Cauchy (teorema 1.1.5), există un număr natural  $n_\varepsilon$  cu proprietatea că

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon, \text{ oricare ar fi } n, p \in \mathbb{N} \text{ cu } n \geq n_\varepsilon.$$

Dacă aici luăm  $p = 1$ , obținem că  $|u_{n+1}| < \varepsilon$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq n_\varepsilon$ , de unde deducem că

$$|u_n| < \varepsilon, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_\varepsilon + 1;$$

prin urmare sirul  $(u_n)$  converge către 0. ■

**Observația 1.1.9** Reciproca teoremei 1.1.8, în general, nu este adevărată în sensul că există serii  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  cu sirul  $(u_n)$  convergent către 0 și totuși seria nu este convergentă. De exemplu seria armonică (1.1.3) este divergentă deși sirul  $(1/n)$  este convergent către 0. ◇

**Teorema 1.1.10** Fie  $m$  un număr natural. Atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă dacă și numai dacă seria  $\sum_{n=m}^{\infty} u_n$  este convergentă.

**Demonstrație.** Fie  $s_n = u_1 + \dots + u_n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$  și  $t_n = u_m + \dots + u_n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq m$ . Atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă dacă și numai dacă sirul  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent, prin urmare dacă și numai dacă sirul  $(t_n)_{n \geq m}$  este convergent, aşadar dacă și numai dacă seria  $\sum_{n=m}^{\infty} u_n$  este convergentă. ■

**Teorema 1.1.11** Dacă  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  sunt serii convergente și  $a$  și  $b$  sunt numere reale, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (au_n + bv_n)$  este convergentă și are suma

$$a \sum_{n=1}^{\infty} u_n + b \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

**Demonstrație.** Evident, pentru fiecare număr natural  $n$  avem

$$\sum_{k=1}^n (au_k + bv_k) = a \left( \sum_{k=1}^n u_k \right) + b \left( \sum_{k=1}^n v_k \right),$$

de unde, în baza proprietăților sirurilor convergente, obținem afirmația teoremei. ■

**Exemplul 1.1.12** Întrucât seriile

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \text{ și } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}}$$

sunt convergente și au suma 2 respectiv 3/2, deducem că seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^{n-1}} \right)$$

este convergentă și are suma  $(1/2) \cdot 2 - (1/3) \cdot (3/2) = 1/2$ . ◇

**Definiția 1.1.13** Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie convergentă cu suma  $s$ ,  $n$  un număr natural și  $s_n = u_1 + \dots + u_n$  suma parțială de rang  $n$  a seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ . Numărul real  $r_n = s - s_n$  se numește **restul de ordinul  $n$**  al seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ . ◇

**Teorema 1.1.14** Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă, atunci sirul  $(r_n)$  al resturilor ei este convergent către 0.

**Demonstratie.** Fie  $s = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ . Deoarece sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale ale seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergent către  $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  și  $r_n = s - s_n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ , avem că sirul  $(r_n)$  este convergent către 0. ■

## 2. Serii cu termeni pozitivi

Dacă  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este o serie de numere reale convergentă, atunci sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale este mărginit. Reciproca acestei afirmații, în general nu este adevărată în sensul că există serii divergente care au sirul sumelor parțiale mărginit. Într-adevăr, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$  are sirul sumelor parțiale cu termenul general  $s_n$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) egal cu

$$s_n = \begin{cases} 1, & \text{dacă } n \text{ este par} \\ 0, & \text{dacă } n \text{ este impar.} \end{cases}$$

Evident sirul  $(s_n)$  este mărginit ( $|s_n| \leq 1$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ) deși seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$  este divergentă (sirul  $(s_n)$  nu este convergent).

Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  are termenii numere reale pozitive, atunci sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale este crescător; în acest caz faptul că sirul  $(s_n)$  este mărginit este echivalent cu faptul că sirul  $(s_n)$  este convergent.

Scopul acestui paragraf este de a da criterii de convergență pentru aşa numitele serii cu termeni pozitivi.

**Definiția 1.2.1** Se numește **serie cu termeni pozitivi** orice serie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  care are proprietatea că  $u_n > 0$  oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ . ◇

Pentru seriile cu termeni pozitivi are loc următoarea afirmație.

**Teorema 1.2.2** Dacă  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi, atunci

1<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  are sumă și

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n u_k : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

2<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă dacă și numai dacă sirul  $\left( \sum_{k=1}^n u_k \right)$  al sumelor parțiale este mărginit.

**Demonstratie.** Pentru fiecare  $n \in \mathbb{N}$  punem

$$s_n := \sum_{k=1}^n u_k.$$

1<sup>0</sup> Sirul  $(s_n)$  este crescător și atunci, în baza teoremei lui Weierstrass relativă la sirurile monotone, afirmația 1<sup>0</sup> este dovedită.

2<sup>0</sup> Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă, atunci sirul sumelor parțiale  $(s_n)$  este convergent și deci mărginit.

Dacă sirul  $(s_n)$  este mărginit, atunci, întrucât el este monoton, deducem că sirul  $(s_n)$  este convergent și prin urmare seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă. ■

**Teorema 1.2.3** (primul criteriu al comparației) *Dacă  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  sunt serii cu termeni pozitivi cu proprietatea că există un număr real  $a > 0$  și un număr natural  $n_0$  astfel încât*

$$(1.2.6) \quad u_n \leq av_n \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci:

1<sup>0</sup> Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este divergentă.

**Demonstratie.** Pentru fiecare  $n \in \mathbb{N}$ , fie  $s_n = u_1 + \dots + u_n$  și  $t_n = v_1 + \dots + v_n$ ; atunci din (1.2.6) avem că

$$(1.2.7) \quad s_n \leq s_{n_0} + a(v_{n_0+1} + \dots + v_n), \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

1<sup>0</sup> Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă, atunci sirul  $(t_n)$  este mărginit, prin urmare există un număr real  $M > 0$  cu proprietatea că  $t_n \leq M$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ . Acum din (1.2.7) deducem că pentru fiecare  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq n_0$  au loc inegalitățile

$$s_n \leq s_{n_0} + a(t_n - t_{n_0}) \leq s_{n_0} + at_n - at_{n_0} \leq s_{n_0} + at_n \leq s_{n_0} + aM,$$

de unde rezultă că sirul  $(s_n)$  este mărginit. Atunci, în baza teoremei 1.2.2, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Presupunem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  ar fi convergentă, atunci în baza afirmației 1<sup>0</sup>, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  ar fi convergentă, ceea ce contrazice ipoteza că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. Așadar seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este divergentă. ■

**Exemplul 1.2.4** Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1/2}$  este divergentă. Într-adevăr, din inegalitatea  $\sqrt{n} \leq n$  adevărată oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ , obținem că  $n^{-1} \leq n^{-1/2}$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ . Cum seria armonică  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$  este divergentă, în baza teoremei 1.2.2, afirmația 2<sup>0</sup>, deducem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1/2}$  este divergentă. ◇

**Teorema 1.2.5** (al doilea criteriu al comparației) *Dacă  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  sunt serii cu termeni pozitivi cu proprietatea că există*

$$(1.2.8) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} \in [0, +\infty],$$

*atunci*

1<sup>0</sup> *Dacă*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} \in ]0, +\infty[,$$

*atunci seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  au aceeași natură.*

2<sup>0</sup> *Dacă*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0,$$

*atunci:*

a) *Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.*

b) *Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este divergentă.*

3<sup>0</sup> *Dacă*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty,$$

*atunci:*

a) *Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă.*

b) *Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este divergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.*

**Demonstrație.** 1<sup>0</sup> Fie  $a := \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n/v_n) \in ]0, +\infty[$ ; atunci există un număr natural  $n_0$  cu proprietatea că

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - a \right| < \frac{a}{2}, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

de unde deducem că

$$(1.2.9) \quad v_n \leq (2/a) u_n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$$

și

$$(1.2.10) \quad u_n \leq (3a/2) v_n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă, atunci în baza primului criteriu al comparației (teorema 1.2.3), aplicabil pentru că are loc (1.2.9), obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă.

Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă, atunci ținând seama de (1.2.10), în baza primului criteriu al comparației (teorema 1.2.3) rezultă că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n/v_n) = 0$ , atunci există un număr natural  $n_0$  astfel încât  $u_n/v_n < 1$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ , de unde deducem că

$$u_n \leq v_n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicăm acum primul criteriu al comparației.

3<sup>0</sup> Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n/v_n) = +\infty$ , atunci există un număr natural  $n_0$  astfel încât  $u_n/v_n > 1$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ , de unde deducem că

$$v_n \leq u_n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicăm acum primul criteriu al comparației. ■

**Exemplul 1.2.6** Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$  este convergentă. Într-adevăr, din

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n+1)} = 1 \in ]0, +\infty[,$$

deducem că seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  au aceeași natură. Cum seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  este convergentă (vezi exemplul 1.1.3), obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$  este convergentă. ◇

**Teorema 1.2.7** (al treilea criteriu al comparației) Dacă  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  sunt serii cu termeni pozitivi cu proprietatea că există un număr natural  $n_0$  astfel încât:

$$(1.2.11) \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci:

1<sup>0</sup> Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă, atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este divergentă.

**Demonstratie.** Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq n_0 + 1$ ; atunci din (1.2.11) avem succesiv:

$$\frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0}} \leq \frac{v_{n_0+1}}{v_{n_0}}$$

. . .

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} \leq \frac{v_n}{v_{n-1}},$$

de unde, prin înmulțire membru cu membru, obținem

$$\frac{u_n}{u_{n_0}} \leq \frac{v_n}{v_{n_0}}.$$

Așadar

$$u_n \leq \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}} v_n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicăm acum primului criteriu al comparației (teorema 1.2.3). Teorema este demonstrată. ■

**Teorema 1.2.8** (criteriul condensării al lui Cauchy) Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi cu proprietatea că sirul  $(u_n)$  al termenilor seriei este descrescător. Atunci seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n u_{2^n}$  au aceeași natură.

**Demonstratie.** Fie  $s_n := u_1 + u_2 + \dots + u_n$  suma parțială de rang  $n \in \mathbb{N}$  a seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și fie  $S_n := 2u_2 + 2^2 u_{2^2} + \dots + 2^n u_{2^n}$  suma parțială de rang  $n \in \mathbb{N}$  a seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n u_{2^n}$ .

Presupunem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n u_{2^n}$  este convergentă; atunci sirul  $(S_n)$  al sumelor parțiale este mărginit, prin urmare există un număr real  $M > 0$  astfel încât

$$0 \leq S_n \leq M, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}.$$

Pentru a arăta că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă, în baza teoremei 1.2.2, este suficient să arătăm că sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale este mărginit. Deoarece seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este cu termeni pozitivi, din  $n \leq 2^{n+1} - 1$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) deducem că

$$\begin{aligned} s_n &\leq s_{2^{n+1}-1} = u_1 + (u_2 + u_3) + (u_4 + \cdots + u_7) + \\ &\quad + (u_{2^n} + u_{2^n+1} + \cdots + u_{2^{n+1}-1}). \end{aligned}$$

Întrucât sirul  $(u_n)$  este descrescător, urmează că

$$u_{2^k} > u_{2^k+1} > \cdots > u_{2^{k+1}-1}, \text{ oricare ar fi } k \in \mathbb{N}$$

și deci  $s_n$  se poate delimita mai departe astfel

$$\begin{aligned} s_n &\leq s_{2^{n+1}-1} \leq u_1 + 2 \cdot u_2 + 2^2 \cdot u_{2^2} + \cdots + 2^n \cdot u_{2^n} = \\ &= u_1 + S_n \leq u_1 + M. \end{aligned}$$

Așadar sirul  $(s_n)$  este mărginit și deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

Presupunem acum că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă; atunci sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale ale seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este mărginit, prin urmare există un număr real  $M > 0$  astfel încât  $0 \leq s_n \leq M$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ . Pentru a arăta că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n u_{2^n}$  este convergentă, este suficient să arătăm că sirul  $(S_n)$  este mărginit. Fie deci  $n \in \mathbb{N}$ . Atunci

$$\begin{aligned} s_{2^n} &= u_1 + u_2 + (u_3 + u_4) + (u_5 + u_6 + u_7 + u_8) + \cdots + \\ &\quad + (u_{2^{n-1}+1} + \cdots + u_{2^n}) \geq \\ &\geq u_1 + u_2 + 2u_{2^2} + 2^2 u_{2^3} + \cdots + 2^{n-1} u_{2^n} \geq \\ &\geq u_1 + \frac{1}{2} S_n \geq \frac{1}{2} S_n, \end{aligned}$$

prin urmare avem inegalitatea

$$S_n \leq 2s_{2^n} \leq 2M.$$

Așadar sirul  $(S_n)$  este mărginit și deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n u_{2^n}$  este convergentă. ■

**Exemplul 1.2.9** Seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}, \text{ unde } a \in \mathbb{R},$$

numită **seria armonică generalizată**, este divergentă pentru  $a \leq 1$  și convergentă pentru  $a > 1$ .

**Soluție.** Într-adevăr, dacă  $a \leq 0$ , atunci sirul termenilor seriei  $(n^{-a})$  nu converge către zero și deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$  este divergentă. Dacă  $a > 0$ , atunci sirul termenilor seriei  $(n^{-a})$  este descrescător convergent către zero și deci putem aplica criteriul condensării; seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^a}$  au aceeași natură. Întrucât  $2^n \frac{1}{(2^n)^a} = \left(\frac{1}{2^{a-1}}\right)^n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ , deducem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^a}$  este de fapt seria geometrică  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{a-1}}\right)^n$ , divergentă pentru  $a \leq 1$  și convergentă pentru  $a > 1$ . Urmează că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$  este divergentă pentru  $a \leq 1$  și convergentă pentru  $a > 1$ . ■

**Teorema 1.2.10** (criteriul raportului, criteriul lui D'Alembert) *Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi.*

1<sup>0</sup> *Dacă există un număr real  $q \in [0, 1[$  și un număr natural  $n_0$  astfel încât:*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

*atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.*

2<sup>0</sup> *Dacă există un număr natural  $n_0$  astfel încât:*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

*atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.*

**Demonstratie.** 1<sup>0</sup> Aplicăm al treilea criteriu al comparației (teorema 1.2.7, afirmația 1<sup>0</sup>), luând  $v_n := q^{n-1}$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ . Avem

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{v_{n+1}}{v_n}, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

iar seria  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  este convergentă, prin urmare seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Din  $u_{n+1}/u_n \geq 1$  deducem că  $u_{n+1} \geq u_n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ , prin urmare sirul  $(u_n)$  nu converge către 0; atunci, în baza teoremei 1.1.8, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. ■

**Teorema 1.2.11** (consecința criteriului raportului) *Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi pentru care există  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ .*

1<sup>0</sup> *Dacă*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1,$$

*atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.*

2<sup>0</sup> Dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

**Demonstratie.** Fie  $a := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ . Evident  $a \geq 0$ .

1<sup>0</sup> Întrucât  $a \in [0, 1[$  deducem că există un număr real  $q \in ]a, 1[$ . Atunci, din  $a \in ]a-1, q[$  rezultă că există un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \in ]a-1, q[, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Urmează că

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicând acum criteriul raportului, obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă  $1 < a$ , atunci există un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicând acum criteriul raportului, obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. ■

**Exemplul 1.2.12** Seria

$$(1.2.12) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$$

este convergentă.

**Soluție.** Avem că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{27} < 1,$$

și atunci, în baza consecinței criteriului raportului, seria (1.2.12) este convergentă. ■

**Observația 1.2.13** Dacă pentru seria cu termeni pozitivi  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  există limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$  și este egală cu 1, atunci consecința criteriului raportului nu decide dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă sau divergentă; există serii convergente, dar și serii divergente pentru care  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ . Într-adevăr, pentru seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$  avem, în ambele cazuri,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ , prima serie fiind divergentă (vezi exemplul 1.1.3) și a doua serie fiind convergentă (vezi exemplul 1.2.6). ◇

**Teorema 1.2.14** (criteriul radicalului, criteriul lui Cauchy) Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi.

1<sup>0</sup> Dacă există un număr real  $q \in [0, 1[$  și un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$(1.2.13) \quad \sqrt[n]{u_n} \leq q, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă există un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$(1.2.14) \quad \sqrt[n]{u_n} \geq 1, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

**Demonstratie.** 1<sup>0</sup> Presupunem că există  $q \in [0, 1[$  și  $n_0 \in \mathbb{N}$  astfel încât (1.2.13) să aibă loc. Atunci

$$u_n \leq q^n, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicăm acum primul criteriu al comparației (teorema 1.2.3, afirmația 1<sup>0</sup>), luând  $v_n := q^{n-1}$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$  și  $a := q$ . Întrucât seria  $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$  este convergentă, obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Din (1.2.14) deducem că  $u_n \geq 1$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ , prin urmare sirul  $(u_n)$  nu converge către 0; atunci, în baza teoremei 1.1.8, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. ■

**Teorema 1.2.15** (consecința criteriului radicalului) Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi pentru care există  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$ .

1<sup>0</sup> Dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} > 1,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

**Demonstratie.** Fie  $a := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$ . Evident  $a \geq 0$ .

1<sup>0</sup> Întrucât  $a \in [0, 1[$  deducem că există un număr real  $q \in ]a, 1[$ . Atunci, din  $a \in ]a-1, q[$  rezultă că există un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$\sqrt[n]{u_n} \in ]a-1, q[, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Urmează că

$$\sqrt[n]{u_n} \leq q, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicând acum criteriul radicalului, obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă  $1 < a$ , atunci există un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$\sqrt[n]{u_n} \geq 1, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Aplicând acum criteriul radicalului, obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. ■

**Exemplul 1.2.16** Seria

$$(1.2.15) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sqrt[3]{n^3 + 3n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 - n^2 + 1} \right)^n.$$

este convergentă.

**Soluție.** Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt[3]{n^3 + 3n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 - n^2 + 1} \right) = \frac{4}{3} > 1.$$

și deci, în baza consecinței criteriului radicalului, seria (1.2.15) este divergentă. ■

**Observația 1.2.17** Dacă pentru seria cu termeni pozitivi  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  există limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$  și este egală cu 1, atunci consecința criteriului radicalului nu decide dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă sau divergentă; există serii convergente, dar și serii divergente pentru care  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$ . Într-adevăr, pentru seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$  avem, în ambele cazuri,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$ , prima serie fiind divergentă (vezi exemplul 1.1.3) și a doua serie fiind convergentă (vezi exemplul 1.2.6). ◇

**Teorema 1.2.18** (criteriul lui Kummer) *Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi.*

1<sup>0</sup> *Dacă există un sir  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , de numere reale pozitive, există un număr real  $r > 0$  și există un număr natural  $n_0$  cu proprietatea că*

$$(1.2.16) \quad a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} \geq r, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

*atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.*

2<sup>0</sup> *Dacă există un sir  $(a_n)$ , de numere reale pozitive cu proprietatea că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  este divergentă și există un număr natural  $n_0$  astfel încât*

$$(1.2.17) \quad a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} \leq 0, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

**Demonstratie.** Pentru fiecare număr natural  $n$ , notăm cu

$$s_n := u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

suma parțială de rang  $n$  a seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ .

1<sup>0</sup> Presupunem că există un sir  $(a_n)$ , de numere reale pozitive, există un număr real  $r > 0$  și există un număr natural  $n_0$  astfel încât (1.2.16) are loc. Să observăm că relația (1.2.16) este echivalentă cu

$$(1.2.18) \quad a_n u_n - a_{n+1} u_{n+1} \geq r u_{n+1}, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq n_0 + 1$ ; atunci din (1.2.18) avem succesiv:

$$a_{n_0} u_{n_0} - a_{n_0+1} u_{n_0+1} \geq r u_{n_0+1},$$

. . .

$$a_{n-1} u_{n-1} - a_n u_n \geq r u_n,$$

de unde, prin adunare membru cu membru, obținem

$$a_{n_0} u_{n_0} - a_n u_n \geq r(u_{n_0+1} + \dots + u_n).$$

De aici deducem că, pentru fiecare număr natural  $n \geq n_0$  avem

$$\begin{aligned} s_n = \sum_{k=1}^n u_k &= \sum_{k=1}^{n_0} u_k + \sum_{k=n_0+1}^n u_k \leq s_{n_0} + \frac{1}{r} (a_{n_0} u_{n_0} - a_n u_n) \leq \\ &\leq s_{n_0} + \frac{1}{r} a_{n_0} u_{n_0}, \end{aligned}$$

prin urmare sirul  $(s_n)$  al sumelor parțiale ale seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este mărginit. În baza teoremei

1.2.2, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Presupunem că există un sir  $(a_n)$ , de numere reale pozitive, cu proprietatea că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  este divergentă și există un număr natural  $n_0$  astfel încât (1.2.17) are loc. Evident (1.2.17) este echivalentă cu

$$\frac{\frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{a_n}} \leq \frac{u_{n+1}}{u_n}, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0.$$

Deoarece seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  este divergentă, conform criteriului al III-lea al comparației seria

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

Teorema este demonstrată. ■

**Teorema 1.2.19** (criteriul lui Raabe-Duhamel) Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi.

1<sup>0</sup> Dacă există un număr real  $q > 1$  și un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$(1.2.19) \quad n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) \geq q \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă există un număr natural  $n_0$  astfel încât

$$(1.2.20) \quad n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) \leq 1 \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

**Demonstrație.** În criteriul lui Kummer (teorema 1.2.18) să luăm  $a_n := n$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ; obținem

$$a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} = n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) - 1.$$

1<sup>0</sup> Dacă luăm  $r := q - 1 > 0$ , atunci, întrucât (1.2.16) este echivalentă cu (1.2.19), deducem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Cum seria  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$  este divergentă și (1.2.17) este echivalentă cu (1.2.20), obținem că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. ■

**Teorema 1.2.20** (consecința criteriului lui Raabe-Duhamel) Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi pentru care există limită

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right).$$

1<sup>0</sup> Dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) > 1,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) < 1,$$

atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă.

**Demonstrație.** Fie

$$b := \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right).$$

1<sup>o</sup> Din  $b > 1$  deducem că există un număr real  $q \in ]1, b[$ . Atunci  $b \in ]q, b + 1[$  implică existența unui număr natural  $n_0$  astfel încât

$$n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) \in ]q, b + 1[, \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, n \geq n_0,$$

de unde obținem că (1.2.19) are loc. Aplicând acum criteriul lui Raabe-Duhamel, rezultă că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este convergentă.

2<sup>o</sup> Dacă  $b < 1$ , atunci există un număr natural  $n_0$  astfel încât (1.2.20) să aibă loc. Aplicând acum criteriul lui Raabe-Duhamel, rezultă că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  este divergentă. ■

**Exemplul 1.2.21** Seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a(a+1)\cdots(a+n-1)}, \text{ unde } a > 0,$$

este convergentă dacă și numai dacă  $a > 2$ .

**Soluție.** Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$$

și deci consecința criteriului raportului nu decide natura seriei. Deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = a - 1,$$

în baza consecinței criteriului lui Raabe-Duhamel, dacă  $a > 2$ , atunci seria dată este convergentă, iar dacă  $a < 2$  seria dată este divergentă. Dacă  $a = 2$ , atunci seria dată devine  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$  care este divergentă. Așadar seria dată este convergentă dacă și numai dacă  $a > 2$ . ■

### 3. Probleme propuse spre rezolvare - serii

**Exercițiu 1.3.1** Calculați suma umătoarelor serii geometrice:

$$a) \sum_{n \geq 3} \frac{3}{5^n}, \quad b) \sum_{n \geq 4} \frac{2^{n-3} + (-3)^{n+3}}{5^n}, \quad c) \sum_{n \geq 5} e^n, \quad d) \sum_{n \geq 2} \left( -\frac{1}{\pi} \right)^n \quad e) \sum_{n \geq 3} (-3)^n.$$

**Exercițiu 1.3.2** Calculați suma următoarelor serii telescopice:

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2 - 1}, \quad b) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}, \quad c) \sum_{n \geq 5} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$d) \sum_{n \geq 1} \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right), \quad e) \sum_{n \geq 2} \frac{\ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \left( n^{\ln(n+1)} \right)}.$$

**Exercițiu 1.3.3** Stabiliți natura următoarelor serii:

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{n+7}{\sqrt{n^2+7}}, \quad b) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}, \quad c) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}, \quad d) \sum_{n \geq 1} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n.$$

**Exercițiu 1.3.4** Stabiliți natura următoarelor serii:

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{2^n + 3^n}{5^n}, \quad b) \sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{3^n + 5^n}.$$

**Exercițiu 1.3.5** Stabiliți natura următoarelor serii:

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n-1}, \quad b) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n-1)^2}, \quad c) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}}, \quad d) \sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n^2+n}}{\sqrt[3]{n^5-n}}.$$

**Exercițiu 1.3.6** Stabiliți natura următoarelor serii:

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{100^n}{n!}, \quad b) \sum_{n \geq 1} \frac{2^n n!}{n^n}, \quad c) \sum_{n \geq 1} \frac{3^n n!}{n^n}, \quad d) \sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}, \quad e) \sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{(2 + \frac{1}{n})^n}.$$

**Exercițiu 1.3.7** Stabiliți, în funcție de valoarea parametrului  $a > 0$ , natura următoarelor serii:

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{a^n}{n^n}, \quad b) \sum_{n \geq 1} \left( \frac{n^2 + n + 1}{n^2} a \right)^n, \quad c) \sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{2^n + a^n}.$$

**Exemplul 1.3.1** Pentru fiecare  $a, b > 0$ , studiați natura seriei:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{a^n + b^n}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{a^n + b^n}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n b^n}{a^n + b^n};$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2a+1)(3a+1)\cdots(na+1)}{(2b+1)(3b+1)\cdots(nb+1)}.$$

**Exemplul 1.3.2** Stabiliți natura seriilor:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

**Exemplul 1.3.3** Pentru fiecare  $a > 0$ , studiați natura seriilor:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a(a+1)\dots(a+n)}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} a^{-\left(1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}\right)}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}.$$

**Observația 1.3.4** Pentru detalii puteți consulta [5].

## CAPITOLUL 2

### Formula lui Taylor

#### 1. Polinomul lui Taylor: definiție, proprietăți

Formula lui Taylor, utilizată în special în aproximarea funcțiilor prin polinoame, este una din cele mai importante formule din matematică.

**Definiția 2.1.1** Fie  $D$  o submulțime nevidă a mulțimii  $\mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$  și  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $n$  ori în punctul  $x_0$ . Funcția (polinomială)  $T_{n;x_0}f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$\begin{aligned}(T_{n;x_0}f)(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \\ (T_{n;x_0}f)(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots \\ &\quad \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

se numește **polinomul lui Taylor de ordin  $n$  atașat funcției  $f$  și punctului  $x_0$** . ◇

**Observația 2.1.2** Polinomul lui Taylor de ordin  $n$  are gradul cel mult  $n$ . ◇

**Exemplul 2.1.3** Pentru funcția exponențială  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x) = \exp x, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R},$$

avem

$$f^{(k)}(x) = \exp x, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R} \text{ și } k \in \mathbb{N}.$$

Polinomul lui Taylor de ordin  $n$  atașat funcției exponențiale,  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , și punctului  $x_0 = 0$  este

$$(T_{n;0} \exp)(x) = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n,$$

oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$ . ◇

**Observația 2.1.4** Remarcăm că domeniul de definiție al polinomului lui Taylor este  $\mathbb{R}$ , nu domeniul de definiție al funcției  $f$ . Mai mult, fiind o funcție polinomială,  $T_{n;x_0}f$  este o funcție indefinit derivabilă pe  $\mathbb{R}$  și, pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , avem

$$(T_{n;x_0}f)'(x) = f^{(1)}(x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} = \\ = (T_{n-1;x_0}f')(x),$$

$$(T_{n;x_0}f)''(x) = f^{(2)}(x_0) + \frac{f^{(3)}(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} = \\ = (T_{n-2;x_0}f'')(x),$$

. .

$$(T_{n;x_0}f)^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{1!}(x - x_0) = \\ = (T_{1;x_0}f^{(n-1)})(x),$$

$$(T_{n;x_0}f)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x_0) = (T_{0;x_0}f^{(n)})(x),$$

$$(T_{n;x_0}f)^{(k)}(x) = 0, \text{ oricare ar fi } k \in \mathbb{N}, k \geq n+1.$$

De aici deducem că

$$(T_{n;x_0}f)^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \text{ oricare ar fi } k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

și

$$(T_{n;x_0}f)^{(k)}(x_0) = 0, \text{ oricare ar fi } k \in \mathbb{N}, k \geq n+1.$$

Prin urmare, polinomul lui Taylor de ordin  $n$  atașat funcției  $f$  și punctului  $x_0$  cât și derivatele lui până la ordinul  $n$  coincid în  $x_0$  cu funcția  $f$  și respectiv cu derivatele ei până la ordinul  $n$ .

## 2. Formula lui Taylor

**Definiția 2.2.1** Fie  $D$  o submulțime nevidă a mulțimii  $\mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$  și  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $n$  ori în punctul  $x_0$ . Funcția  $R_{n;x_0}f : D \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$(R_{n;x_0}f)(x) = f(x) - (T_{n;x_0}f)(x), \text{ oricare ar fi } x \in D$$

se numește **restul Taylor de ordinul  $n$  atașat funcției  $f$  și punctului  $x_0$** .

Orice egalitate de forma

$$f = T_{n;x_0}f + R_{n;x_0}f,$$

unde pentru  $R_{n;x_0}f$  este dată o formulă de calcul, se numește **formulă Taylor de ordinul  $n$  corespunzătoare funcției  $f$  și punctului  $x_0$** . În acest caz  $R_{n;x_0}f$  se numește **restul de ordinul  $n$  al formulei lui Taylor**. ◇

**Observația 2.2.2** Deoarece  $f$  și  $T_{n;x_0}f$  sunt derivabile de  $n$  ori în  $x_0$ , rezultă că și restul  $R_{n;x_0}f = f - T_{n;x_0}f$  este o funcție derivabilă de  $n$  ori în  $x_0$  și

$$(R_{n;x_0}f)^{(k)}(x_0) = 0, \text{ oricare ar fi } k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

**Observația 2.2.3** Funcția  $R_{n;x_0}f : D \rightarrow \mathbb{R}$  fiind derivabilă în  $x_0$  este continuă în  $x_0$  și deci există

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (R_{n;x_0}f)(x) = (R_{n;x_0}f)(x_0) = 0.$$

Aceasta înseamnă că pentru fiecare număr real  $\varepsilon > 0$  există un număr real  $\delta > 0$  astfel încât oricare ar fi  $x \in D$  pentru care  $|x - x_0| < \delta$  avem

$$|f(x) - (T_{n;x_0}f)(x)| < \varepsilon.$$

Prin urmare, pentru valorile lui  $x \in D$ , suficient de apropiate de  $x_0$ , valoarea  $f(x)$  poate fi aproximată prin  $(T_{n;x_0}f)(x)$ .

În cele ce urmează, vom preciza o caracterizare a restului.

**Teorema 2.2.4** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $n$  ori în punctul  $x_0$ . Atunci

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(R_{n;x_0}f)(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

**Demonstratie.** Aplicând de  $n - 1$  ori regula lui l'Hôpital și ținând seama că

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = f^{(n)}(x_0),$$

obținem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(R_{n;x_0}f)(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (T_{n;x_0}f)(x)}{(x - x_0)^n} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - (T_{n;x_0}f)'(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots \\ \dots &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - (T_{n;x_0}f)^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)}{n!(x - x_0)} = \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0. \end{aligned}$$

■

**Observația 2.2.5** Dacă notăm cu  $\alpha_{n;x_0}f : I \rightarrow \mathbb{R}$  funcția definită prin

$$(\alpha_{n;x_0}f)(x) = \begin{cases} \frac{(R_{n;x_0}f)(x)}{(x-x_0)^n}, & \text{dacă } x \in I \setminus \{x_0\} \\ 0, & \text{dacă } x = x_0, \end{cases}$$

atunci, din teorema 2.2.4 rezultă că funcția  $\alpha_{n;x_0}f$  este continuă în punctul  $x_0$ . Mai mult, pentru fiecare  $x \in I$  are loc egalitatea:

$$f(x) = (T_{n;x_0}f)(x) + (x-x_0)^n (\alpha_{n;x_0}f)(x). \diamond$$

**Exemplul 2.2.6** Pentru funcția exponentială,  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , formula lui Taylor-Young, pentru  $x_0 = 0$ , are forma:

$$\exp x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + x^n (\alpha_{n;0}f)(x),$$

oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$ , unde

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha_{n;0}f)(x) = (\alpha_{n;0}f)(0) = 0. \diamond$$

În baza teoremei 2.2.4, dacă  $I$  este un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție derivabilă de  $n$  ori în  $x_0$ , atunci, pentru fiecare  $x \in I$ , avem

$$(2.2.21) \quad f(x) = (T_{n;x_0}f)(x) + o((x-x_0)^n) \text{ pentru } x \rightarrow x_0.$$

Așadar următoarea teoremă are loc.

**Teorema 2.2.7** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție. Dacă funcția  $f$  este derivabilă de  $n$  ori în punctul  $x_0$ , atunci pentru orice  $x \in I$ , egalitatea (2.2.21) are loc.

Relația (2.2.21) se numește *formula lui Taylor cu restul sub forma lui Peano*.  $\diamond$

### 3. Forme ale restului formulei lui Taylor

**Teorema 2.3.1** (teorema lui Taylor) Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $n+1$  ori pe  $I$ ,  $x_0 \in I$  și  $p \in \mathbb{N}$ . Atunci pentru fiecare  $x \in I \setminus \{x_0\}$ , există cel puțin un punct  $c$  cuprins strict între  $x$  și  $x_0$  astfel încât

$$f(x) = (T_{n;x_0}f)(x) + (R_{n;x_0}f)(x),$$

unde

$$(2.3.22) \quad (R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x-x_0)^p (x-c)^{n-p+1}}{n!p} f^{(n+1)}(c). \diamond$$

### Demonstrație.

Vom arăta, în continuare, că restul  $R_{n;x_0}f$  al formulei lui Taylor se poate scrie sub forma

$$(R_{n;x_0}f)(x) = (x - x_0)^p K,$$

unde  $p \in \mathbb{N}$  și  $K \in \mathbb{R}$ .

Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $(n + 1)$  ori pe  $I$ ,  $p$  un număr natural și  $x$  și  $x_0$  două puncte distincte din  $I$ . Fie  $K \in \mathbb{R}$  astfel încât să avem

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ &\quad \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + (x - x_0)^p K. \end{aligned}$$

Funcția  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ , definită, pentru orice  $t \in I$ , prin

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= f(t) + \frac{f^{(1)}(t)}{1!}(x - t) + \frac{f^{(2)}(t)}{2!}(x - t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n + \\ &\quad + (x - t)^p K, \end{aligned}$$

este derivabilă pe  $I$ , deoarece toate funcțiile din membrul drept sunt derivabile pe  $I$ .

Întrucât  $\varphi(x_0) = \varphi(x) = f(x)$ , deducem că funcția  $\varphi$  satisfac ipotezele teoremei lui Rolle pe intervalul închis cu extremitățile  $x_0$  și  $x$ ; atunci există cel puțin un punct  $c$  cuprins strict între  $x_0$  și  $x$  astfel încât  $\varphi'(c) = 0$ . Deoarece

$$\varphi'(t) = \frac{(x - t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) - p(x - t)^{p-1} K, \text{ oricare ar fi } t \in I,$$

egalitatea  $\varphi'(c) = 0$  devine

$$\frac{(x - c)^n}{n!} f^{(n+1)}(c) - p(x - c)^{p-1} K = 0,$$

de unde rezultă

$$K = \frac{(x - c)^{n-p+1}}{n!p} f^{(n+1)}(c).$$

Prin urmare, restul  $R_{n;x_0}f$  are forma

$$(R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x - x_0)^p (x - x_0)^{n-p+1}}{n!p} f^{(n+1)}(c).$$

■ Forma generală a restului, dată în formula (2.3.22), a fost obținută, în mod independent, de **Schlömilch** și **Roche**, de aceea restul scris sub forma (2.3.22) se numește **restul lui Schlömilch-Roche**.

Două cazuri particulare fuseseră obținute anterior de Lagrange și Cauchy.

Cauchy obține pentru rest formula:

$$(2.3.23) \quad (R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x - x_0)(x - c)^n}{n!} f^{(n+1)}(c),$$

care, evident, este restul lui Schlömilch-Roche pentru  $p = 1$ .

Lagrange obține pentru rest formula:

$$(2.3.24) \quad (R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

care, evident, este restul lui Schlömilch-Roche pentru  $p = n + 1$ .

Dacă  $f$  este o funcție polinomială de gradul  $n$ , atunci, pentru orice  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,

$$(R_{n;x_0}f)(x) = 0, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R}.$$

Acesta a fost cazul studiat de Taylor. Tradiția a consacrat numele de "formula lui Taylor" pentru toate cazurile studiate, afară de unul singur:  $0 \in I$  și  $x_0 = 0$ . Acest caz fusese, studiat anterior lui Taylor de Maclaurin. Tradiția a consacrat următoarea definiție.

**Definiția 2.3.2** Formula lui Taylor de ordin  $n$  corespunzătoare funcției  $f$  și punctului  $x_0 = 0$ , cu restul lui Lagrange, se numește **formula lui Maclaurin**. (1698 - 1746). ◇

**Exemplul 2.3.3** Pentru funcția exponențială  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  formula lui Maclaurin este

$$\exp x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + (R_{n;0}f)(x),$$

unde

$$(R_{n;0} \exp)(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(c), \text{ cu } |c| < |x|.$$

Avem

$$|(R_{n;0} \exp)(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \exp(c) < \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \exp|x|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Cum pentru fiecare  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \exp|x| = 0,$$

deducem că seria

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots,$$

este convergentă pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , și suma ei este  $\exp x$ , adică

$$\exp x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R}. \diamond$$

Similar obținem că pentru orice  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,

$$a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!}x + \frac{\ln^2 a}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\ln^n a}{n!}x^n + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}. \diamond$$

Deoarece în teorema 2.3.1,  $c$  este cuprins strict între  $x$  și  $x_0$ , deducem că numărul

$$\theta = \frac{c - x_0}{x - x_0} \in ]0, 1[$$

și

$$c = x_0 + \theta(x - x_0).$$

Atunci restul  $R_{n;x_0}f$  se poate exprima și astfel:

$$(2.3.25) \quad (R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1} (1 - \theta)^{n-p+1}}{n!p} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0)),$$

(Schlömilch – Roche)

$$(2.3.26) \quad (R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1} (1 - \theta)^n}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0)) \quad (\text{Cauchy})$$

$$(2.3.27) \quad (R_{n;x_0}f)(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0)) \quad (\text{Lagrange}).$$

Așadar am obținut următoarea teoremă.

**Teorema 2.3.4** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $n+1$  ori pe  $I$ ,  $x_0 \in I$  și  $p \in \mathbb{N}$ . Atunci pentru fiecare  $x \in I \setminus \{x_0\}$ , există cel puțin un număr  $\theta \in ]0, 1[$  astfel încât să avem

$$f(x) = (T_{n;x_0}f)(x) + (R_{n;x_0}f)(x),$$

unde  $(R_{n;x_0}f)(x)$  este dat de (2.3.25).

Dacă  $p = 1$ , obținem (2.3.26), iar dacă  $p = n+1$  atunci  $(R_{n;x_0}f)(x)$  este dat de (2.3.27).  $\diamond$

**Exemplul 2.3.5** Pentru funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x) = \exp x, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R},$$

formula lui Maclaurin este

$$\exp x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + (R_{n;0}f)(x),$$

unde

$$R_{n;0}f(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(\theta x), \quad \theta \in ]0, 1[, \quad x \in \mathbb{R}. \quad \diamond$$

#### 4. Probleme propuse spre rezolvare

**Exemplul 2.4.1** Scrieți polinomul lui Taylor de ordinul  $n = 2m - 1$  atașat funcției sinus,  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , și punctului  $x_0 = 0$ .

**Exemplul 2.4.2** Scrieți polinomul lui Taylor de ordinul  $n = 2m$  atașat funcției cosinus,  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și punctului  $x_0 = 0$ .

**Exemplul 2.4.3** Scrieți formula lui Maclaurin de ordinul  $n$  pentru funcția sinus,  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Exemplul 2.4.4** Scrieți formula lui Maclaurin de ordinul  $n$  pentru funcția cosinus,  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Exemplul 2.4.5** Scrieți formula lui Maclaurin de ordinul  $n$  pentru funcția  $f : ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x) = \ln(1+x), \text{ oricare ar fi } x \in ]-1, +\infty[.$$

**Exemplul 2.4.6** Scrieți formula lui Maclaurin de ordinul  $n$  pentru funcția  $f : ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x) = (1+x)^r, \text{ oricare ar fi } x \in ]-1, +\infty[,$$

unde  $r \in \mathbb{R}$ .

**Exemplul 2.4.7** Fie  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  funcția definită prin  $f(x) = 1/x$ , oricare ar fi  $x \in ]0, +\infty[$ . Să se scrie formula lui Taylor de ordinul  $n$  corespunzătoare funcției  $f$  și punctului  $x_0 = 1$ .

**Exemplul 2.4.8** Să se scrie formula lui Maclaurin de ordinul  $n$  corespunzătoare funcției, folosind acolo unde este cazul formula de derivarea a produsului a două funcții

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)} :$$

- a)  $f : ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = x \ln(1+x)$ , oricare ar fi  $x \in ]-1, +\infty[$ ;
- b)  $f : ]-\infty, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = x \ln(1-x)$ , oricare ar fi  $x \in ]-\infty, 1[$ ;
- c)  $f : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = \sqrt{3x+4}$ , oricare ar fi  $x \in ]-1, 1[$ ;
- d)  $f : ]-1/2, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = 1/\sqrt{2x+1}$ , oricare ar fi  $x \in ]-1/2, +\infty[$ .

**Exemplul 2.4.9** Să se scrie formula lui Taylor de ordinul  $n$  corespunzătoare funcției  $f$  și punctului  $x_0$ , dacă:

- a)  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  este definită prin  $f(x) = 1/x$ , oricare ar fi  $x \in ]0, +\infty[$  și  $x_0 = 2$ ;
- b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  este definită prin  $f(x) = \cos(x - 1)$ , oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$  și  $x_0 = 1$ .

**Observația 2.4.10** Pentru mai multe detalii puteți consulta [5] și [2].



## CAPITOLUL 3

### Integrala Riemann

Noțiunea de integrală a apărut din nevoie practică de a determina aria unor figuri plane, precum și din considerente de fizică. Calculul integral, aşa cum îl concepem azi, a fost dezvoltat în secolul al XVII-lea de către Newton și Leibniz. Newton numește *fluxiune* - derivata și *fluentă* - primitiva. Leibniz introduce simbolurile  $d$  și  $\int$  și deduce regulile de calcul ale integralelor nedefinite.

Definiția riguroasă a integralei, ca limita sumelor integrale, aparține lui Cauchy (1821). Prima demonstrație corectă a existenței integralei unei funcții continue este dată de Darboux în 1875. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Riemann, Du Bois-Reymond și Lebesque dau condiții pentru integrabilitatea funcțiilor discontinue. În 1894, Stieltjes introduce o nouă integrală, iar în 1902, Lebesque formulează noțiunea mai generală de integrală.

#### 1. Diviziuni ale unui interval compact

**Definiția 3.1.1** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$ . Se numește **diviziune a intervalului**  $[a, b]$  orice sistem ordonat

$$\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p)$$

de  $p + 1$  puncte  $x_0, x_1, \dots, x_p$  din intervalul  $[a, b]$  cu proprietatea că

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{p-1} < x_p = b. \quad \square$$

Dacă  $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p)$  este o diviziune a intervalului  $[a, b]$ , atunci  $x_0, x_1, \dots, x_p$  se numesc **puncte ale diviziunii**  $\Delta$ .

Vom nota cu  $\text{Div } [a, b]$  mulțimea formată din toate diviziunile intervalului  $[a, b]$ , deci

$$\text{Div } [a, b] = \{\Delta : \Delta \text{ este diviziune a intervalului } [a, b]\}.$$

Dacă  $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p)$  este o diviziune a intervalului  $[a, b]$ , atunci numărul

$$\|\Delta\| = \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_p - x_{p-1}\}$$

se numește **normă diviziunii**  $\Delta$ .

**Exemplul 3.1.2** Sistemele

$$\Delta^1 = (0, 1), \quad \Delta^2 = (0, 1/3, 1), \quad \Delta^3 = (0, 1/4, 1/2, 3/4, 1)$$

sunt diviziuni ale intervalului  $[0, 1]$ . Aceste diviziuni au norme

$$\|\Delta^1\| = 1, \quad \|\Delta^2\| = 2/3, \quad \|\Delta^3\| = 1/4. \quad \square$$

**Teorema 3.1.3** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$ . Pentru fiecare număr real  $\varepsilon > 0$  există cel puțin o diviziune  $\Delta$  a intervalului  $[a, b]$  cu proprietatea că  $\|\Delta\| < \varepsilon$ .

**Demonstrație.** Fie  $\varepsilon > 0$  și  $p$  un număr natural cu proprietatea că  $(b - a)/p < \varepsilon$ . Dacă  $h = (b - a)/p$ , atunci sistemul ordonat

$$\Delta = (a, a + h, a + 2h, \dots, a + (p - 1)h, b)$$

este o diviziune a intervalului  $[a, b]$ . Mai mult  $\|\Delta\| = h < \varepsilon$ . ■

**Definiția 3.1.4** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p)$  și  $\Delta' = (x'_0, x'_1, \dots, x'_q)$  două diviziuni ale intervalului  $[a, b]$ . Spunem că diviziunea  $\Delta$  este **mai fină** decât diviziunea  $\Delta'$  și scriem  $\Delta \supseteq \Delta'$  (sau  $\Delta' \subseteq \Delta$ ) dacă

$$\{x'_0, x'_1, \dots, x'_q\} \subseteq \{x_0, x_1, \dots, x_p\}. \diamond$$

Teorema următoare afirmă că prin trecerea la o diviziune mai fină, norma diviziunii nu crește.

**Teorema 3.1.5** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $\Delta$  și  $\Delta'$  două diviziuni ale intervalului  $[a, b]$ . Dacă diviziunea  $\Delta$  este mai fină decât diviziunea  $\Delta'$ , atunci  $\|\Delta\| \leq \|\Delta'\|$ .

**Demonstrație.** Este imediată. ■

**Observația 3.1.6** Dacă  $\Delta, \Delta' \in \text{Div } [a, b]$ , atunci din  $\|\Delta\| \leq \|\Delta'\|$  nu rezultă, în general, că  $\Delta' \subseteq \Delta$ . ◇

**Definiția 3.1.7** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$ . Dacă  $\Delta' = (x'_0, x'_1, \dots, x'_p)$  și  $\Delta'' = (x''_0, x''_1, \dots, x''_q)$  sunt diviziuni ale intervalului  $[a, b]$ , atunci diviziunea  $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_r)$  a intervalului  $[a, b]$  ale cărei puncte sunt elementele mulțimii  $\{x'_0, x'_1, \dots, x'_p\} \cup \{x''_0, x''_1, \dots, x''_q\}$ , luate în ordine strict crescătoare, se numește **reuniunea** lui  $\Delta'$  cu  $\Delta''$  și se notează cu  $\Delta' \cup \Delta''$ . ◇

**Teorema 3.1.8** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$ . Dacă  $\Delta'$  și  $\Delta''$  sunt diviziuni ale intervalului  $[a, b]$ , atunci

1º  $\Delta' \cup \Delta'' \supseteq \Delta'$  și  $\Delta' \cup \Delta'' \supseteq \Delta''$ .

2º  $\|\Delta' \cup \Delta''\| \leq \|\Delta'\|$  și  $\|\Delta' \cup \Delta''\| \leq \|\Delta''\|$ .

**Demonstrație.** Este imediată. ■

**Definiția 3.1.9** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p) \in \text{Div}[a, b]$ . Se numește **sistem de puncte intermediare atașat diviziunii**  $\Delta$  orice sistem  $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$  de  $p$  puncte  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p \in [a, b]$  care satisfac relațiile

$$x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i, \text{ oricare ar fi } i \in \{1, \dots, p\}. \diamond$$

Vom nota cu  $\text{Pi}(\Delta)$  mulțimea formată din toate sistemele de puncte intermediare atașate diviziunii  $\Delta$ , deci

$$\text{Pi}(\Delta) = \{\xi : \xi \text{ este sistem de puncte intermediare atașat diviziunii } \Delta\}.$$

## 2. Integrala Riemann

**Definiția 3.2.1** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$ ,  $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p)$  o diviziune a intervalului  $[a, b]$ ,  $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$  un sistem de puncte intermediare atașat diviziunii  $\Delta$  și  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție. Numărul real

$$\sigma(f; \Delta, \xi) = \sum_{i=1}^p f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

se numește **suma Riemann** atașată funcției  $f$  diviziunii  $\Delta$  și sistemului  $\xi$ .  $\square$

**Definiția 3.2.2** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Spunem că funcția  $f$  este **integrabilă Riemann** pe  $[a, b]$  (sau, simplu, **integrabilă**) dacă oricare ar fi sirul  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div}[a, b]$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și oricare ar fi sirul  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ), sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) este convergent.  $\square$

**Teorema 3.2.3** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Funcția  $f$  este integrabilă Riemann pe  $[a, b]$  dacă și numai dacă există un număr real  $I$  cu proprietatea că pentru fiecare sir  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div}[a, b]$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și pentru fiecare sir  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ), sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) este convergent către  $I$ .

**Demonstrație. Necesitatea.** Fie  $(\tilde{\Delta}^n)_{n \in \mathbb{N}}$  sirul de diviziuni cu termenul general:

$$\tilde{\Delta}^n = (a, a + h, a + 2h, \dots, a + (n - 1)h, b), \quad (n \in \mathbb{N})$$

și  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  sirul cu termenul general:

$$\tilde{\xi}^n = (a, a + h, a + 2h, \dots, a + (n - 1)h), \quad (n \in \mathbb{N})$$

unde

$$h := \frac{b - a}{n}.$$

Evident, pentru fiecare  $n \in \mathbb{N}$  avem:

$$\tilde{\Delta}^n \in \text{Div } [a, b], \quad \|\tilde{\Delta}^n\| = \frac{(b-a)}{n} \quad \text{și} \quad \tilde{\xi}^n \in \text{Pi}(\tilde{\Delta}^n).$$

Atunci sirul  $(\sigma(f; \tilde{\Delta}^n, \tilde{\xi}^n))_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent; fie  $I \in \mathbb{R}$  limita sirului  $(\sigma(f; \tilde{\Delta}^n, \tilde{\xi}^n))_{n \in \mathbb{N}}$ .

Vom arăta că oricare ar fi sirul  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni ale intervalului  $[a, b]$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și oricare ar fi sirul  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ), sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) este convergent către  $I$ .

Fie deci  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  un sir de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div } [a, b]$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și fie  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  un sir de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ). Atunci sirurile  $(\underline{\Delta}^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(\underline{\xi}^n)_{n \in \mathbb{N}}$ , unde

$$\underline{\Delta}^n = \begin{cases} \tilde{\Delta}^k, & \text{dacă } n = 2k \\ \Delta^k, & \text{dacă } n = 2k + 1, \end{cases} \quad \underline{\xi}^n = \begin{cases} \tilde{\xi}^k, & \text{dacă } n = 2k \\ \xi^k, & \text{dacă } n = 2k + 1, \end{cases}$$

au următoarele proprietăți:

- i)  $\underline{\Delta}^n \in \text{Div } [a, b]$ ,  $\underline{\xi}^n \in \text{Pi}(\underline{\Delta}^n)$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ;
- ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\underline{\Delta}^n\| = 0$ .

In baza ipotezei, sirul  $(\sigma(f; \underline{\Delta}^n, \underline{\xi}^n))_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent; fie  $\underline{I}$  limita lui. Tinând seama că sirul  $(\sigma(f; \tilde{\Delta}^n, \tilde{\xi}^n))_{n \in \mathbb{N}}$  este subșir al sirului convergent  $(\sigma(f; \underline{\Delta}^n, \underline{\xi}^n))_{n \in \mathbb{N}}$ , deducem că  $\underline{I} = I$ . Intrucât  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  este subșir al sirului convergent  $(\sigma(f; \underline{\Delta}^n, \underline{\xi}^n))_{n \in \mathbb{N}}$ , obținem că sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge către  $I$ .

**Suficiența** rezultă imediat din definiție. ■

**Teorema 3.2.4** (unicitatea integralei) *Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Atunci există cel mult un număr real  $I$  cu proprietatea că pentru fiecare sir  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div } [a, b]$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și pentru fiecare sir  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ), sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) este convergent către  $I$ . □*

Prin urmare, fiind dată o funcție  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  putem avea numai una din următoarele două situații:

a) există un număr real  $I$  cu proprietatea că pentru fiecare sir  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div } [a, b]$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și fiecare sir  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ), sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) este convergent către  $I$ .

In acest caz, în baza teoremei 3.2.4, numărul real  $I$  este unic. Numărul real  $I$  se va numi **integrala Riemann a funcției  $f$  pe intervalul  $[a, b]$**  și se va nota cu:

$$I := \int_a^b f(x) dx.$$

b) Nu există nici un număr real  $I$  cu proprietatea că pentru fiecare sir  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div}[a, b]$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și fiecare sir  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ ,  $(n \in \mathbb{N})$ , sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  este convergent către  $I$ . In acest caz funcția  $f$  nu este integrabilă Riemann pe  $[a, b]$ . Prin urmare o funcție  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  nu este integrabilă Riemann pe  $[a, b]$  dacă și numai dacă oricare ar fi numărul real  $I$  există un sir  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de diviziuni  $\Delta^n \in \text{Div}[a, b]$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$  și un sir  $(\xi^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de sisteme  $\xi^n \in \text{Pi}(\Delta^n)$ ,  $(n \in \mathbb{N})$ , cu proprietatea că sirul  $(\sigma(f; \Delta^n, \xi^n))_{n \in \mathbb{N}}$  al sumelor Riemann  $\sigma(f; \Delta^n, \xi^n)$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  nu converge către  $I$ .

### 3. Primitive

În această secțiune vom introduce o clasă importantă de funcții reale și anume **clasa funcțiilor care admit primitive**. Conceptul de **primitivă** leagă între ele două concepte fundamentale ale Analizei Matematice: **derivata** și **integrala**. Vom aborda probleme de natură **calitativă** privind studiul existenței primitivelor precum și de natură **calculatorie** relative la metode de calcul de primitive.

**Definiția 3.3.1** Fie  $D$  o submulțime nevidă a mulțimii numerelor reale  $\mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție și  $I$  o submulțime nevidă a mulțimii  $D$ . Spunem că funcția  $f$  **admite primitive** (sau că este **primitivabilă**) pe  $I$  dacă există o funcție  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât:

- i) funcția  $F$  este derivabilă pe  $I$ ;
- ii)  $F'(x) = f(x)$ , oricare ar fi  $x \in I$ .

Dacă funcția  $f$  admite primitive pe mulțimea de definiție  $D$ , atunci spunem simplu că funcția  $f$  **admite primitive** (sau că este **primitivabilă**).  $\square$

**Exemplul 3.3.2** Funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = x$ , oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$ , admite primitive pe  $\mathbb{R}$  deoarece funcția derivabilă  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $F(x) = x^2/2$ , oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$ , are proprietatea că  $F' = f$ .  $\square$

**Definiția 3.3.3** Fie  $D$  o submulțime nevidă a mulțimii numerelor reale  $\mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție și  $I$  o submulțime nevidă a mulțimii  $D$ . Se numește **primitivă a funcției  $f$  pe mulțimea  $I$**  orice funcție  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  care satisface următoarele proprietăți:

- i) funcția  $F$  este derivabilă pe  $I$ ;
- ii)  $F'(x) = f(x)$ , oricare ar fi  $x \in I$ .

Dacă  $F$  este o primitivă a funcției  $f$  pe mulțimea de definiție  $D$  a funcției  $f$ , atunci se spune simplu că funcția  $F$  este primitivă a funcției  $f$ .  $\square$

**Teorema 3.3.4** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție. Dacă  $F_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$  și  $F_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$  sunt două primitive ale funcției  $f$  pe  $I$ , atunci există un număr real  $c$  astfel încât

$$F_2(x) = F_1(x) + c, \text{ oricare ar fi } x \in I.$$

(Oricare două primitive ale unei funcții primitivabile diferă printr-o constantă).

**Demonstrație.** Funcțiile  $F_1$  și  $F_2$  fiind primitive ale funcției  $f$ , sunt derivabile și  $F'_1 = F'_2 = f$ , deci

$$(F_2 - F_1)' = F'_2 - F'_1 = 0.$$

Funcția derivabilă  $F_2 - F_1$  având derivata nulă pe intervalul  $I$ , este constantă pe acest interval. Prin urmare, există un număr real  $c$  astfel încât

$$F_2(x) - F_1(x) = c, \text{ oricare ar fi } x \in I.$$

■

**Observația 3.3.5** În teorema 3.3.4, ipoteza că mulțimea  $I$  este interval este esențială. Intr-adevăr, pentru funcția  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x) = 0, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

funcțiile  $F_1, F_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  definite prin

$$F_1(x) = 0, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

respectiv

$$F_2(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ 1, & \text{dacă } x > 0, \end{cases}$$

sunt primitive ale funcției  $f$  pe  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Să observăm că nu există  $c \in \mathbb{R}$  ca să avem  $F_2(x) = F_1(x) + c$ , oricare ar fi  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Subliniem faptul că  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  nu este interval.  $\square$

**Definiția 3.3.6** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție care admite primitive pe intervalul  $I$ . Mulțimea tuturor primitivelor funcției  $f$  pe intervalul  $I$  se numește **integrală nedefinită** a funcției  $f$  pe intervalul  $I$  și se notează cu simbolul

$$\int f(x) dx, \quad x \in I.$$

Operația de calculare a primitivelor funcției  $f$  se numește **integrare**.

**Observația 3.3.7** Menționăm că simbolul  $\int f(x) dx$  trebuie privit ca o notație individuală, adică părților  $\int$  sau  $dx$ , luate separat, nu li se atribuie nici o semnificație.  $\square$

Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$  și  $\mathfrak{F}(I; \mathbb{R})$  mulțimea tuturor funcțiilor definite pe  $I$  cu valori în  $\mathbb{R}$ . Dacă  $\mathcal{G}$  și  $\mathcal{H}$  sunt submulțimi nevide ale lui  $\mathfrak{F}(I, \mathbb{R})$  și  $a$  este un număr real, atunci

$$\mathcal{G} + \mathcal{H} = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : \text{există } g \in \mathcal{G} \text{ și } h \in \mathcal{H} \text{ astfel încât } f = g + h\},$$

și

$$a\mathcal{G} = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : \text{există } g \in \mathcal{G} \text{ astfel încât } f = ag\}.$$

Dacă  $\mathcal{G}$  este formată dintr-un singur element  $g_0$ , adică  $\mathcal{G} = \{g_0\}$ , atunci în loc de  $\mathcal{G} + \mathcal{H} = \{g_0\} + \mathcal{H}$  vom scrie simplu  $g_0 + \mathcal{H}$ .

In cele ce urmează vom nota cu  $\mathcal{C}$  mulțimea tuturor funcțiilor constante definite pe  $I$  cu valori în  $\mathbb{R}$ , adică

$$\mathcal{C} = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : \text{există } c \in \mathbb{R} \text{ astfel încât } f(x) = c, \text{ oricare ar fi } x \in I\}.$$

Se constată imediat că:

a)  $\mathcal{C} + \mathcal{C} = \mathcal{C}$ ;

b)  $a\mathcal{C} = \mathcal{C}$ , oricare ar fi  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ ,

adică suma a două funcții constante este tot o funcție constantă, iar o funcție constantă înmulțită cu un număr real este tot o funcție constantă.

Cu aceste observații, să ne reamintim că dacă  $F_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$  este o primitivă a funcției  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  pe intervalul  $I \subseteq \mathbb{R}$ , atunci orice altă primitivă  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  a lui  $f$  pe  $I$  este de forma  $F = F_0 + c$ , unde  $c : I \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție constantă, adică  $c \in \mathcal{C}$ . Atunci

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \{F \in \mathfrak{F}(I, \mathbb{R}) : F \text{ este primitivă a lui } f \text{ pe } I\} = \\ &= \{F_0 + c : c \in \mathcal{C}\} = F_0 + \mathcal{C}. \end{aligned}$$

**Observația 3.3.8** Fie  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție care admite primitive pe  $I$  și fie  $F_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$  o primitivă a funcției  $f$  pe  $I$ . Înănd seama de observația 3.3.5, avem că

$$\int f(x) dx = \{F : I \rightarrow \mathbb{R} : F \text{ este primitivă a funcției } f\} = F_0 + \mathcal{C}.$$

Rezultă că

$$\int f(x) dx + \mathcal{C} = (F_0 + \mathcal{C}) + \mathcal{C} = F_0 + (\mathcal{C} + \mathcal{C}) = F_0 + \mathcal{C},$$

deci

$$\int f(x) dx + \mathcal{C} = \int f(x) dx.$$

**Observația 3.3.9** Dacă funcția  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  admite primitive pe intervalul  $I$  și  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  este o primitivă a funcției  $f$  pe  $I$ , atunci

$$\int f(x)dx = F + C$$

sau

$$\int F'(x)dx = F + C.$$

**3.1. Primitivitatea funcțiilor continue.** În cele ce urmează vom arăta că funcțiile continue admit primitive.

**Teorema 3.3.10** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție local integrabilă Riemann pe  $I$ . Dacă funcția  $f$  este continuă în punctul  $x_0$ , atunci pentru orice  $a \in I$ , funcția  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \text{ oricare ar fi } x \in I,$$

este derivabilă în punctul  $x_0$  și  $F'(x_0) = f(x_0)$ .

**Demonstratie.** Evident  $F(a) = 0$ . Fie  $\varepsilon > 0$ . Deoarece funcția  $f$  este continuă în  $x_0$ , există un număr real  $\delta > 0$  astfel încât pentru orice  $t \in I$  cu  $|t - x_0| < \delta$  să avem

$$|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon/2,$$

sau echivalent

$$f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(t) < f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fie  $x \in I \setminus \{x_0\}$  cu  $|x - x_0| < \delta$ . Distingem două cazuri:

Cazul 1:  $x > x_0$ ; atunci, pentru fiecare  $t \in [x_0, x]$ , avem

$$f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(t) < f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2},$$

și deci

$$\int_{x_0}^x \left( f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \right) dt \leq \int_{x_0}^x f(t) dt \leq \int_{x_0}^x \left( f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2} \right) dt,$$

de unde rezultă că

$$\left( f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \right) (x - x_0) \leq F(x) - F(x_0) \leq \left( f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2} \right) (x - x_0),$$

sau echivalent

$$f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \leq f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Prin urmare

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| < \varepsilon$$

Cazul 2:  $x > x_0$ ; atunci pentru fiecare  $t \in [x_0, x]$ , avem

$$f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(t) < f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2},$$

și deci

$$\int_x^{x_0} \left( f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \right) dt \leq \int_x^{x_0} f(t) dt \leq \int_x^{x_0} \left( f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2} \right) dt,$$

de unde rezultă că

$$\left( f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \right) (x_0 - x) \leq F(x_0) - F(x) \leq \left( f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2} \right) (x_0 - x),$$

sau echivalent

$$f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \leq f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Prin urmare

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| < \varepsilon$$

Așadar, oricare ar fi  $x \in I \setminus \{x_0\}$  cu  $|x - x_0| < \delta$  avem

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| < \varepsilon.$$

Rezultă că există

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0),$$

deci  $F$  este derivabilă în punctul  $x_0$  și  $F'(x_0) = f(x_0)$ . ■

**Observația 3.3.11** Dacă funcția  $F$  din teorema 3.3.10 este derivabilă în punctul  $x_0$ , nu rezultă că funcția  $f$  este continuă în punctul  $x_0$ . Într-adevăr, funcția  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = \lfloor x \rfloor$ , oricare ar fi  $x \in [0, 1]$ , nu este continuă în punctul  $x_0 = 1$ , în timp ce funcția  $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x 0 dt = 0, \text{ oricare ar fi } x \in [0, 1],$$

este derivabilă în punctul 1. ◇

**Teorema 3.3.12** (*teorema de existență a primitivelor unei funcții continue*) Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Dacă funcția  $f$  este continuă pe intervalul  $I$ , atunci funcția  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \text{ oricare ar fi } x \in I,$$

este o primitivă a funcției  $f$  pe  $I$  cu proprietatea că  $F(a) = 0$ .

**Demonstratie.** Se aplică teorema 3.3.10. ■

**Teorema 3.3.13** (teorema de reprezentare a primitivelor funcțiilor continue) Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă pe  $I$ . Dacă  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  este o primitivă a funcției  $f$  pe  $I$  cu proprietatea că  $F(a) = 0$ , atunci

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \text{ oricare ar fi } x \in I.$$

**Demonstrație.** În baza teoremei de existență a primitivelor unei funcții continue (teorema 3.3.12), funcția  $F_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F_1(x) = \int_a^x f(t)dt, \text{ oricare ar fi } x \in I,$$

este o primitivă a funcției  $f$  pe  $I$ . Atunci există  $c \in \mathbb{R}$  astfel încât  $F(x) = F_1(x) + c$ , oricare ar fi  $x \in I$ . Deoarece  $F(a) = F_1(a) = 0$ , deducem ca  $c = 0$  și teorema este demonstrată. ■

**Teorema 3.3.14** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție local integrabilă pe  $I$ . Dacă funcția  $f$  este mărginită pe  $I$ , atunci pentru orice  $a \in I$ , funcția  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \text{ oricare ar fi } x \in I,$$

este lipschitziană pe  $I$ .

**Demonstrație.** Funcția  $f$  este mărginită pe  $I$ , atunci există un număr real  $M > 0$  astfel încât

$$|f(t)| \leq M, \text{ oricare ar fi } t \in I.$$

De aici deducem că, pentru orice  $u, v \in I$ , avem

$$|F(u) - F(v)| = \left| \int_u^v f(t)dt \right| \leq \left| \int_u^v |f(t)|dt \right| \leq M|u - v|,$$

prin urmare funcția  $F$  este lipschitziană. ■

#### 4. Formula lui Leibniz-Newton

**Teorema 3.4.1** (teorema lui Leibniz – Newton) Fie  $a, b \in \mathbb{R}$  cu  $a < b$  și  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție. Dacă:

(i) funcția  $f$  este integrabilă Riemann pe  $[a, b]$ ;

(ii) funcția  $f$  admite primitive pe  $[a, b]$ ,

atunci pentru orice primitivă  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  a funcției  $f$  are loc egalitatea

$$(3.4.28) \quad \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

**Demonstrație.** Fie  $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  un sir de diviziuni  $\Delta^n = (x_0^n, \dots, x_{p_n}^n)$  ale intervalului  $[a, b]$  astfel încât  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta^n\| = 0$ . În baza teoremei de medie a calculului diferențial aplicată

restricției funcției  $F$  la intervalul  $[x_{i-1}^n, x_i^n]$ , ( $n \in \mathbb{N}$ ) deducem că pentru fiecare număr natural  $n$  și pentru fiecare  $i \in \{1, \dots, p_n\}$  există un punct  $\xi_i^n \in ]x_{i-1}^n, x_i^n[$  cu proprietatea că

$$F(x_i^n) - F(x_{i-1}^n) = F'(\xi_i^n)(x_i^n - x_{i-1}^n).$$

Cum, prin ipoteză,  $F'(x) = f(x)$ , oricare ar fi  $x \in [a, b]$ , avem că

$$F(x_i^n) - F(x_{i-1}^n) = f(\xi_i^n)(x_i^n - x_{i-1}^n),$$

oricare ar fi numărul natural  $n$  și oricare ar fi  $i \in \{1, \dots, p_n\}$ .

Evident, pentru fiecare număr natural  $n$  avem  $\xi^n = (\xi_1^n, \dots, \xi_{p_n}^n) \in \text{Pi}(\Delta^n)$ . Intrucât

$$\begin{aligned} \sigma(f; \Delta^n, \xi^n) &= \sum_{i=1}^{p_n} f(\xi_i^n)(x_i^n - x_{i-1}^n) = \sum_{i=1}^{p_n} F(x_i^n) - F(x_{i-1}^n) = \\ &= F(b) - F(a), \text{ oricare ar fi } n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

deoarece

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f; \Delta^n, \xi^n),$$

obținem că

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Teorema este demonstrată. ■

**Notăție:** În loc de  $F(b) - F(a)$  se folosesc frecvent notațiile

$$F(x)|_a^b \quad \text{sau} \quad [F(x)]_a^b$$

care se citesc:  $F(x)$  luat între  $a$  și  $b$ .

Egalitatea (3.4.28) se numește **formula lui Leibniz-Newton**.

**Exemplul 3.4.2** Funcția  $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)}, \text{ oricare ar fi } x \in [1, 2],$$

este continuă pe  $[1, 2]$ . Atunci funcția  $f$  este integrabilă Riemann pe  $[1, 2]$ . Pe de altă parte, funcția  $f$  admite primitive pe intervalul  $[1, 2]$  și  $F : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F(x) = \ln x - \ln(x+1), \text{ oricare ar fi } x \in [1, 2],$$

este o primitivă a funcției  $f$  pe  $[1, 2]$ . În baza formulei lui Leibniz-Newton (teorema 3.4.1), obținem

$$\int_1^2 \frac{1}{x(x+1)} dx = [\ln x - \ln(x+1)]_1^2 = \ln \frac{4}{3}. \square$$

## 5. Metode de calcul a primitivelor

**5.1. Integrarea prin părți.** Folosind formula de derivare a produsului a două funcții derivabile și rezultatul că orice funcție continuă pe un interval admite primitive pe acel interval, obținem teorema următoare:

**Teorema 3.5.1** (formula de integrare prin părți) *Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$  și  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Dacă:*

- (i) *funcțiile  $f$  și  $g$  sunt derivabile pe  $I$ ,*
  - (ii) *derivatele  $f'$  și  $g'$  sunt continue pe  $I$ ,*
- atunci funcțiile  $fg'$  și  $f'g$  admit primitive pe  $I$  și are loc egalitatea:*

$$\int (fg') (x) dx = fg - \int (f'g) (x) dx.$$

*(formula integrării prin părți)*

**Observația 3.5.2** Schematic, formula de integrare prin părți se scrie

$$\int f g' = fg - \int f' g.$$

**Exemplul 3.5.3** Să se calculeze integrala

$$\int x \ln x dx, \quad x \in ]0, +\infty[;$$

**Soluție.** Considerăm funcțiile  $f, g : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definite prin

$$f(x) = \ln x, \quad g'(x) = x, \quad \text{oricare ar fi } x \in ]0, +\infty[.$$

Deducem  $g(x) = \frac{x^2}{2}$ , oricare ar fi  $x \in ]0, +\infty[$ . Aplicând formula integrării prin părți, obținem

$$\begin{aligned} \int x \ln x dx &= \frac{x^2}{x} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C, \quad x \in ]0, +\infty[. \end{aligned}$$

■

**5.2. Metoda schimbării de variabilă.** Metoda schimbării de variabilă are la bază formula derivării unei funcții compuse.

**Teorema 3.5.4** (*prima metodă de schimbare de variabilă*) *Fie  $I$  și  $J$  două intervale din  $\mathbb{R}$  și  $f : J \rightarrow \mathbb{R}$  și  $u : I \rightarrow \mathbb{R}$  două funcții. Dacă*

- (i)  $u(I) \subseteq J$ ;
- (ii) *funcția  $u$  este derivabilă pe  $I$ ;*
- (iii) *funcția  $f$  admite primitive pe  $J$ ,*

*atunci funcția  $(f \circ u) u'$  admite primitive pe  $I$ .*

*Mai mult, dacă  $F : J \rightarrow \mathbb{R}$  este o primitivă a funcției  $f$  pe  $J$ , atunci funcția  $F \circ u$  este o primitivă a funcției  $(f \circ u) u'$  pe  $I$  și are loc egalitatea*

$$\int f(u(x)) u'(x) dx = F \circ u + C.$$

**Observația 3.5.5** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ . Pentru a calcula primitivele funcției primitiveabile  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ , adică pentru a calcula integrala

$$\int g(x) dx,$$

folosind metoda schimbării de variabilă, parcurgem următoarele trei etape:

1<sup>0</sup> Punem în evidență, în expresia funcției  $g$ , o funcție derivabilă  $u : I \rightarrow \mathbb{R}$  și o funcție primitivabilă  $f : u(I) \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $g(x) = f(u(x)) u'(x)$ , oricare ar fi  $x \in I$ .

2<sup>0</sup> Determinăm o primitivă  $F : u(I) \rightarrow \mathbb{R}$  a funcției  $f$  pe  $u(I)$ , adică

$$\int f(t) dt = F + C.$$

3<sup>0</sup> O primitivă a funcției  $g = (f \circ u) u'$  pe  $I$  este  $F \circ u$ , adică

$$\int g(x) dx = F \circ u + C,$$

sau, echivalent,

$$\int g(x) dx = F(u(x)) + C, \quad x \in I.$$

**Exemplul 3.5.6** Să se calculeze integrala

$$\int \cot x dx, \quad x \in ]0, \pi[.$$

**Soluție.** Avem  $I = ]0, \pi[$  și  $g(x) = \cot x$ , oricare ar fi  $x \in ]0, \pi[$ . Deoarece

$$g(x) = \frac{1}{\sin x} (\sin x)', \quad \text{oricare ar fi } x \in ]0, \pi[,$$

luăm  $u : ]0, \pi[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $u(x) = \sin x$ , oricare ar fi  $x \in ]0, \pi[$  și  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(t) = 1/t$ , oricare ar fi  $t \in ]0, +\infty[$ . Evident

$$g(x) = f(u(x)) u'(x), \text{ oricare ar fi } x \in ]0, +\infty[.$$

O primitivă a funcției  $f$  pe  $]0, +\infty[$  este funcția  $F : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$F(t) = \ln t, \text{ oricare ar fi } t \in ]0, +\infty[,$$

adică

$$\int f(t) dt = \int \frac{1}{t} dt = \ln t + C, \quad t \in ]0, +\infty[.$$

Atunci o primitivă a funcției  $g$  pe  $]0, +\infty[$  este  $F \circ u$ , adică avem

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C, \quad x \in ]0, \pi[.$$

■

**Teorema 3.5.7** (a doua metodă de schimbare de variabilă) Fie  $I$  și  $J$  două intervale din  $\mathbb{R}$  și  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  și  $u : J \rightarrow I$  două funcții. Dacă:

- (i) funcția  $u$  este bijectivă;
- (ii) funcția  $u$  este derivabilă pe  $J$  și  $u'(x) \neq 0$ , oricare ar fi  $x \in J$ ;
- (iii) funcția  $h = (f \circ u) u'$  admite primitive pe  $J$ ,

atunci funcția  $f$  admite primitive pe  $I$ .

Mai mult, dacă  $H : J \rightarrow \mathbb{R}$  este o primitivă a funcției  $h = (f \circ u) u'$  pe  $J$ , atunci funcția  $H \circ u^{-1}$  este o primitivă a funcției  $f$  pe  $I$ , adică are loc egalitatea

$$\int f(x) dx = H \circ u^{-1} + C.$$

**Observația 3.5.8** Fie  $I$  un interval din  $\mathbb{R}$ . Pentru a calcula primitivele funcției primitive  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , adică pentru a calcula integrala

$$\int f(x) dx,$$

folosind metoda schimbării de variabilă dată de teorema 3.5.7, parcurgem următoarele trei etape:

1<sup>0</sup> Punem în evidență un interval  $J \subseteq \mathbb{R}$  și o funcție  $u : J \rightarrow I$  bijectivă, derivabilă pe  $J$  și cu derivata nenulă pe  $J$  (Se apune că funcția  $u^{-1}$  schimbă variabila  $x$  în variabila  $t$ ).

2<sup>0</sup> Determinăm o primitivă  $H : J \rightarrow \mathbb{R}$  a funcției  $(f \circ u) u'$  pe  $J$ , adică

$$\int f(u(t)) dt = H + C.$$

3<sup>0</sup> O primitivă a funcției  $f$  pe  $I$  este  $H \circ u^{-1}$ , adică

$$\int f(x) dx = H \circ u^{-1} + C,$$

sau, echivalent,

$$\int f(x) dx = H(u^{-1}(x)) + C, \quad x \in I.$$

**Exemplul 3.5.9** Să se calculeze integrala

$$\int \frac{1}{\sin x} dx, \quad x \in ]0, \pi[.$$

Avem  $I := ]0, \pi[$ . Luăm funcția  $u : ]0, +\infty[ \rightarrow ]0, \pi[$  definită prin  $u(t) = 2 \arctan t$ , oricare  $t \in ]0, +\infty[$ . Funcția  $u$  este bijectivă, derivabilă

**Observația 3.5.10** Fie  $I$  și  $J$  două intervale din  $\mathbb{R}$  și  $f : J \rightarrow \mathbb{R}$  și  $u : I \rightarrow J$  două funcții cu următoarele proprietăți:

- (a) funcția  $u$  este bijectivă, derivabilă pe  $I$  cu derivata continuă și nenulă pe  $I$ ;
- (b) funcția  $f$  este continuă pe  $J$ .

Fie  $F : J \rightarrow \mathbb{R}$  o primitivă a funcției  $f$  pe  $J$  (o astfel de primitivă există deoarece  $f$  este continuă pe  $J$ ).

In baza primei metode de schimbare de variabilă (teorema 3.5.4), funcția  $F \circ u$  este o primitivă a funcției  $(f \circ u) u'$  pe  $I$ .

Reciproc, să presupunem că  $H = F \circ u$  este o primitivă a funcției  $(f \circ u) u'$  pe  $I$ . Atunci, în baza celei de a doua metode de schimbare de variabilă (teorema 3.5.7), funcția  $H \circ u^{-1} = F \circ u \circ u^{-1} = F$  este o primitivă a funcției  $f$  pe  $J$ .

Prin urmare, în ipotezele (a) și (b), funcția  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  este o primitivă a funcției  $f$  pe  $J$  dacă și numai dacă funcția  $F \circ u$  este o primitivă a funcției  $(f \circ u) u'$  pe  $I$ . Cu alte cuvinte, în ipotezele (a) și (b), cele două metode de schimbare de variabilă sunt echivalente.

Practic avem o singură metodă de schimbare de variabilă și mai multe variante de aplicare a ei.

**Varianta 1.** Avem de calculat

$$\int f(x) dx, \quad x \in I.$$

Atunci:

1<sup>0</sup> Punem în evidență în expresia lui  $f$ , o funcție  $u : I \rightarrow \mathbb{R}$  și o funcție primitivabilă  $g : u(I) \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât

$$f(x) = g(u(x)) u'(x), \quad \text{oricare ar fi } x \in I.$$

2<sup>0</sup> Facem înlocuirile formale  $u(x) := t$  și  $u'(x) dx := dt$ ; obținem integrala nedefinită

$$\int g(t) dt = G(t) + C, \quad t \in u(I).$$

3<sup>0</sup> Revenim la vechea variabilă  $x$ , punând  $t := u(x)$  în expresia primitivei  $G$ ; obținem

$$\int f(x) dx = G(u(x)) + C, \quad x \in I.$$

**Varianta 2.** Avem de calculat

$$\int f(x) dx, \quad x \in I.$$

Atunci:

1<sup>0</sup> Punem în evidență un interval  $J \subseteq \mathbb{R}$  și o funcție  $u : J \rightarrow I$  bijectivă și derivabilă.

2<sup>0</sup> Facem înlocuirile formale  $x := u(t)$  și  $dx := u'(t) dt$ ; obținem integrala nedefinită

$$\int f(u(t)) u'(t) dt, \quad t \in J,$$

pe care o calculăm. Fie

$$\int f(u(t)) u'(t) dt = H(t) + C, \quad t \in J.$$

3<sup>0</sup> Revenim la vechea variabilă  $x$ , punând  $t := u^{-1}(x)$  în expresia primitivei  $H$ ; obținem

$$\int f(x) dx = H(u^{-1}(x)) + C, \quad x \in I.$$

**Varianta 3.** Avem de calculat

$$\int f(x) dx, \quad x \in I.$$

Atunci:

1<sup>0</sup> Punem în evidență, în expresia lui  $f$ , o funcție injectivă  $u : I \rightarrow \mathbb{R}$  cu  $u^{-1} : u(I) \rightarrow I$  derivabilă, și o funcție  $g : u(I) \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât

$$f(x) = g(u(x)), \text{ oricare ar fi } x \in I.$$

2<sup>0</sup> Facem înlocuirile formale  $u(x) := t$  și  $dx := (u^{-1})'(t) dt$ ; obținem integrala nedefinită

$$\int g(t) (u^{-1})'(t) dt, \quad t \in u(I),$$

pe care o calculăm. Fie

$$\int g(t) (u^{-1})'(t) dt = F(t), \quad t \in u(I),$$

3<sup>0</sup> Revenim la vechea variabilă  $x$ , punând  $t := u(x)$  în expresia primitivei  $F$ ; obținem

$$\int f(x) dx = G(u(x)) + C, \quad x \in I.$$

În toate cele trei variante ale formulei schimbării de variabilă, expuse mai sus, expresia funcției  $u$  se impune din context, analizând expresia funcției  $f$ .

Când se dă o indicație asupra schimbării de variabilă folosite, se spune simplu ”*se face substituția*  $x = u(t)$ ” sau ”*se face substituția*  $t = u(x)$ ”, celelalte elemente rezultând din context.

**Exemplul 3.5.11** Să se calculeze

$$I = \int \frac{\operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} dx, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$$

Se face substituția  $\tan x = t$ , deci  $x := \arctan t$  și  $dx := \frac{1}{1+t^2} dt$ . Se obține

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{t}{(1+t)(1+t^2)} dt = \frac{1}{2} \int \left( \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \\ &= \frac{1}{4} (t^2 + 1) + \frac{1}{2} \arctan t - \frac{1}{2} \ln(t+1) + C, \quad t \in (-1, +\infty). \end{aligned}$$

Atunci

$$I = \int \frac{\tan x}{1 + \tan x} dx = \frac{1}{2} (x - \ln(\sin x + \cos x)) + C, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$$

**Observația 3.5.12** Nu există reguli de calcul al primitivelor decât pentru clase restrânse de funcții elementare.

**Observația 3.5.13** Pentru detalii puteți consulta [5] și [3].

## 6. Probleme propuse spre rezolvare

**Exemplul 3.6.1** Să se arate că următoarele funcții  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  admit primitive pe intervalul  $I \subseteq \mathbb{R}$  și să se determine o primitivă  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  a funcției  $f$  pe intervalul  $I$ , dacă:

- a)  $f(x) = x^2 + x$ , oricare ar fi  $x \in I = \mathbb{R}$ ;
- b)  $f(x) = x^3 + 2x - 4$ , oricare ar fi  $x \in I = \mathbb{R}$ ;
- c)  $f(x) = x(x+1)(x+2)$ , oricare ar fi  $x \in I = \mathbb{R}$ ;
- d)  $f(x) = 1/x$ , oricare ar fi  $x \in I = ]0, +\infty[$ ;
- e)  $f(x) = 1/x$ , oricare ar fi  $x \in I = ]-\infty, 0[$ ;
- f)  $f(x) = x^5 + 1/x$ , oricare ar fi  $x \in I = ]0, +\infty[$ ;
- g)  $f(x) = 1/x^2$ , oricare ar fi  $x \in I = ]0, +\infty[$ ;
- h)  $f(x) = 1/x^2$ , oricare ar fi  $x \in I = ]-\infty, 0[$ .

**Exemplul 3.6.2** Să se calculeze:

a)  $\int \frac{2x-1}{x^2-3x+2} dx, \quad x \in ]2, +\infty[;$

b)  $\int \frac{4}{(x-1)(x+1)^2} dx, \quad x > 1;$

c)  $\int \frac{1}{x^3-x^4} dx, \quad x > 1;$

d)  $\int \frac{2x+5}{x^2+5x+10} dx, \quad x \in \mathbb{R};$

e)  $\int \frac{1}{x^2+x+1} dx, \quad x \in \mathbb{R}.$

**Exemplul 3.6.3** Să se calculeze:

a)  $I = \int \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} dx, \quad x \in ]0, +\infty[;$

b)  $I = \int \frac{1}{x + \sqrt{x-1}} dx, \quad x \in ]1, +\infty[.$

**Exemplul 3.6.4** Să se calculeze:

a)  $I = \int \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 + 2x - 2}} dx, \quad x \in ]\sqrt{3} - 1, +\infty[;$

b)  $I = \int \frac{1}{(x+1)\sqrt{-4x^2 - x + 1}} dx, \quad x \in ]\frac{-1 - \sqrt{17}}{8}, \frac{\sqrt{17} - 1}{8}[.$

**Exemplul 3.6.5** Să se calculeze:

a)  $\int_1^2 \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx; \quad b) \int_1^3 \frac{1}{x(x^2 + 9)} dx;$

c)  $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx; \quad d) \int_{-1}^1 \frac{x}{x^2 + x + 1} dx.$

**Exemplul 3.6.6** Să se calculeze:

a)  $\int_{-3}^{-2} \frac{x}{(x+1)(x^2+3)} dx; \quad b) \int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+4x+5)^2} dx;$

c)  $\int_1^2 \frac{1}{x^3+x} dx; \quad d) \int_0^2 \frac{x^3+2x^2+x+4}{(x+1)^2} dx.$

**Exemplul 3.6.7** Să se calculeze:

$$\begin{array}{ll}
a) \int_0^1 \frac{1}{1+x^4} dx; & b) \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2+4)} dx; \\
c) \int_2^3 \frac{2x^3+x^2+2x-1}{x^4-1} dx; & d) \int_0^1 \frac{x^3+2}{(x+1)^3} dx.
\end{array}$$

**Exemplul 3.6.8** Să se calculeze:

$$\begin{array}{ll}
a) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx; & b) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx; \\
c) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{4x^2+x+1}} dx; & d) \int_2^3 \frac{x^2}{(x^2-1)\sqrt{x^2-1}} dx.
\end{array}$$

**Exemplul 3.6.9** Să se calculeze:

$$\begin{array}{ll}
a) \int_2^3 \sqrt{x^2+2x-7} dx; & b) \int_0^1 \sqrt{6+4x-2x^2} dx; \\
c) \int_0^{3/4} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}} dx; & d) \int_2^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx.
\end{array}$$

**Exemplul 3.6.10** Să se arate că:

$$\begin{array}{l}
a) 2\sqrt{2} < \int_{-1}^1 \sqrt{x^2+4x+5} dx < 2\sqrt{10}; \\
b) e^2(e-1) < \int_e^{e^2} \frac{x}{\ln x} dx < \frac{e^3}{2}(e-1).
\end{array}$$



## Bibliografie

- [1] D. Andrica, D.I. Duca, I. Purdea și I. Pop: *Matematica de bază*, Editura Studium, Cluj-Napoca, 2004
- [2] D.I. Duca și E. Duca: *Exerciții și probleme de analiză matematică* (vol. 1), Editura Casa Cărții de Stiință, Cluj-Napoca, 2007
- [3] D.I. Duca și E. Duca: *Exerciții și probleme de analiză matematică* (vol. 2), Editura Casa Cărții de Stiință, Cluj-Napoca, 2009
- [4] D.I. Duca și E. Duca: *Culegere de probleme de analiză matematică*, Editura GIL, Zalău, 1996 (vol. 1), 1997 (vol. 2)
- [5] D.I. Duca: *Analiza matematică*, Casa Cărții de Stiință, Cluj-Napoca, 2013
- [6] M. Megan: *Bazele analizei matematice* (vol. 1), Editura Eurobit, Timișoara 1997
- [7] M. Megan: *Bazele analizei matematice* (vol. 2), Editura Eurobit, Timișoara 1997
- [8] M. Megan, A.L. Sasu, B. Sasu: *Calcul diferențial în  $\mathbb{R}$ , prin exerciții și probleme*, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2001
- [9] P. Preda, A. Crăciunescu, C. Preda: *Probleme de analiză matematică*, Editura Mirton, Timișoara, 2004
- [10] P. Preda, A. Crăciunescu, C. Preda: *Probleme de analiză matematică. Diferențabilitate*, Editura Mirton, Timișoara, 2005
- [11] P. Preda, A. Crăciunescu, C. Preda: *Probleme de analiză matematică. Integrabilitate*, Editura Mirton, Timișoara, 2007



## Glosar

- criteriul  
comparatiei  
    al doilea, 8  
    al treilea, 10  
    primul, 7  
radacinii al lui Cauchy, 14  
raportului al lui D'Alembert, 12  
criteriul lui  
    Kummer, 15  
Raabe-Duhamel, 17  
  
diviziune, 31  
    mai fina, 32  
  
formul lui Leibniz-Newton, 41  
formula lui Taylor, 22  
functie  
    care admite primitive, 35  
    integrabila Riemann, 33  
    primitivabila, 35  
  
integrala  
    nedefinita, 36  
integrala Riemann, 35  
  
norma a unei diviziuni, 31  
  
polinomul lui Taylor, 21  
primitiva a unei functii, 35  
  
restul  
    unei serii, 6  
restul lui Schlomilch-Roche, 25  
restul Taylor, 22  
  
seria
- armonica, 3  
armonica generalizata, 11  
serie  
    convergenta, 2  
    cu termeni pozitivi, 6  
    divergenta, 2  
    geometrica, 2  
serie de numere reale, 1  
sirul sumelor partiale  
    a unei serii de numere, 1  
sistem de puncte intermediare atasat unei  
    diviziuni, 33  
suma partiala de rang n  
    unei serii, 1  
suma Riemann, 33  
suma unei serii, 2  
  
termenul general  
    unei serii, 1

